

## 2. לפני שימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- אין להשתמש במחלות המלוות בחום כדוגמת שפעת ואבעבועות רוח (מחשש לתסמונת ריי).
- הנך אלרגי לסליצילטים (כולל אספירין), או אם הנך נוטל תכשירים אחרים המכילים סליצילט. התרופה מכילה סליצילט.
- אתה סובל מכיב קיבה (אולקוס), דימומים, צואה דמית או שחורה.

### אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- לפני התחלת הטיפול טבליט ספר לרופא אם:
  - הנך בהריון או מניקה.
  - הנך סובל או סבלת בעבר מליקוי בתפקוד מערכת הנשימה (כגון אסטמה), הכליה/מערכת השתן, מערכת העיכול (כגון כיב קיבה), מערכת הדם (כגון קרישה וכו'), שגדון, התייבשות או אם יש לך חום.
  - הנך רגיש למזון כלשהו או לתרופה כלשהי, במיוחד לאספירין וסליצילטים.
- אין להשתמש בתרופה בילדים ובמבוגרים עד גיל 20 שובלים משפעת או אבעבועות רוח או שיש להם חום או שאיבדו הרבה נוזלים.
- אין לתת לילדים או מבוגרים לטיפול בבחילות על רקע אורגני.
- אין להשתמש בתרופה אם סימני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר יומיים.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת בלי להיוועץ ברופא.
- אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות:
  - אם אתה לוקח, או אם לוקח לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
  - במיוחד יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
    - אספירין וסליצילטים
    - תרופות נגד קרישת דם
    - תרופות נגד שגדון כגון פרובנציד או סולפיפירזון
    - סטטציקלינים
    - תרופות לסוכרת
    - תרופות לדלקת מפרקים (ארטריטיס)

### שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול את התרופה עם או בלי מזון.

### שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול:

אין לשתות יינות או משקאות חריפים בתקופת הטיפול עם התרופה.

### הריון, הנקה ופוריות:

אם הנך בהריון או מניקה, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופה.

## 1. מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתרן במנה (2 טבליט) ועל כן נחשבת נטולת נתרן.  
התרופה מכילה 4R Ponceau או עלול לגרום לתגובות אלרגיות.

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

מבוגרים וילדים מעל גיל 12 שנים: 2 טבליטות.

ילדים מתחת לגיל 12 שנים: יש להיוועץ ברופא.

במידה והומלץ על ידי הרופא – ילדים מתחת לגיל 9 שנים: מומלץ להשתמש בביטי נוזלי.

לפי הצורך ניתן לחזור על מינון זה כל חצי שעה עד שעה, עד 8 פעמים בכל 24 שעות.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

### צורת הנטילה

יש לבלוע את התרופה עם מים.

### כתשה/חצייה/לעיסה:

אין ללעוס. הטבליה מיועדת לבליעה.

אין לחצות את הטבליה על מנת ליטול כמות מופחתת.

עם זאת, על מנת להקל על הבליעה, ניתן במידת הצורך לכתוש/ לחצות את הטבליה לשימוש מיידי. יש לבלוע את כל החלקים מיד לאחר הכתישה/חצייה.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר:** אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

**אם שכחת ליטול את התרופה:** אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

כיצד תוכל לסייע להצלחת הטיפול? במקרה של שלשולים יש להרבות בשתית משקאות ללא קפאין כדי להתגבר על איבוד נוזלים.

**אין ליטול תרופות בחושך! בדוק תוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

## 4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בביטי טבליט עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם:** מופיעים התסמינים הבאים: חולשה, עויתות, בעיות בנשימה, טישטוש ריאה, בלבול, צלצולים באוזניים או איבוד שמיעה, עצירת חמורה.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות לרופא בהקדם האפשרי אם:** מופיעים סימנים של מינון יתר כגון נמנום, כאב ראש ובמקרה של שלשול המלווה בחום גבוה.

תרופה זו עלולה לגרום לשינוי בצבע הצואה או הלשון. בשינויים אלה אין מקום לדאגה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרתי בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה

לתוסף המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

## 5. איך לאחסן את התרופה?

מנע היעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (EXP) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותה חודש.

**תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C.

## 6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Calcium carbonate, Povidone K-25, Pregelatinized Starch, Sodium Starch Glycolate, Hypromellose 4910, Magnesium Stearate, Ponceau 4R, Macrogol 6000.

**כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:** אריזה המכילה 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 60 טבליטות מצופות בצבע ורוד, עגולות וקומורות משני הצדדים.

ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

**שם היצרן ובעל הרישום וכתובתו:** כצט תעשיות כימיות בע"מ, רחוב הקדמה 3, קרית מלאכי.

עלון זה נערך בתאריך 11/2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר ירישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 1406531601.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

