

**نشرة طبية للمستهلك بموجب أنظمة الصيادلة**  
**(مستحضرات 1986)**  
**يُسوق هذا الدواء بدون وصفة طبيب**  
**بيتي معقّل 262 مل (15 مل)**

### Bitni Suspension (262 mg / 15 ml)

يحتوي كل 15 مل على:  
 بيسموساليسيلات 262 مل

### Bismuth Subsalicylate 262 mg

لتفصيل المركبات الأخرى في الدواء انظر البند 6  
 معلومات إضافية.

اقرأ النشرة بأكملها حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء.

تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة الطبيب، فراجع الطبيب أو الصيدلي.

الدواء مخصص للبالغين والأولاد الذين سنهم فوق الـ 12: 12. يجب التوجه إلى الطبيب إذا كانت هذه الدوارة على فترات متقاربة أو من السوائل.

لا يجوز إطهاره للأولاد أو البالغين لعلاج العثيان المصوبي المنشا.

لا يجوز استعمال الدوارة لدى الأولاد والمرأة الذين لا تتجاوز سنهما 20 الذين يعانون من الإنفلونزا أو الحمى (جدرى الماء) أو الحمى أو الذين فقدوا الكثير من السوائل.

لا يجوز إطهاره للأولاد أو البالغين لعلاج العثيان المصوبي المنشا.

إذا كنت تستعمل الإن، أو قد استعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب وإضافات غذائية، فاخبر الطبيب قبل تناوله إنك تتناول أدوية أخرى.

يجب التوجه إلى الطبيب إذا لم تختفي العدوى بعد يومين. كذلك يجب إيقاف العلاج والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا كان الإسهال مصحوباً بالحمى الشديدة، أو إذا ثبتت انتان في الأنف أو قدان للسع.

### ١. لأيّ غرض مخصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص للتخفيف من حالات الإسهال، الغثيان، الفازات، الام البطن الشنجي، توغل المعدة وعسر الهضم.

لمنع الإسهال لدى المسافرين.

### ٢. قبل استعمال الدوارة إذا:

لا يجوز استعمال الدوارة إذا:

كنت حساساً (أرجيًّا) لل المادة الفعالة أو لأيٍ من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها الدواء.

لا يجوز الاستعمال عند المعاشرة من أمراض مصحوبة بالحمى مثل الإنفلونزا والحمى (جدرى الماء) (خوفاً من شهوة متازرمه ربي).

كنت حساساً للساليسيلاتات (بما في ذلك الأسيبرين)، أو كنت تستعمل مستحضرات أخرى تحتوي على ساليسيلاتات. يحتوي الدواء على ساليسيلاتات.

كنت تعاني من فرقحة المعدة، التزيف الدموي، البراز الدموي أو الأسربود.

### تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء:

قبل الدوام بالخارج يجب بيتهي معقّل، يجب إخبار الطبيب إذا:

كنت مأملاً أو مرضضاً.

قد يستحب هذا الدواء تغذّياً في لون البراز أو اللسان. لا تنسّبغي هذه التغذيات الفرق.

إذا ظهر عرضٌ جانبٌ، إذا ناقص أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرضٍ جانبٍ لم يذكر في النشرة، فعليك استشارة الطبيب.

بالإمكان النقلة عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة النصائح على الرابط "النكلة عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستئناف المفضلة للنكلة عن أعراض جانبية، أو عن طريق الحصول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

### ٥. كم يجب تخزين الدواء؟

امض التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وأي دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي الأطفال وألا يلطّل المرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبّب التقطور بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (Exp) المنزوع على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر. ظروف التخزين: يجب التخزين في درجة حرارة أقل من 25 درجة مئوية. الاستعمال بعد القطف: صالح للاستعمال لمدة شهرين كحد أقصى بعد يوم قطفه.

### ٦. معلومات إضافية:

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة أيضاً على: Propylene Glycol, Xanthan Gum, Sodium Salicylate, Sucralose, Sodium Benzoate, Strawberry Cream Flavor, Salicylic Acid, Ponceau 4R, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة: قنطرة تجاري على 100 مل معلق وردي اللون بنكهة الفراولة. اسم الجهة المصنعة وصاحب الامتياز وعنوانه: لك ص ط للصناعات الكيميائية م.ض. ، شارع هكيم 3، كريات ملخي.

تم تحرير هذه النشرة في 11/2023 وفقاً لإرشادات وزارة الصحة. رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة: 1407531557. من أجل التيسير والتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكرة. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

يحتوي الدواء على 39 ملغ Sodium Benzoate في كل جرعة من 30 مل.

يحتوي الدواء على 4R Ponceau الذي قد يسبب ردود فعل تحسسية.

### ٣. كيف تستعمل الدواء؟

علىك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متancockاً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية المتقدمة عادةً هي البالغون والأولاد الذين سنهم سنهم فوق الـ 12: 30 مل.

الأولاد الذين سنهم ما بين 6-12: يجب استشارة الطبيب. بالمكان تكرار تناول هذه الجرعة الدوائية كل نصف ساعة إلى ساعة، حتى 8 مرات على مدار 24 ساعة.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

### كيفية التناول

قبل الاستعمال يجب خزن الدواء جيداً وشربه وفقاً للجرعة الدوائية الموصى بها.

يجب المواضبة على قياس الجرعة بواسطة كأسقياس.

المرحلة.

إذا تناولت خطأ جرعة دوائية أكبر من الجرعة الدوائية المطلوبة: إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا قام ولد يبلغ

الدواء خطأ، فتوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر بوك غيرة الدواء، لا

تسبّب التقطور بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

إذا نسيت تناول الدواء، إذا نسيت تناول هذه الدوارة في الوقت المطلوب، فلا تتناول جرعة مضاعفة. تناول

الجرعة التالية في الوقت الاعتيادي واستشارة الطبيب.

كيف تستطيع الدوارة المساعدة في نجاح العلاج؟ في حالة الإسهال يجب إيكاراً من شرب السوائل التي لا تحتوي على الكافيين من أجل تهدئة المعدة.

لا يجوز تناول الأدوية في المعتنة مع أدوية أخرى من الجرعة في كل مرة تتناول فيها الدوارة. ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.

إذا توفرت لك أسلمة الطبيب، فأخبر الطبيب أو الصيدلي.

### ٤. الأعراض الجانبية:

مثل أي دواء، قد يؤدي استعمال بيتهي معقّل إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستعملين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، قد لا تتعذر من أي واحد منها.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب إذا:

ظهرت الأعراض التالية: ضغف، تشنجات، مشاكل في التنفس، تتوسّل الرؤوس، ارتباك، نظيرين في الأنفين أو فقدان السمع، إمساك شديد.

يجب التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا:

ظهرت علامات فرط الحرارة مثل التهاب، الصداع، والإسهال المصحوب بالحمى الشديدة.