

## آي ريليف، قطرة للعينين

التراكيب:

تيتراهيدروزولين هيدروكلوريد W/V 0.05%

(Tetrahydrozoline Hydrochloride 0.05% W/V).

يحتوي كل 1 مل على: 0.5 ملغ تيتراهيدروزولين هيدروكلوريد.

المادة غير الفعالة ومولدات الحساسية. انظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات مهمة عن بعض مرکبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. عليك استعمال الدواء حسب التعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء؟" في هذه النشرة. إنشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت علامات المرض أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

### 1. لأى غرض مخصص الدواء؟

هذا الدواء مخصص لخفيف الالام، الحرقة، الوخز، التهيج والإحمرار التي تحدث جراء احتقان في العينين.

الفصيلة العلاجية: مخففات الإحتقان العرضية.

### 2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

- كنت تعاني من الحساسية (الرجي) للمادة الفعالة (تيتراهيدروزولين هيدروكلوريد) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").
- كنت تعاني من جلوكوما ضيق الزاوية.
- لا يجوز استعمال هذا الدواء لدى متعالجين دون عمر سنين.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

- قبل العلاج بالدواء إحكام للطبيب إذا كنت تعاني من تلوث، وجود جسم غريب وإصابة ميكانيكية أو كيميائية للعين.
- يجب إستعمال الدواء فقط للتهديجات الخفيفة في العينين.
- لا يوصى بإستعمال الدواء في حالات معقدة للعين، مثل جلوكوما.
- يجب تجنب ملامسة الدواء مع الجلد في حالات الإلتهاب أو الإصابة، بسبب وجود حمض البوريك ضمن مرکبات الدواء.
- عليك التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب إذا لم تتحسن علامات المرض (الأعراض) خلال 3 أيام، أو إذا إزداد الإلزاع والإحمرار أو إستمر، أو في حال وجود ألم في العين، أو في حال ظهور اضطرابات في الرؤية.
- استعمال الدواء من شأنه أن يؤدي إلى اتساع حدة العين بشكل مؤقت.
- الإستعمال المستمر أو سوء إستعمال الدواء، قد يزيد أو يعيده الإحمرار في العينين.
- يجب نزع العدسات اللاصقة قبل إستعمال الدواء.
- لتتجنب حدوث تلوث، لا تسمح بحوادث تلامس بين طرف القنية لسطح أي كان.

### الأطفال والناشئون:

هذا الدواء مخصص للناشئين والأولاد فرق سن 6 سنوات. يجب التوجه للطبيب للاستعمال لدى أولاد تحت هذا السن.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوصية:  
لم يتم إجراء أبحاث مضبطة بما فيه الكفاية لاستعمال تيتراهيدروزولين لدى النساء الحوامل أو المرضعات.  
غير معروف إذا كان تيتراهيدروزولين أو مستقلباته تفترز في حليب الأم.  
لا يجوز إستعمال الدواء خلال فترة الحمل أو الإرضاع ما عدا في حالات تفوق فيها الفائد المحمولة للأم الخطورة المحتملة على الجنين أو الرضيع الذي يررضع.  
يجب إستشارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاملاً، تخطيبين للحمل أو مرضعة.

### السيقة واستعمال الآلات:

قد يؤدي إستعمال الدواء إلى تشوش مؤقت في الرؤية.

معلومات مهمة عن بعض مكونات الدواء

يحتوي الدواء على المادة الحافظة بنزلكونيوم كلوريد (Benzalkonium Chloride)، الذي قد يتم إمتصاصه من قبل العدسات اللاصقة قبل إستعمال الدواء وإرجاعها بعد 15 دقيقة من الإستعمال.

قد يسبب بنزلكونيوم كلوريد أيضًا تهييجًا في العين، خاصة إذا كنت تعاني من جفاف العينين، أو اضطرابات في القرنية. إذا وجد لديك شعور غير سليم في العينين، وخز أو ألم في العين بعد إستعمال الدواء، راجع طبيبك.

يحتوي هذا الدواء على 0.1 ملغ بنزلكونيوم كلوريد في كل 1 مل، وتركيز يعادل 0.1 ملغ/مل.

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن متأكداً بخصوص الجرعة وكيفية العلاج.

لدى الكبار والأطفال فوق عمر 6 سنوات، المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

2-4 قطرات لداخل كل عين حتى 4 مرات في اليوم.

لدى الأطفال لدى الأطفال دون عمر سنين حتى 6 سنوات: يجب الإستعمال تحت إشراف طاقم طبي.

لا يجوز الإستعمال لدى الأطفال دون عمر سنين.

الإستعمال لدى الأطفال دون عمر 12 سنة يكون تحت إشراف شخص بالغ.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الاستعمال:

يُمنع البلع! هذا الدواء مخصص للاستعمال الخارجي فقط.

تعليمات الإستعمال:

1. أعمل يديك جيداً قبل إستعمال قطرات العينين.

2. احن رأسك للخلف أو استلق على السرير وبمساعدة إصبعك، حرك الجفن السفلي قليلاً بعيداً عن العين وإنشاء فجوة.

3. في الفجوة، قم بقطير الدواء وأغلق عينيك لمدة 2-1 دقيقة ولا ترمش.

4. لمنع تلوث محلول، تأكيد من أن فوهة الزجاجة لا تتلامس مع أي سطح، بما في ذلك الإصبع والعين وأغلق الزجاجة بباحثم.

إذا استعملت مقداراً دوائياً أكبر

إذا استعملت مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت إستعمال الدواء، إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا تستعمل مقداراً دوائياً مضاعفاً. يستعمل المقدار الدوائي التالي في الوقت المعتاد واستشر الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، قد يسبب استعمال آي ريليف أعراضًا جانبية لدى بعض مستخدمي الدواء، لافتة عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

فيما يلي الأعراض الجانبية التي تم ملاحظتها جراء إستعمال قطرات التي تحتوي على تيتراهيدروزولين للاستعمال العيني.

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

• اضطرابات في الرؤية - اتساع حدقتي العينين، تزايد الدموع.

• ردود فعل في موضع إعطاء الدواء (التي تشمل الشعور بحرقة في العين أو حول العين، إحمرار، تهيج، وذمة، ألم وحكمة).

أعراض جانبية إضافية

من المتوقع أن تكون وتيرة، نوع وخطورة الأعراض الجانبية لدى الأطفال مشابهة لتلك لدى الكبار.

قد يؤدي بلع آي ريليف إلى عدم إستقرار في جهاز القلب والأوعية الدموية (جهاز الأوعية الدموية والقلب)، تثبيط الجهاز العصبي المركزي (بما في ذلك نعاس وغيبوبة) وكذلك تثبيط

الجهاز التنفسى بما في ذلك انقطاع النفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

<https://sideeffects.health.gov.il> الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليل عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (Date. exp.) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.

يجب حفظ القنية مغلقة جيداً.

يمكن استخدام الدواء حتى 30 يوماً بعد فتح القنية للمرة الأولى، ولا يتتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

يجب التخلص من الدواء إذا كان هناك تغيير في لون محلول، أو أصبح عكرًا.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المياه العادمة أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

## **6. معلومات إضافية**

بالإضافة للمركب الفعال، يحتوي الدواء على:  
Boric Acid, Sodium Borate (Borax), Benzalkonium Chloride 50% Solution, Disodium Edetate, Sodium Hydroxide/ Hydrochloric Acid, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:  
قنينة تحوي محلول مائي، نقى وعديم اللون.  
حجم العبوة المصادر علىها: 10 مل.

المنتج وصاحب الامتياز:

فيتامد للصناعات الدوائية م.ض.

شارع هتخانا 6، ص.ب. 114، بناماينا 3055002، إسرائيل.

تم التحرير في يونيور (جزيران) 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

135-01-31443-00

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.