

## في-زولين، قطرة للعينين

التركيب:

تيترابايدروزولين هيدروكلوريد W/V 0.05%

يحتوي كل 1 مل على: 0.5 ملг تيترايدروزولين هيدروكلوريد.

المادة غير الفعالة ومولدات الحساسية. انظر البند 6 "معلومات إضافية" وفي البند 2 "معلومات مهمة عن بعض مركبات الدواء".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسلمة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. عليك استعمال الدواء حسب التعليمات في البند 3 "كيفية استعمال الدواء؟" في هذه النشرة. إستشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. عليك التوجه للطبيب إذا تفاقمت علامات المرض أو إذا لم تتحسن بعد 3 أيام.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

هذا الدواء مخصص لتخفيف الآلام، الحرقة، الوخز، التهيج والإحمرار التي تحدث جراء احتقان في العينين.

الفصيلة العلاجية: مخففات الاحتقان العرضية.

### 2. قبل استعمال الدواء

يمنع استعمال الدواء إذا:

• كنت تعاني من الحساسية (الرجي) للمادة الفعالة (تيترايدروزولين هيدروكلوريد) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6 "معلومات إضافية").

• كنت تعاني من جلوكوما ضيق الزاوية.

• لا يجوز استعمال هذا الدواء لدى متعالجين دون عمر ستين.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

• قبل العلاج بالدواء إحكام الطبيب إذا كنت تعاني من تلوث، وجود جسم غريب وإصابة ميكانيكية أو كيميائية للعين.

• يجب إستعمال الدواء فقط للتهدئات الخفيفة في العينين.

• لا يوصى بإستعمال الدواء في حالات معقدة للعين، مثل جلوكوما.

• يجب تجنب ملامسة الدواء مع الجلد في حالات الالتهاب أو الإصابة، بسبب وجود حمض البوريك ضمن مركبات الدواء.

• عليك التوقف عن الاستعمال والتوجه إلى الطبيب إذا لم تتحسن علامات المرض (الأعراض) خلال 3 أيام، أو إذا إزداد الإنتزاع والإحمرار أو استمرا، أو في حال وجود ألم في العين، أو في حال ظهور اضطرابات في الرؤية.

• استعمال الدواء من شأنه أن يؤدي إلى إتساع حدة العين بشكل مؤقت.

• الاستعمال المستمر أو سوء استعمال الدواء، قد يزيد أو يعيده الإحمرار في العينين.

• يجب نزع العدسات اللاصقة قبل إستعمال الدواء.

• تجنب حدوث تلوث، لا تسمح بحدوث تلامس بين طرف القبضة لسطح أي كان.

الأطفال والناشئون:

هذا الدواء مخصص للناشئين والأولاد فوق سن 6 سنوات. يجب التوجه للطبيب للاستعمال لدى أولاد تحت هذا السن.

التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:

لم يتم إجراء أبحاث مضبوطة بما فيه الكفاية لاستعمال تيترايدروزولين لدى النساء الحوامل أو المرضعات.

غير معروف إذا كان تيترايدروزولين أو مستقلباته تؤثر في حليب الأم.

لا يجوز إستعمال الدواء خلال فترة الحمل أو الإرضاع ما عدا في حالات تفوق فيها الفائد المحتملة للأم الخطورة المحتملة على الجنين أو الرضيع الذي يرضع.

يجب إشتارة الطبيب قبل البدء بالعلاج إذا كنت حاملاً، تخططين للحمل أو مرضعة.

السياحة واستعمال الآلات:

قد يؤدي إستعمال الدواء إلى تشوش مؤقت في الرؤية.

معلومات مهمة عن بعض مكونات الدواء

يحتوي الدواء على المادة الحافظة بنزلكونيوم كلوريد (Benzalkonium Chloride)، الذي قد يتم إمتصاصه من قبل العدسات اللاصقة الرخوة وتغيير لونها. يجب نزع العدسات

اللاصقة قبل إستعمال الدواء وارجاعها بعد 15 دقيقة من الإستعمال.

قد يسبب بنزلكونيوم كلوريد أيضًا تهييجًا في العين، خاصة إذا كنت تعاني من جفاف العينين، أو اضطرابات في القرنية. إذا وجد لديك شعور غير سليم في العينين، وخز أو ألم في العين بعد

استعمال الدواء، راجع طبيبك.

يحتوي هذا الدواء على 0.1 ملг بنزلكونيوم كلوريد في كل 1 مل، وتركيز يعادل 0.1 مل/مل.

### 3. كيفية استعمال الدواء؟

عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن متأكداً بخصوص الجرعة وكيفية العلاج.

لدى الكبار والأطفال فوق عمر 6 سنوات، المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:

2-3 قطرات لداخل كل عين حتى 4 مرات في اليوم.

لدى الأطفال من عمر ستين حتى 6 سنوات: يجب الإستعمال تحت إشراف طاقم طبي.

لا يجوز الإستعمال لدى الأطفال دون عمر ستين.

الإستعمال لدى الأطفال دون عمر 12 سنة يكون تحت إشراف شخص بالغ.

يُمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

طريقة الإستعمال:

يُمنع البلع! هذا الدواء مخصص للإستعمال الخارجي فقط.

تعليمات الإستعمال:

1. إخلص يديك جيداً قبل إستعمال قطرات العينين.

2. اجن رأسك للخلف أو استلق على السرير وبمساعدة إصبعك، حرك الجفن السفلي قليلاً بعيداً عن العين وانشاء فجوة.

3. في الفجوة، قم بقطير الدواء وأغلق عينيك لمدة 2-1 دقيقة ولا ترمش.

4. لمنع تلوث المحلول، تأكّن أن فوهة الزجاجة لا تلامس مع أي سطح، بما في ذلك الإصبع والعين وأغلق الزجاجة بحكام.

إذا استعملت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت إستعمال الدواء

إذا نسيت إستعمال هذا الدواء في الوقت المطلوب، لا تستعمل مقداراً دوائياً مضاعفاً. إستعمل المقدار الدوائي التالي في الوقت المعتمد واستشر الطبيب.

لا يجوز إستعمال أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تستعمل فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

### 4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، قد يسبب إستعمال في-زولين أعراضًا جانبية لدى بعض مستخدمي الدواء. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تعاني من أي منها.

فيما يلي الأعراض الجانبية التي تم ملاحظتها جراء إستعمال قطرات التي تحتوي على تيترايدروزولين للإستعمال العيني.

أعراض جانبية نادرة جداً (أعراض تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

• إضطرابات في الرؤية – إتساع حدقتي العينين، تزايده الدمع.

• ردود فعل في موضع إعطاء الدواء (التي تشمل الشعور بحرقة في العين أو حول العين، إحمرار، تهيج، وذمة، ألم وحكة).

أعراض جانبية إضافية

من المتوقع أن تكون توترة، نوع وخطورة الأعراض الجانبية لدى الأطفال مشابهة لتلك لدى الكبار.

قد يؤدي بلع في-زولين إلى عدم إستقرار في جهاز القلب والأوعية الدموية (جهاز الأوعية الدموية والقلب)، تثبيط الجهاز التنسجي بما في ذلك إقطاع النفس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

الإبلاغ عن أعراض جانبية

بالإمكاني التبلغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبلغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة

(<https://sideeffects.health.gov.il>) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومحال رؤية الأطفال و/ أو الرضع، وذلك لнациتهم بالتسنم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. Date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

شروط التخزين:

• يجب التخزين تحت 25 درجة مئوية.

• يجب حفظ القبضة مغلقة جيداً.

يمكن استخدام الدواء حتى 30 يوماً بعد فتح القبضة للمرة الأولى، ولا يتتجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على العبوة.

يجب التخلص من الدواء إذا كان هناك تغيير في لون محلول، أو أصبح عكرًا.

• لا يجوز رمي الأدوية إلى المياه العادمة أو للقمامة المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

## 6. معلومات إضافية

بالإضافة للمركب الفعال، يحتوي الدواء على:

Boric Acid, Sodium Borate (Borax), Benzalkonium Chloride 50% Solution, Disodium Edetate, Sodium Hydroxide/ Hydrochloric Acid, Purified Water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:  
قنينة تحوي محلول مائي، نقى وعديم اللون.  
حجم العبوة المصادر علىها: 10 مل.

المنتج وصاحب الامتياز:  
فيتامد للصناعات الدوائية م.ض.

شارع هتحانا 6، ص.ب. 114، بنيamina 3055002، إسرائيل.

تم التحرير في يونيور (حزيران) 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

069-78-28589-00

من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.