



עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אוגמנטין 500 מ"ג טבליות

טבליות מצופות.

כל טבליה מכילה:

500 מ"ג אמוקסיצילין (כ- טריידראט)

amoxicillin (as trihydrate)

125 מ"ג חומצה קלואולאנית (כ- מלח אשלגן)

clavulanic acid (as potassium salt)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אוגמנטין משמשת במוגדים ובילדים לטיפול בziehomim הבאים:

- ziehomim באוזן התיכונה ובסינוסים
- ziehomim בדרכי הנשימה
- ziehomim בדרכי השתן
- ziehomim בעור וברקמות רכות לרבות ziehomim דנטליים
- ziehomim בעצמות ובמפרקים.

אוגמנטין היא אנטיביוטיקה הפעלת על ידי קטילת חיידקים הגורמים לziehomim. היא מכילה שתי תרופות שונות הנקראות אמוקסיצילין וחומצה קלואולאנית. אמוקסיצילין שייכת לקבוצת תרופות הנקראת "פניצילינים" שלעיתים יכולה להפסיק (להפסיק לבתי פעילות). הרכיב הפעיל الآخر (חומצה קלואולאנית) מונע זאת מלקרות.

קבוצת תרפופיטית

אמוקסיצילון: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים.

חומצה קלואולאנית: מעכבי האנזים בטא-לקטמאז.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאמוקסיצילין, לחומצה קלואולאנית, לפניצילין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6)

- הייתה לך אי פעם תגoba אלרגית חמורה לכל אנטיביוטיקה אחרת. זו יכולה לכלול פריחה בעור או נפיחות של הפנים או הגרון
 - היה לך אי פעם בעיות בכבד או צחבת (הצחבה של העור) בעת נטילת אנטיביוטיקה.
- ← **אל תיקח אוגמנטי אם אחד מלאה חל עלייך.** אם איןך בטוח, דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אוגמנטי.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אוגמנטי אם:

- יש לך מחלת הנשיקה
- הנר מקבל טיפול עכבר בעיות בכבד או בcliffe
- איןך מטיל שタン **בצורה תקינה.**

אם איןך בטוח אם אחד מלאה חל עלייך, דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אוגמנטי.

במקרים מסוימים, יתכן שהרופא יבדוק את סוג החידק הגורם לziehom שלך. בהתאם לתוצאות, יתכן שינוי לך חזק אחר של אוגמנטי או תרופה אחרת.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם

אוגמנטי עלולה להחמיר מצבים קיימים מסוימים, או לגרום לתופעות לוואי חמורות. אלה כוללות תגבות אלרגיות, פרכוסים (עוויות) ודלקת של המעי הגוף. עלייך לשים לב לתרומות מסוימים בזמן שאתה לוקח אוגמנטי, כדי להפחית את הסיכון לעביעות כלשהן. ראה 'מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם' בסעיף 4.

בדיקות דם ושתן

אם אתה עובר בבדיקות דם (כגון בבדיקות המעריכות את מצב תאדי הדם האדומים או בבדיקות לתקוד כבד) או בבדיקות שתן (לבדיקת רמות גליקוז), ידע את הרופא שאתה לוקח אוגמנטי. זאת משום שאוגמנטי יכול להשפיע על התוצאות של בדיקות מסוימות אלה.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה או אם יתכן שתיקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם, **טרופות צמחיות ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח.**

• אם אתה לוקח אלופרינול (המשמש לטיפול בשיגdon) עם אוגמנטי, יש סבירות גדולה יותר לכך שתהיה לךTAGOVA אלרגית עורית.

• אם אתה לוקח פרובנץיד (המשמש לטיפול בשיגdon), יתכן שהרופא יחליט בהתאם את מינון האוגמנטי.

• אם תרופות מעכבות קרישת דם (כגון ארפרין או אצנווקומארול) נלקחות עם אוגמנטי, יתכן שהיא צורך בבדיקות דם נוספת.

• אוגמנטי יכול להשפיע על אופן פעילותה של מתוטרקסאט (תרופה המשמש לטיפול בסרטן או במחלות שגרוניות).

• אוגמנטי עלולה להשפיע על אופן פעילותה של מיקופנולאט מופטיל (תרופה המשמש למניעת דחיה של איברים מושתלים).

הירyon והנקה

אם את בהירyon או מניקה, חושבת שיתכן שאתה בהירyon או מתקננת להרות, פני לרופא או לרוקח לקבלת ייעוץ לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

לאוגמנטיין יכולות להיות תופעות לוואי והتسمינים עלולים לגרום לך להיות לא כשיר Nehiga.

אל נהיג או תפעיל מכונות אלא אם אתה מרגיש טוב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

ואוגמנטיין 500 מ"ג טבליות מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבליה ולכן נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתחום תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתחום.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מבוגרים וילדים השוקלים 40 ק"ג ומעלה

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

- טבליה 1 שלוש פעמים ביום.

ילדים השוקלים פחות מ-40 ק"ג

בילדים בני שש ומטה, מומלץ לטפל בתרחיף אוגמנטיין דרך הפה. יש להתייעץ עם הרופא במקרה בו ניתנות טבליות לילדים השוקלים פחות מ-40 ק"ג. התרופות אין מתאימות לילדים השוקלים פחות מ-25 ק"ג.

מטופלים עם בעיות כליות וכבד

- אם יש לך בעיות בכליות יתכן שהמנה תשתנה. יתכן שחזק אחר או תרופה אחרת יבחרו על ידי הרופא.
- אם יש לך בעיות בכבד יתכן שתצטרכ לבעצם בדיקות דם תכופות יותר כדי לבדוק את תפקודו הכבד שלך.

אין לעבר על המנה המומלצת.

AIR לחת אוגמנטיין

- יש לחת עם האrhoחה.
- יש לבלווע את התרופות בשלהותן עם כוס מים.
- ניתן לחצות את התרופות לאורך הקו המסומן כדי להקל על הבליעה. יש לחת את שני חלקי התרופיה באותו הזמן. אין מידע לגבי כתישה ולעיסה.
- יש לחלק את המנות באופן שווה במהלך היום, לכל הפחות בהפרש של 4 שעות. אל תikhich 2 מנות בשעה אחת.
- אין ליטול אוגמנטיין למשך יותר משבועיים. אם אתה עדיין מרגיש לא טוב, יש לפנות בחזרה לרופא.

אם לחת בעות מין גבוה יותר

אם לחת בעות מין גבוה יותר מדי אוגמנטיין, הסימנים עשויים לכלול אי נוחות בבטן (בחילה, הקאה או שלשול) או פרוכוסים. פנה לרופא בהקדם האפשרי. קח את אריזת התרופה כדי להראות לרופא.

אם בעות בלע ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לחת אוגמנטיין

- אם שכחת לקחת מנתה, קח אותה ברגע שאתה נאכرا.
- אל תיקח את המנה הבאה מוקדם מדי, אלא המtan כ-4 שעות לפני נטילת המנה הבאה. אין לנקחת מנתה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.
- יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מספיק לנקחת אוגמנטיין

המשך לנקחת אוגמנטיין עד לסיום הטיפול, אפילו אם אתה מרגיש טוב יותר. כל אחת מהמנות חשובות עבורך על מנת לעזור להילחם בזיהום. אם חלק מהחידקים שרדוו, הם יכולים לגרום לזיוהם חוזר.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעע שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זוקק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באוגמנטיין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלוואי. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן. תופעות הלוואי בהמשך עשויות להתרחש עם תרופה זו.

מצביים שאתה צריך לשים לב אליהם:

תגובהות אלרגיות:

- פריריה בעור
 - דלקת של כלי דם (אסקווליטיס) אשר עשויה להראות ככתמים אדומים או סגולים בולטים על העור, אך יכולה להשפיע על אזורים אחרים של הגוף
 - חום, כאב פרקים, בלוטות נפוחות בצוואר, בבית לחם או במפשעה
 - נפיחות, לפעים של הפנים או הגרון (אנגיואדמיה), הגורמת לקשיי נשימה
 - התמוטטות
 - כאבים בחזה הקשורים לתגובה אלרגית עשויים להיות תסמינים של אוטם שריר הלב המשופעל על ידי אלרגיה (תסמונת קוונייס – *Kounis syndrome*).
- ← פנה מיד לרופא אם אתה חווה אחד מתסמיניהם אלה. **הפסיק לנקחת אוגמנטיין.**

דלקת של המעי הגס

דלקת של המעי הגס, גורמת לששלול מימי המלווה בדרך כלל בدم וריר, כאב בטן ו/או לחום.

תסמונת אנטרוכוליטיס (דלקת במעי) הנגרמת על ידי תרופה (DIES)

DIES דוחה בעיקר בילדים שקיבלו אמוקסיצילין/חומרה קלואולאנית. זהו סוג מסוים של תגובה אלרגית עם תסמין עיקרי של הקאות חרזרות ונשנות (1-4 שעות לאחר מтан התרופה). תסמינים נוספים יכולים לכלול כאב בטן, עייפות (ישנוונות), שלשול ולחץ דם נמר.

דלקת חריפה של הלבלב (acute pancreatitis)

אם יש לך כאבים עזים ומתחמשכים באזורי הבطن זה יכול להיות סימן לדלקת לבלב חריפה.

← פנה לרופא בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ אם אתה חווה תסמינים אלה.

תופעות לוואי לפי שכיחותן:

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עשויות להופיע **ביוורר מ-1 מכל 10** אנשים
• **שלשול (במבוגרים).**

תופעות לוואי שכיחות

אליה עשויות להופיע ב- **עד 1 מכל 10** אנשים

- פטרת (קנדידה - זיהום פטריאטי של הנרתיק, הפה או קפלי העור)
• בחילה, בעיקר כאשר לוקחים מינון גבוה
← אם הופיעה בחילה, קח אוגמנטין עם ארוחה
• הקאה
• **שלשול (בילדים).**

תופעות לוואי שאין שכיחות

אליה עשויות להופיע ב- **עד 1 מכל 100** אנשים

- פריחה בעור, גרד
- פריחה בולטת מגרדת (חלפת)
- בעיות עיכול
- סחרחות
- כאב ראש.

תופעות לוואי שאין שכיחות העשוות להופיע בבדיקות הדם שלך:
• עליה באנגיימי כבד.

תופעות לוואי נדירות

אליה עשויות להופיע ב- **עד 1 מכל 1,000** אנשים

- פריחה בעור, שעשויה לכלול שלפוחיות (שנראות כמו כתמים כהים במרכז המוקפים באזורי חיוור, עם טבעת כהה מסביב לשולדים - אדמנת רב צורתית *erythema multiforme*).
← אם אתה מבחין באחד מתסминים אלה פנה לרופא בדחיפות.

תופעות לוואי נדירות העשוות להופיע בבדיקות הדם שלך:

- מספר נמוך של תאים המעורבים בקרישת הדם
- מספר נמוך של תא דם לבנים.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (לא ניתן לדעת את השכיחות מתחוון הנתונים הקיימים)

- תגובות אלרגיות (ראה לעיל)
- דלקת של המעי הגס (ראה לעיל)
- תסמונת אנטרוכוליטיס (דלקת בעמי) הנגרמת על ידי תרופות (DIES) (ראה לעיל)
- דלקת חריפה של הלבלב (*acute pancreatitis*) (ראה לעיל)
- דלקת הקרום העוטף את המוח וחוט השדרה (*meningoitis sapientia*)
- תגובות עוריות חמורות:

- פריחה מפושחת עם שלפוחיות ועור מתקלף, בעיקר סביב הפה, האף, העיניים ואיברי המין (*תסמונת שטיבנס-ג'ונסון*), ותופעה חמורה יותר, הגורמת לkılוף נרחב של העור (יוטר מ- 30% משטח הגוף של הגוף - *טוקסיק אפיזרמל נקרוליזיס*)
- פריחה אדומה מפושחת בעור עם שלפוחיות קטנות המכילות מוגלה (*bullous exfoliative dermatitis*)
- פריחה אדומה קשכנית עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות (*exanthematous pustulosis*)

- תסמיינים דמווי שפעת עם פריחה, חום, בלוטות נפוחות ותוצאות בדיקות דם חריגות (כולל עליה בכמויות תאי הדם הלבנים [אוזוינופיליה] ואנגיימי הכבד) (תגובה לתרופה הכלולת אוזוינופיליה ותסמיינים מערכתיים [DRESS])
- פריחה המאפיינת בשלפוחיות הממוקמות סביב גלד מרכזי או דמוית מחזרות פנינים (מחלת IgA ליניארית).

← פנה מיד לרופא אם אתה חווה אחד מتسמיינים אלה.

- דלקת של הכבד (הפטיטיס)
- צחבת, הנגרמת על ידי עליה של בילירובין (חומר הנוצר בכבד) בدم שעלולה לגרום להצבת העור ולובן העין
- דלקת של צינורות הכליה
- זמן קרישת דם מוארך
- פעילתו יתר (היפראקטיביות)
- פרוכוסים (באנשים הולוקחים מנות גדולות של אוגמנטים או שיש להם בעיות בכליה)
- לשון שחורה הנראית שעירה.

תופעות לוואי העשויה להופיע בבדיקות הדם או השתן שלך:

- ירידת חמורה במספר תאי דם לבנים
- מספר נמוך של תאי דם אדומים (אנמיה המוליטית)
- גבישים בשתן המובילים לפגיעה חמורה בכליות.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מהוז להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעליה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C .
- יש להשתמש בטבליות המספקות בטיפות אלומיניום תוך 30 ימים מפתיחת העטיפה.
- אחסן באזינה המקורית כדי להגן מפני לחות.
- אין להשתמש אם הטבליות סודקות או פגומות.
- אין להשליך תרופות לביבות או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- מה מכילה אוגמנטין:

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם –
ליבת הטבליה –

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (Type A), colloidal anhydrous silica and magnesium stearate.

ציפור –

Hypromellose (5 cps, 15 cps), titanium dioxide (E171), macrogol (4000, 6000) and dimeticone.

• כיצד נראית התרופה ומה תוכן הארץיה:
אוגמנטין 500 מ"ג טבליות מצופות הן בין צבע לבן לאוף וויט, בצורה אליפטית, מוטבעות עם "AC" וקו חרוץ על צד אחד.

הן אריזות ב:

- אריזות בליסטר, באזית קרטון. כל קרטון מכיל 20 טבליות.

או

- אריזות הבליסטר בתוך עטייפות אלומיניום, סגורות באזית קרטון. העטיפה מכילה שקיק סופח לחות. יש לשמור את השקיק סופח הלחות בתוך העטיפה ואין לבלוע אותו. כל קרטון מכיל 20 טבליות.

יתכן שלא כל גודלי האריזות מסווקים.

• **בעל הרישום:** גלקסוסמיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.

• **יצן:** גלקסוסמיטקלין טריידיניג סרвисס לימייד, דבלין, אירלנד.

• נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

• מס' רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

026-27-25048

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

• סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינותו של קבוצת החברות של GSK.

© 2023 קבוצת החברות של GSK או הא齊ין שלה.

Aug Tab 500 PT v9A