

עלון לצרכן לפי תקנות הרווחים (תקשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אוגמנטין 875 מ"ג טבליות

טבליות מצופות.

כל טבלייה מכילה: 875 מ"ג אמוקסיצילין (כטוריידראט)

amoxicillin (as trihydrate)

125 מ"ג חומצה קלואולאנית (כמלח אשלגן)

clavulanic acid (as potassium salt)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אוגמנטין משמשת במבוגרים ובילדים לטיפול בזיהומים הבאים:

- זיהומים באוזן התיכונה ובסינוסים
- זיהומים בדרכי הנשימה
- זיהומים בדרכי השתן
- זיהומים בעור וברקמות רכות לרבות זיהומים דנטליים
- זיהומים בעצמות ובמפרקים.

אוגמנטין היא אנטיביוטיקה הפעולת על ידי קטילת חיידקים הגורמים לziehomim. היא מכילה שתי תרופות שונות הנקראות אמוקסיצילין וחומצה קלואולאנית. אמוקסיצילין שייכת לקבוצת תרופות הנקראית "פניצילינים" שלעיתים פיעולותן יכולה להיפסק (להפסיק לבליתי פעילות). הרכיב הפעיל الآخر (חומצה קלואולאנית) מונע זאת מלהתרחש.

קבוצה Terapeutica

אמוקסיצילין: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים.

חומצה קלואולאנית: מעכבי האנזימים בטא-לקטמאז.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאמוקסיצילין, לחומצה קלואולאנית, לפניצילין או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6)
- הייתה לך אי פעם תגובה אלרגית חמורה לכל אנטיביוטיקה אחרת. זו יכולה לכלול פריחה בעור או נפיחות של הפנים או הגרון
- היו לך אי פעם בעיות בכבד או צחבת (הצבה של העור) בעקבות נטילת אנטיביוטיקה.

← **אל תikh אוגמנטין אם אחד מהלא חל עלייך.** אם אין בטוח, דבר עם הרופא או הרוקח לפני Nutzung אוגמנטין.

ażherot miyachdot haengutot leshimosh batrofah

דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אוגמנטים אם:

- יש לך מחלת הנשיקה
- הנר מקבל טיפול עקב בעיות בכבד או בכלייה
- איןך מטיל שtan בצורה תקינה.

אם איןך בטוח אם אחד מהלה חל עלייך, דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אוגמנטים. במקרים מסוימים, יתכן שהרופא יבדוק את סוג החידק הגורם לזיהום שלך. בהתאם לתוצאות, יתכן שיינתן לך חוזק אחר של אוגמנטים או תרופה אחרת.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם

אוגמנטין עלולה להחמיר מצבים קיימים מסוימים, או לגרום לתופעות לוואי חמורות. אלה כוללות תגבות אלרגיות, פרוכסיטים (עוינותות) ודלקת של המעי הגס. עלייך לשים לבתרסמים מסוימים בזמן שאתה לוקח אוגמנטין, כדי להפחית את הסיכון לתביעות כלשהן. ראה 'מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם' בסעיף 4'.

בדיקות דם ושtan

אם אתה עובר בבדיקות דם (כגון בבדיקות המעריכות את מצבไต הדם האדומים או בבדיקות לתקוף כבד) או בבדיקות שtan (לביקורת רמות גליקוז), ידע את הרופא שאתה לוקח אוגמנטין. זאת מושם שאוגמנטין יכולה להשפיע על התוצאות של בדיקות מסווגים אלה.

איןטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אם לוקחת לאחרונה או אם יתכן שתיקח תרופות אחרות כולל תרופות לא מרשם, טרופות חמימות ותוספי תזונה, ספר עלך לרופא או לרוקח.

- אם אתה לוקח אלופוריינול (המשמש לטיפול בשיגdon) עם אוגמנטין, יש סבירות גדולה יותר לך שתהיה לך תגובה אלרגית עורית.
- אם אתה לוקח פרובנץיד (המשמש לטיפול בשיגdon), יתכן שהרופא יחליט בהתאם את מינון האוגמנטין.
- אם תרופות מעכבות קרישת דם (כגון וארפין או אצנווקומארול) נלקחות עם אוגמנטין, יתכן שהיא צורך בבדיקות דם נוספת.
- אוגמנטין יכולה להשפיע על אופן פעילותה של מתוטרקסאט (תרופה המשמש לטיפול בסרטן או במחלות שגרוניות).
- אוגמנטין עלולה להשפיע על אופן פעילותה של מיקופנולאט מופטיל (תרופה המשמשת למניעת דחיה של איברים מושתלים).

הירון והנקה

אם את בהירון או מניקה, חשוב שתיקן שאתה בהירון או מתכנת להרות, לפני לרופא או לרוקח לקבלת ייעוץ לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונות

לאוגמנטין יכולות להיות תופעות לוואי והתסמיםعلולים לגרום לך להיות לא כשיר לנויה.

אל תnage או תפעיל מכונות אלא אם אתה מרגיש טוב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אוגמנטין 875 מ"ג טבליות מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבלייה ולכן נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתחום תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתחום. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מבוגרים וילדים השוקלים 40 ק"ג ומעלה

- המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבלייה 1 פעמיים ביום
- מינון גובה יותר: טבלייה 1 שלוש פעמיים ביום

ילדים השוקלים פחות מ-40 ק"ג

בילדים בני שעומטה, מומלץ לטפל בתרחיף אוגמנטיין דרך הפה. יש להתייעץ עם הרופא במקרה בו ניתנות טבליות לילדים השוקלים פחות מ-40 ק"ג. הטבליות אינן מתאימות לילדים השוקלים פחות מ-25 ק"ג.

לא קיימים נתונים קליניים עבור מטופלים מתחת לגיל חודשיים.

מטופלים עם בעיות כליות וכבד

- אם יש לך בעיות בכליות יתכן שהמנה תשתנה. יתכן שהחזק אחר או תרופה אחרת יבחרו על ידי הרופא.
- אם יש לך בעיות בכבד יתכן שתצטרכ לבעוד בדיקות דם תכופות יותר כדי לבדוק את תפקודו הכבד שלך.

אין עבור על המנה המומלצת.

איך לקחת אוגמנטיין

- יש לקחת עם הארוחה.
- יש לבלווע את הטבליות בשלמותן עם כוס מים.
- ניתן לחצוץ את הטבליות לאורך הקו המסומן כדי להקל על הבליעה. יש לקחת את שני חלקי הטבליה באותו הזמן. אין מידע לגבי כתישה ולעיסה.
- יש לחלק את המנות באופן שווה במהלך היום, לכל הפחות בהפרש של 4 שעות. אל תתיקח 2 מנות בשעה אחת.
- אין ליטול אוגמנטיין למשך יותר משבועיים. אם אתה עדיין מרגיש לא טוב, יש לפנות בחזרה לרופא.

אם לקחת בטיעות מינון גובה יותר

אם לקחת בטיעות יותר מדי אוגמנטיין, הסימנים עשויים לכלול אי נוחות בבטן (בחילה, הקאה או שלשול) או פרוכוסים. פנה לרופא בהקדם האפשרי. קח את אריזת התרופה כדי להראות לרופא.

אם בטיעות בלע ליד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ללקחת אוגמנטיין

- אם שכחת ללקחת מנה, קח אותה ברגע שאתה נזכר.
- אל תיקח את המנה הבאה מוקדם מדי, אלא המtanן כ-4 שעות לפני נטילת המנה הבאה. אין לקחת מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק ללקחת אוגמנטיין

המשר לחת אוגמנטיין עד לסיום הטיפול, אפילו אם אתה מרגיש טוב יותר. כל אחת מהמנות חשובה עבורך על מנת לעזור להילחם בזיהום. אם חלק מהחידקים שרדוו, הם יכולים לגרום לזיhom חזרה.

אין לטיפול רפואי בחושך! בדוק התוויות והמנה בכל פעע שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זוקם להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל רפואי, השימוש באוגמנטיין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הלואוי. יתרון שלא תסבול מכך אחד מהן. תופעות הלואוי בהמשך עשויות להת%">תרחש עם רפואי זה.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם:

תגובה אלרגיות:

- פריחה בעור
- דלקת של כלי דם (ואסקוליטיס) אשר עשויה להראות ככתמים אדומים או סגולים בולטים על העור, אך יכולה להשפיע על אזורים אחרים של הגוף
- חום, כאב פרקים, בלוטות נפוחות בצוואר, בית שחי או במפשעה
- נפיחות, לפעים של הפנים או האגרון (אנגיאדמה), הגורמת לקשיי נשימה
- התמוניות
- כאבים בחזה הקשורים לתגובה אלרגית עשויים להיות תסמינים של אוטם שריר הלב המשופעל על ידי אלרגיה (تسمונת קונייס – *Kounis syndrome*).

← פנה מיד לרופא אם אתה חווה אחד מתסמינים אלה. **פסיק לחת אוגמנטיין.**

דלקת של המעי הגס

דלקת של המעי הגס, גורמת לששלול מימי המלווה בדרך כלל בדם וריר, לכאוב בטן ו/או לחום.

تسمונת אנטרוכוליטיס (דלקת במעי) הנגרמת על ידי רפואי (DIES)

DIES דווחה בעיקר בילדים שקיבלו אמוקסיצילין/חומרה קלואולאנית. זהו סוג מסוים של תגובה אלרגית עם תסמין עיקרי של הקאות חוזרות ונשנות (1-4 שעות לאחר מתן הטיפול). תסמינים נוספים יכולים לכלול כאב בטן, עייפות (ישנוונות), שלשול ולחץ דם נמר.

דלקת חריפה של הלבלב (acute pancreatitis)

אם יש לך כאבים עזים ומתחשים באזורי הבطن זה יכול להיות סימן לדלקת לבלב חריפה.
← פנה לרופא בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ אם אתה חווה תסמינים אלה.

תופעות לוואי לפי שכיחותן:

תופעות לוואי שכיחות מודר

אליה עשויות להופיע ביותר מ-1 מכל 10 אנשים
• שלשול (במבוגרים).

תופעות לוואי שכיחות

אליה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים

• פטרת (קנדידה - זיהום פטריאתי של הנרתיק, הפה או קפלי העור)

- בחילה, בעיקר כאשר לוקחים מינון גבוה
 - ← אם הופעה בחילה, קח אוגמנטין עם הארוונה.
 - הקאה
 - שלשול (בילדים).

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אליה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים

- פריחה בעור, גרד
- פריחה בולטת מגרדת (חרלה)
- בעיות עיכול
- סחרחות
- כאב ראש.

תופעות לוואי שאינן שכיחות העשוות להופיע בבדיקות הדם שלך:

- עליה באנזימי כבד.

תופעות לוואי נדירות

אליה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים

- פריחה בעור, שעשויה לכלול שלפוחיות (שנראות כמו כתמים כהים במרכז המוקפים באזורה חיוור, עם טבעת כהה מסביב לשולדים - אדמנת רב צוותית *erythema multiforme*).

← אם אתה מבחין באחד מתסמיניהם אלה פנה לרופא בדחיפות.

תופעות לוואי נדירות העשוות להופיע בבדיקות הדם שלך:

- מספר נמוך של תאים המעורבים בקרישת הדם
- מספר נמוך של תא דם לבנים.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (לא ניתן לדעת את השכיחות מתוך הנתונים הקיימים)

- תגובות אלרגיות (ראה לעיל)
- דלקת של המעי הגס (ראה לעיל)
- תסמונת אנטרוכוליטיס (דלקת במעי) הנגרמת על ידי תרופות (DIES) (ראה לעיל)
- דלקת חריפה של הלבלב (*acute pancreatitis*) (ראה לעיל)
- דלקת הקרום העוטף את המוח וחוטו השדרה (מנינגיטיס אספטי)
- תגובות עוריות חמורות:

- פריחה מפושחת עם שלפוחיות ועור מתקלף, בעיקר סביבת הפה, האף, העיניים ואיברי המין (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון), ותופעה חמורה יותר, הגורמת לקילוף נרחב של העור (יותר מ-30% משטח הפנים של הגוף - טוקסיק אפיזרמל נקרוליזיס)

- פריחה אדומה מפושחת בעור עם שלפוחיות קטנות המכילות מוגלה (*bullous exfoliative dermatitis*)

- פריחה אדומה קשחת עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות (*exanthematous pustulosis*)

- תסמינים דמיי שפעת עם פריחה, חום, בלוטות נפוחות, ותוצאות בדיקות דם חריגות (כולל עליה בכמות תא הדם הלבנים [אוזינופיליה] ואנזימי הכבד) (תגובה לתרופה הכוללת אוזינופיליה ותסמינים מערכתיים [*DRESS*])

- פריחה המאפיינת בשלפוחיות הממוקמות סביב גלד מרכזי או דמוית מחרצת

פנינים (מחלת A9 ליניארית).

←

- פנה מיד לרופא אם אתה חווה אחד מטעמים אלה.**
- דלקת של הכבד (*הפטיטיס*)
 - צהבת, הנגרמת על ידי עליה של בילירוביין (חומר הנוצר בכבד) בدم שעלולה לגרום להצחבות העור ולובן העין
 - דלקת של צינורות הכליה
 - זמן קרישת דם מוארך
 - פעולטנות יתר (היפראקטיביות)
 - פרוכוסים (באנשים הולוקחים מנות גדולות של אוגמנטים או שיש להם בעיות בבליה)
 - לשון שחורה הנראית שעירה.

תופעות לוואי העשוויות להופיע בבדיקות הדם או השתן שלך:

- ירידת חמורה במספר תאי דם לבנים
- מספר נמוך של תאי דם אדומים (אגמיה המוליטית)
- גבישים בשתן המובילים לפגיעה חמורה בклיוות.

אם הופעת תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המכוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לkishor:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C.
- יש להשתמש בטבליות המספקות בעטיפה אלומיניום תוך 30 יום מפתיחת העטיפה.
- אחסון באזירה המקורית כדי להגן מפני לחות.
- אין להשתמש אם הטבליות סדוקות או פגומות.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- מה מכילה אוגמנטים:
 - נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם -
 - ליבת הטבליה -

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (Type A), magnesium stearate and colloidal anhydrous silica.

Hypromellose (5 cps, 15 cps), titanium dioxide (E171), macrogol (4000, 6000) and dimeticone.

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizוה:
אוגמנטין 875 מ"ג טבליות מצופות הן בין צבע לבן לאוף וויט, בצורת קפסולה, מוטבעות עם "AC" וקו ח齊יה הצד אחד.
הן אריזות ב:
 - אריזות בליסטר באrizת קרטון. כל קרטון מכיל 14 טבליות או 2, 4, 10, 12, 16, 20, 30, 100 או 500 טבליות.
או
 - אריזות הבליסטר בתוך עטיות אלומיניום, סגורות באrizת קרטון. העטייה מכילה שקיק סופח לחות. יש לשמור את השקיק סופח הלחות בתוך העטייה ואין לבלווע אותו. כל קרטון מכיל 14 טבליות.
יתכן שלא כל גדיי האrizות משוקים.
- **בעל הרישום:** גלקסוסמיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- **יצרן:** גלקסוסמיטקלין טריידיניג סרבריסס לימייד, דבלין, אירלנד.
- נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות: 107-43-28610
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 107-43-28610
- לשם הפטשות ולהקלת הקיראה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.
- סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיונות של קבוצת החברות של GSK. © 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Aug Tab 875 PT v10A