

أوچمنتين 875 ملغ أقراص

أقراص مطالية.

يحتوي كل قرص على: 875 ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريهيدرات)

amoxicillin (as trihydrate)

125 ملغ حمض كلافلانيك (على شكل ملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

لائحة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر، انظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل أوچمنتين لدى الكبار والأطفال لعلاج التلوثات التالية:

- تلوثات في الأذن الوسطى والجيوب الأنفية
- تلوثات في الطرق التنفسية
- تلوثات في المسالك البولية
- تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة بما في ذلك التلوثات في الأسنان
- تلوثات في العظام والمفاصل.

أوچمنتين عبارة عن مضاد حيوي الذي يعمل بواسطة إبادة الجراثيم المسببة للتلوثات. فهو يحتوي على دوائين إثنين مختلفين يسميان أموكسيسيلين وحمض كلافلانيك. ينتمي أموكسيسيلين لفصيلة الأدوية المسماة "پينيسيلينات" التي يمكن أن يتوقف عملها أحياناً (تصبح غير فعالة). إن المركب الفعال الآخر (حمض كلافلانيك) يمنع حدوث هذا الأمر.

الفصيلة العلاجية

أموكسيسيلين: مضاد حيوي من فصيلة الپينيسيلينات.

حمض كلافلانيك: مثبطات الإنزيم بيتا - لاكتاماز.

(2) قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (أليرجي) لـ أموكسيسيلين، لحمض كلافلانيك، لپينيسيلين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6)
 - حدث لديك ذات مرة رد فعل تحسسي خطير لأي مضاد حيوي آخر. ذلك قد يشمل طفح في الجلد أو إنتفاخ الوجه أو الحنجرة
 - حدث لديك ذات مرة مشاكل في الكبد أو يرقان (اصفار الجلد) عند تناولك لمضاد حيوي.
- ← لا تتناول أوچمنتين إذا إنطبق عليك واحد مما ذكر. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوچمنتين.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

تحذث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوجمانتين إذا:

- وُجد لديك مرض القبلة

- كنت تناهى علاجاً جراء مشاكل في الكبد أو الكلية

- كنت لا تتبول بشكل سليم.

إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان ينطبق عليك واحد مما ذكر، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أوجمانتين.

في حالات معينة، من الجائز أن يفحص الطبيب نوع الجرثومة المسببة للتلوث لديك. وفقاً للنتائج، من الجائز أن يعطى لك أوجمانتين من عيار آخر أو دواء آخر.

حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها

قد يؤدي أوجمانتين إلى تفاقم حالات معينة موجودة، أو يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة. تشمل هذه ردود فعل تحسسية، إختلاجات (تشنجات) وإلتهاب الأمعاء الغليظة. عليك الإنتباه لأعراض معينة خلال فترة تناولك لـ أوجمانتين، لتقليل خطورة حدوث أية مشاكل. انظر 'حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها' في الفقرة 4.

فحوص الدم والبول

أعلم الطبيب بأنك تتناول أوجمانتين، وذلك إذا كنت تتجاوز فحوص الدم (مثل فحوص تقييم حالة خلايا الدم الحمراء أو فحوص لوظائف الكبد) أو فحوص البول (فحص نسب الجلوكوز). وذلك لأن أوجمانتين يمكن أن يؤثر على نتائج فحوصات من هذا النوع.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، إذا تناولت مؤخراً أو إذا كان من الجائز أن تتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، أدوية نباتية وإضافات غذائية، إحكِ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

- إذا كنت تتناول ألوپورینول (يستعمل لعلاج النقرس) مع أوجمانتين، فهناك إحتمال أكبر بأن تعاني من رد فعل تحسسي جلدي.

- إذا كنت تتناول پروبينيسيد (يستعمل لعلاج النقرس)، فمن الجائز أن يقرر الطبيب ملائمة الجرعة الدوائية من أوجمانتين.

- إذا تم تناول أدوية تثبط تخثر الدم (مثل وارفارين أو أسينوكومارول) مع أوجمانتين، فمن الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص دم إضافية.

- يمكن أن يؤثر أوجمانتين على طريقة عمل ميتوتريكسات (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).

- قد يؤثر أوجمانتين على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل والإرضاع

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، تعتدين بأنه من الجائز أنك حامل أو تخططين للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي لتناهى إستشارة قبل تناول هذا الدواء.

السيادة وإستعمال الماكنت

يمكن أن يسبب أوجمانتين أعراضًا جانبية حيث أن هذه الأعراض قد تجعلك غير قادر على السيادة.
لا تقدِّ أو تشغِل الماكنت إلا إذا كنت تشعر بشكل جيد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي أوجمانتين 875 ملغ أقراص على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول (23 ملغ) صوديوم في القرص وبالتالي يعتبر خالٍ من الصوديوم.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر بحسب تعليمات الطبيب دائمًا. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بشأن الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

الكبار والأطفال الذين يزنون 40 كيلو وأكثر

- الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة: قرص 1 مرتين في اليوم
- جرعة دوائية أكبر: قرص 1 ثلاثة مرات في اليوم

الأطفال الذين يزنون أقل من 40 كيلو

يوصى بعلاج الأطفال بعمر 6 سنوات وما دون ذلك بواسطة ملعقة أو قصمتين عن طريق الفم. يجب إستشارة الطبيب في حال إعطاء أقراص لأطفال يزنون أقل من 40 كيلو. إن الأقراص غير ملائمة للأطفال الذين يزنون أقل من 25 كيلو.

لا تتوفر معطيات سريرية بخصوص متعالجين دون عمر شهرين.

متعالجون لديهم مشاكل في الكلى والكبد

- إذا وُجدت لديك مشاكل في الكلى فمن الجائز أن يتم تغيير الجرعة الدوائية. من الجائز أن يختار الطبيب عيار آخر أو دواء آخر.
- إذا وُجدت لديك مشاكل في الكبد فمن الجائز أن تحتاج إلى إجراء فحوص دم بتواتر أكبر وذلك لفحص وظائف كبدك.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

كيفية تناول أو قصمتين

- يجب التناول مع وجبة الطعام.
- يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء.
- بالإمكان شطر الأقراص على طول الخط المعلم من أجل تسهيل البلع. يجب تناول قسمٍ القرص في نفس الوقت. لا تتوفر معلومات بشأن السحق والمضغ.
- يجب توزيع الجرعات الدوائية بشكل متساوٍ خلال اليوم، بفواصل زمني قدره 4 ساعات على الأقل. لا تتناول جرعتي دواء خلال ساعة واحدة.
- لا يجوز تناول أو قصمتين لمدة تزيد عن أسبوعين. عليك العودة لمراجعة الطبيب، إذا ما زلت تشعر بسوء.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا تناولت بالخطأ أكثر مما ينبغي من أو قصمتين، فإن العلامات قد تشمل إنزعاج في البطن (غثيان، تقيؤ أو إسهال) أو إختلالات. توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن. وخذ معك علبة الدواء لتريها للطبيب.

إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر علبة الدواء معك.

إذا نسيت تناول أو قصمتين

- إذا نسيت تناول جرعة دوائية، فتناولها لحظة تذكرك بذلك.
 - لا تتناول الجرعة الدوائية التالية أكبر مما ينبغي، بل انتظر 4 ساعات تقريباً قبل تناول الجرعة الدوائية التالية.
- لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتغويض عن الجرعة الدوائية المنسية.
- يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول أو قصمتين

حتى ولو شعرت بشكل أفضل، عليك مواصلة تناول أو قصمتين إلى إنتهاء العلاج. كل جرعة دوائية من الجرعات الدوائية هي مهمة من أجلك للمساعدة على محاربة التلوث. إذا بقيت بعض الجراثيم على قيد الحياة، فإمكانها التسبب في عودة التلوث.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أوجمنتين قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعانى أيًّا منها. الأعراض الجانبية المذكورة لاحقًا من شأنها أن تحدث عند إستعمال هذا الدواء.

حالات يتوجب عليك الانتباه إليها:

ر دو د فعل تحسیة:

- التهاب الأوعية الدموية (*vasculitis*) الذي من شأنه أن يبدو كبقع حمراء أو بنفسجية بارزة على الجلد، لكنه قد يؤثر على مناطق أخرى من الجسم
 - سخونة، ألم في المفاصل، إنتفاخ الغدد في الرقبة، الإبط أو في منفرج الرجلين
 - إنفاس، أحياناً في الوجه أو الحنجرة (ونمة وعائية)، الذي يؤدي لصعوبات في التنفس
 - إنها
 - آلام في الصدر مرتبطة برد فعل تحسسي من شأنها أن تكون أعراضًا لإحتشاء عضلة القلب الذي يتم تنشيطه جراء الحساسية (متلازمة كونس - *Kounis syndrome*).

→ توجه الـ، الطيب فوراً إذا كنت تقاسي من احدى تلك الأعراض. توقف عن تناول أو حمّتين.

التهاب الأمعاء الغليظة

٦- التهاب الأمعاء الغلظة إلى، إسحاق مائة، الذي ينـاـفـق عادة بـدـم وـمـخـاط، وـالـأـلم فـيـ الـبـطـن وـأـوـسـخـونـة.

(DIES) متلازمة الالتهاب المعوي القولوني (التهاب في الأمعاء) الناجمة عن الأدوية

DIES خاصة لدى أطفال تلقوا أموكسيسيلين/حمض كلافولانيك. يعتبر ذلك نوع معين لرد فعل تحسسي والذى يتراافق بعرض رئيسى من التقيؤات المتكررة (4-11 ساعات بعد إعطاء الدواء). أعراض إضافية يمكن أن تشمل ألم في البطن، إرهاق (ميل للنوم)، إسهال وإنخفاض ضغط الدم.

(acute pancreatitis)

إذاً وجدت لديك آلام شديدة ومستمرة في منطقة البطن فإن ذلك قد يكون علامة لإلتهاب حاد في البنكرياس.

→ توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن لتقديم إستشارة وذلك إذا كنت تقابلي من تلك الأعراض.

أعراض جانبية وفق شيوعها:

أعراض جانبية شائعة جداً

قد تظهر هذه لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص

• إسهال (لدى الكبار).

أعراض جانبية شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص

- فطر (المبيضات - تلوث فطري في المهبل، الفم أو ثنایا الجلد)

٠ غثيان، خاصة عند تناول جرعة دوائية مرتفعة

← إذا ظهر غثيان، تناول أوّل حمّتين مع وجبة الـ

• نفيؤ

اسھال

أعراض جانبية غير شائعة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 100 شخص

- طفح جلدي، حكة

- طفح بارز وحاذ (شرى)

- مشاكل هضمية

- دوار

- صداع.

أعراض جانبية غير شائعة التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم لديك:

- ارتفاع في إنزيمات الكبد.

أعراض جانبية نادرة

قد تظهر هذه لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص

- طفح جلدي، الذي من شأنه أن يشمل حويصلات (التي تبدو مثل بقع داكنة في المركز محاطة بمنطقة شاحبة، مع

حفة داكنة حول الأطراف - حمامي متعددة الأشكال (*erythema multiforme*).

← إذا لاحظت إحدى تلك الأعراض توجه إلى الطبيب بشكل عاجل.

أعراض جانبية نادرة من شأنها أن تظهر في فحوص الدم لديك:

- قلة عدد الخلايا التي تشارك في تخثر الدم

- قلة عدد خلايا الدم البيضاء.

أعراض جانبية شيوخها غير معروفة (لا يمكن معرفة الشيوع من المعطيات المتوفرة)

- ردود فعل تحسسية (أنظر أعلاه)

• التهاب الأمعاء الغليظة (أنظر أعلاه)

- متلازمة الإلتهاب المعوي القولوني (التهاب في الأمعاء الناجمة عن الأدوية (DIES) (أنظر أعلاه)

• التهاب حاد في البنكرياس (*acute pancreatitis*) (أنظر أعلاه)

• التهاب الغشاء المحيط بالدماغ والحلق الشوكي (التهاب السحايا العقیم)

- ردود فعل جلدية خطيرة:

- طفح منتشر مع حويصلات وتقرش للجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس

- جونسون)، وعرض أكثر خطورة، الذي يؤدي إلى تقرش واسع للجلد (أكثر من 30% من مساحة سطح الجسم

- انحلال البشرة الناخر (السمي)

- طفح جلدي أحمر منتشر يتراافق بحويصلات صغيرة حاوية على قيح (*bullous exfoliative dermatitis*)

- طفح أحمر حرشفي يتراافق بنتوءات تحت الجلد وحويصلات (*exanthematous pustulosis*)

- أعراض شبيهة بالإنفلونزا تتراافق بطفح، سخونة، إنفصال في الغدد، ونتائج شاذة في فحوص الدم (بما في ذلك

ارتفاع كمية خلايا الدم البيضاء [*eosinophilia*] وإنزيمات الكبد) (رد فعل الدواء يشمل كثرة الحمضات

وأعراض جهازية [*DRESS*])

- طفح يتمثل بحويصلات تتوضع حول قشرة لجرح المندل في المركز أو شبه عقد اللؤلؤ (مرض IgA

الخطي).

← توجه إلى الطبيب فوراً إذا كنت تقاسي من إحدى تلك الأعراض.

- التهاب الكبد (*hepatitis*)

• يرقان، الذي ينجم عن ارتفاع في البيليروبين في الدم (مادة تُنتج في الكبد) الذي قد يؤدي إلى إصفرار الجلد وإصفرار

بياض العين

- التهاب أنابيب الكلية
- إطالة زمن تخثر الدم
- فرط نشاط (hyperactivity)
- إختلاجات (لدى الأشخاص الذين يتذمرون جرّاء دوائية مرتفعة من أوجمنتين أو لديهم مشاكل في الكلية)
- لسان أسود يبدو مليء بالشعر.

أعراض جانبية التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم أو البول لديك:

- إنخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء
- إنخفاض عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الإلتحالي)
- بلورات في البول التي تؤدي إلى تضرر شديد في الكلى.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبلیغ عن اعراض جانبية

بإمكان التبلیغ عن اعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبلیغ عن اعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلیغ عن اعراض جانبية، أو عن طريق تصفیح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

(5) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متداول أيدي و المجال رؤية الأطفال وأو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.
- يجب إستعمال الأقراص المزودة ضمن غلاف من الألومنيوم خلال 30 يوماً من فتح الغلاف.
- يجب التخزين في العلبة الأصلية للحماية من الرطوبة.
- لا يجوز إستعمال الأقراص إذا كانت متشقة أو معطوبة.
- لا يجوز إقاء الأدوية في المجاري أو في القمامنة المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الخطوات في الحفاظ على البيئة.

(6) معلومات إضافية

- على ماذا يحتوي أوجمنتين:
يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على -
نواة القرص -

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (Type A), magnesium stearate and colloidal anhydrous silica.

الطلاء -

Hypromellose (5 cps, 15 cps), titanium dioxide (E171), macrogol (4000, 6000) and dimeticone.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
أوچمنتين 875 ملغ أقراص مطلية لونها ما بين الأبيض وأوف وايت، على شكل كبسولة، مطبوع عليها "AC" وخط للشطر من جانب واحد.
هي معبأة ضمن:
- علب لوبيات (بليستر) ضمن علبة كرتون. تحتوي كل علبة كرتون على 14 قرصاً أو 2، 4، 10، 12، 16، 20، 24، 30، 100 أو 500 قرصاً.
أو
- علب اللوبيات داخل أغلفة من الألومنيوم، ضمن علبة كرتون. يحتوي الغلاف على كيس ماص للرطوبة. يجب حفظ الكيس الماص للرطوبة داخل الغلاف ولا يجوز بلعه. تحتوي كل علبة كرتون على 14 قرصاً.
من الجائز ألا تسوق كافة أحجام العلب.
- صاحب الإمتياز: چلاكسوسميٹكلاين (إسرائيل) م.ض، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: چلاكسوسميٹكلاين تريدينج سيرفيسيس ليميتد، دبلن، إيرلندا.
- تم إعدادها في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 107-43-28610
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
- العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK. © 2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Aug Tab 875 PT v10A