

نشرة للمستهك بموجب أنظمة الصيدالمة (مستحضرات) - 1986

الاستعمال في جيل 3-6 أشهر هو وفق وصفة طبيب فقط
فوق عمر 6 شهور - يُستَوق الدواء بدون وصفة طبيب

أبيو 2% للأطفال

معلق

التركيب

يحتوي كل 1 ملل على: إيبوبروفين (Ibuprofen) 20 ملغ
معلومات عن المواد غير الفعالة والمثيرة للحساسية، انظر البند 2 "معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء" والبند 6 - "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتعمّن حتى نهايتها وذلك قبل البدء باستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي. عليك استعمال الاستعمال وفقاً للتعليمات وفقاً للمقدار الدوائي في هذه النشرة.
استشر الصيدلي إذا كنت بحاجة لمعلومات إضافية. يجب عليك التوجه للطبيب إذا تفاقت أعراض المرض أو إذا تفاقم بعد مرور 24 ساعة لدى الرضع بأعمار 3-6 شهور أو بعد مرور 3 أيام لدى الأطفال بعمر 6 أشهر فما فوق.
لا لرضع بأعمار 3-6 شهور هو بموجب وصفة طبيب. هذا الدواء ملائم لمعظم الرضع ما فوق عمر 3 شهور، للأطفال وللبالغين.
استعمال اللرضع بأعمار 3-6 شهور هو بموجب وصفة طبيب. يجب التوجه للطبيب إذا كان طفلك يتناول الأسبيرين بمقدار دوائي فوق 75 ملغ في اليوم أو إذا تطوّرت لدى طفلك طغح جلدي، صعوبات في التنفس، إسهال أو إرهاب متزايد.

- لم أعد الدواء؟**
12 شهر وحتى سنة (الذين يبلغ وزنهم 40 كغم تقريباً).
النصيلة العلاجية: مساعدات التهاب غير الستيرويديّة (NSAIDs).
- قَبِل استعمال الدواء**
يلائم هذا الدواء معظم الأشخاص لكن على أشخاص معينين الامتناع عن استعماله. استشر الصيدلي أو الطبيب إذا لم تكن واثقًا.

يُمنَع استعمال الدواء إذا:

- كنت أنت أو طفلك حساسين (البرجي) - لإيبوبروفين أو لكل واحد من المركّبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر البند 6).
- كان لديك أو لدى طفلك ردود فعل تحسسية (مثل ربو، التهاب الأنف (Rhinitis)، انفتاحات تحت جلدية (وذمة وعائية) أو شرى (urticaria) نتيجة تناول إيبوبروفين، حمض الأسيتيل ساليسيليك (اسبيرين) أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير ستيرويديّة (NSAIDs).
- كان لديك أو لدى طفلك (أو سبق وكان لديك أو لدى طفلك) قرحة/نزيف في المعدة (حشاش واضمان أو أكثر مثبتيين).
- كنت قد عانيت أو إذا كان طفلك قد عانى في السابق من نزيف أو تقيّب في الجهاز الهضمي (الذآن يتعلقن بعلاج سابق بأدوية مضادة للالتهاب غير ستيرويديّة (NSAIDs).
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من قصور حاد في الكبد، في الكلى أو قصور في القلب.
- كنت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل.

تحذيرات خاصّة متعلّقة باستعمال الدواء

قبل بدء العلاج بـ **أبيو 2% للأطفال أعلم الطبيب إذا:**

كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني أو عانيتما في السابق من ارتفاع ضغط الدم، مشاكل في القلب أو **سكّته دماغية**، لأنّ هنالك ارتفاع طفيف في الخطورة لحدوث مشاكل في القلب عند استعمال إيبوبروفين.

- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من عامل خطورة **لمشاكل في القلب**، مثل السكري أو **نسب كولسترول مرتفعة**.
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من **الربو** أو من أي مرض **تحسّسي في الرئتين**.
- كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني أو عانيتما في السابق من **مشاكل في الكبد، الكلى، القلب أو الأمعاء**.

كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من الجفاف، لأنه هنالك خطورة لحدوث مشاكل في الكلى.
كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من **الذئبة الحُمّامية الجهازية (SLE)**، مرض متعلق بالمناعة الذاتية) أو من مرض آخر مشابه.

يوصى بتجنّب استعمال الدواء خلال الفترة الزمنية التي يتواجد فيها **الحُمّاق (Varicella)**. **توجد عدوى لدى المريض** - نظراً إلى أنّ هذا الدواء ممكن أن يخفي علامات عدوى مثل التهاب وتقرحي في الأمعاء الغليظة (التهاب القولون التقرحي).
كنت تعاني أو إذا كان طفلك يعاني من مشكلة وراثية تتعلق في التعامل مع الفركتوز/سكر الفاكهة (عدم تحمّل وراثي للفركتوز). لأنّ الجسم يستطيع أن ينتج قليلا من الفركتوز من المركب مالتيتول.

يوصى بتجنّب استعمال الدواء خلال الفترة الزمنية التي يتواجد فيها **الحُمّاق (Varicella)**. **توجد عدوى لدى المريض** - نظراً إلى أنّ هذا الدواء ممكن أن يخفي علامات عدوى مثل سخونة وآلم. لذلك من المحتمل أن يعيق هذا الدواء العلاج المناسب للعدوى، مما قد يؤدي إلى خطورة متزايدة لحدوث مضاعفات. وتوهّد هذا الأمر في حالة التهاب الرئوي الناجم عن جراثيم وحالات عدوى جلدية جرثومية المتعلّقة بالحُمّاق (جدرى الماء). إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان هذا الدواء خلال وجود عدوى واستمرت أعراض العدوى أو تفاقمّت، عليك استشارة طبيب دون تأجيل.

ردود فعل جلدية - تمّ التبليغ عن ردود فعل جلدية حادة تتعلق بالعلاج بهذا الدواء. يجب عليك التوقف عن تناول/إعطاء الدواء والتوجه فوراً للحصول على علاج طبي إذا تطوّر لديك أو لدى طفلك طفح جلدي، آفات في الأنسجة المخاطية، حويصلات أو علامات أخرى من الحساسية، لأنّ هذه ممكن أن تكون العلامة الأولى لرد فعل جلدي خطير جدًا. انظر البند 4.

تحذيرات إضافية

تتطرق التحذيرات التالية بالأخص للبالغين. على كل حال، قم بأخذها بعين الاعتبار قبل إعطاء أو تناول هذا الدواء:
للأدوية مثل **أبيو 2%** للأطفال، قد تكون هنالك علاقة مع ارتفاع طفيف بخطورة حدوث نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب) أو سكّته دماغية. احتمال حصول آية خطورة يرتفع مع تناول مقادير دوائية مرتفعة ومع العلاج المتواصل. لا يجوز تحطّي المقدار الدوائي أو فترة العلاج الموصى بهما.
إذا كنت تعاني من مشاكل في القلب، تعرّضت لسكّته دماغية أو كنت تعتقد أنك عرضة لخطر حدوث هذه الحالات (مثلاً إذا كنت تعاني من ضغط دم مرتفع، من السكري أو من نسب كولسترول مرتفعة أو إذا كنت مدخنًا)، عليك التحدّث مع الطبيب أو الصيدلي فيما يتعلّق بالعلاج.

إذا كنت مسنًا استشر الطبيب قبل استعمال الدواء.

يجب أن تُخبر الطبيب فوراً إذا:

لم تتخفّ الأعراض لدى طفلك بشكل سريع أو إذا **تفاقمّت**.
لم تكن واثقًا ما هو مرض طفلك أو إذا كان المرض مصحوبًا بطفح جلدي، صعوبات في التنفس، إسهال أو إرهاب متزايد.

تفاعلات/ردود فعل بين الأدوية:

إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان، أو إذا تناولتما **موخّرًا**، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبيب ومكملات غذائية، أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك، وبشكل خاص، إذا كنت أنت أو طفلك تتناولان:

- أدوية أخرى التي تحتوي على **إيبوبروفين** أو أدوية أخرى مضادة للالتهاب غير ستيرويدية، يشمل تلك التي يمكنك الحصول عليها بدون وصفة طبيب
- أسبيرين بمقدار دوائي **منخفض** (حتى 75 ملغ لليوم)
- مدرات البول (تساعد على التبول)
- مضادات **التخثر** (أدوية مسيلة للدم مثل وارفارين)
- أدوية لعلاج **ضغط الدم المرتفع** (مثل كابتوبريل، أتانولول، لوسارتان)
- لينيتيوم (لاضطرابات المزاج)
- ميثوتريكسات (المسحّفة، التهاب المفاصل وأنواع من السرطان)
- زيدوفودين (للـ HIV، فيروس نقص المناعة البشري)
- كورتيكوستيرويدات (دواء مضاد للالتهاب)
- جليكوزيدات القلب (لمشاكل القلب)
- سيكلوسبورين أو تاكلوريموس (لمنع رفض الأعضاء بعد زرعها)
- ميغيفيرستون (إنهاء الحمل)
- مضادات حيوية من مجموعة **الكينولونوات** (الحالات العدوى)
- أدوية **مضادة للكتئاب** من مجموعة **SSRI**
- أدوية **مضادة لصفائح الدم** مثل ديبيريديمول، كلويدوجريل

إذا لم تكن واثقًا أيًا **أصناف** من **الأدوية** يتناول طفلك، **أعرض الدواء على الطبيب أو الصيدلي.**

استعمال الدواء والطعام:

بإمكان المتعلّجين ذوي معدة حساسة استعمال الدواء مع أو بعد وجبة الطعام.

الحمل والإرضاع والخصوبة:

- قد تُسبّب هذا المستحضر عرض جانبي محتمل الذي قد يؤدي إلى إصابة في الكلى لدى الجنين ونقص في السائل الأمنيوسي، ابتداءً من الأسبوع 20 للحمل. يوصى بالامتناع عن استعمال مستحضرات من عائلة NSAIDs ابتداءً من الأسبوع 20 للحمل واستشارة شخص من الطاقم الطبي عند الزوم.
- يجب استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء خلال الأشهر الـ 6 الأولى من الحمل.
- لا يجوز استعمال **أبيو 2%** للأطفال إذا كنت في الأشهر الـ 3 الأخيرة من الحمل.

الإرضاع

في بعض الأبحاث، وجدت تراكيز منخفضة جدًا من إيبوبروفين في حليب الأم، لكن ليس محتملًا أن يكون لهذه الكميات تأثير على الطفل الرضيع.

الخصوبة

ينتمي إيبوبروفين لفصيلة من الأدوية التي قد تسبب ضررًا في الخصوبة لدى النساء. هذا الأمر قابل للإنعكاس مع التوقف عن استعمال الدواء. ليس من المحتمل أن يؤثر استعمال هذا الدواء من حين لآخر على احتمالات حصول حمل لديك، مع ذلك، أخبري طبيبكِ قبل استعمال الدواء إذا كنت تعائين من صعوبات في أن تحملي.

السيولة واستعمال الماكينات:

من غير المتوقع وجود تأثيرات على الفترة على السياقة وتشغيل الماكينات بالمقايير الدوائية وبفترة العلاج الموصى بهما.

معلومات مهمة عن قسم من مركبات الدواء:

- مالتيتول** - يحتوي الدواء على مالتيتول. إذا أخبرك الطبيب بأنك أنت أو طفلك تعائين من عدم قدرة تحمل لسكريات معينة، يجب عليك استشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
يحتمل أن يكون لـ مالتيتول تأثير بحيث يسبب إسهالًا خفيفًا.
- قيمة السرعات الحرارية لـ مالتيتول: 2.3 كيلوكالوري/غرام.
- صوديوم** - يحتوي هذا الدواء على 17.92 ملغ صوديوم (المركّب الأساسي في ملح الطعام) في 5 ملل، ما يعادل 0.9% من الكميّة القصوى اليومية من الصوديوم الموصى باستهلاكها للشخص البالغ.
- بنزوات الصوديوم** - يحتوي هذا الدواء على 5 ملغ بنزوات الصوديوم في 5 ملل. قد يؤدي إلى إصفرار الجلد والعينين لدى الرّضع (حتى عمر 4 أسابيع).
- بروبيلين جليكول** - يحتوي هذا الدواء على 0.0035 ملغ بروبيلين جليكول في 5 ملل.
- كحول بنزيلي** - يحتوي هذا الدواء على 0.0008 ملغ كحول بنزيلي في 5 ملل.
 - قد يسبب الكحول البنزيلي إلى:
 - ردود فعل تحسسية
 - خطر ظهور أعراض جانبية حادة التي تشمل مشاكل تنفّس لدى الأطفال (gaspng syndrome)
 - يُمنَع استعماله لدى الأطفال الرضع (حتى عمر 4 أسابيع) إلا بتوصية من طبيب
 - يُمنَع استعماله لمدة أكثر من أسبوع لدى الأطفال (دون عمر 3 سنوات)، إلا بتوصية من طبيب بسبب ارتفاع خطورة حدوث تراكم للحمأة في أجسامهم
 - يجب استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا كنت حاملا أو مرضعة أو إذا كنت تعائين من أمراض في الكبد أو في الكلى، لأن كميات كبيرة من الكحول البنزيلي ممكن أن تتراكم في جسمك وأن تؤدي إلى أعراض جانبية (التي تدعى "حمّاض استقلابي")

3. كيف تستعمل الدواء؟

يجب عليك التحدّث مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا فيما يتعلّق بالجرعة وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة المُتّبعة، عادة، هي:

5-10 ملغ لكل كغم كل 6 إلى 8 ساعات حتى 4 مرات في اليوم كحد أقصى وفي فواصل زمنية لا تقل عن 4 ساعات بين جرعة لأخرى. يُمنَع تجاوز مقدار دوائي قدره 40 ملغ لكل كغم في الـ 24 ساعة. المقدار الدوائي الأقصى ما فوق عمر 12 سنة هو 1200 ملغ في الـ 24 ساعة.

قائمة المقادير الدوائية بصحس الوزن

وزن (كغم)	مقدار دوائي	عدد المرات خلال 24 ساعة
دون 5 كغم	بموجب وصفة طبيب	
5-4	2 ملل	3-4
5.5-8.1	2.5 ملل	3-4
8.2-10.9	3.75 ملل	3-4
11-15	5 ملل	3-4
16-21	7.5 ملل	3-4
22-26	10 ملل	3-4
27-32	12.5 ملل	3-4
33-43	15 ملل	3-4

جدول مقادير دوائية بحسب العمر

العمر (سنوات)	مقدار دوائي	عدد المرات خلال 24 ساعة
	وفقًا لـ ملل لاستعمال محقّنة	
	قياس	
3-6 شهور	بموجب وصفة طبيب	
6-11 شهرًا	2.5 ملل	3-4
12-23 شهرًا	3.75 ملل	3-4
2-3	5 ملل	3-4
4-5	7.5 ملل	3-4
6-8	10 ملل	3-4
9-10	12.5 ملل	3-4
11-12	15 ملل	3-4

بمكّن للأطفال بأعمار متماثلة أن يكونوا بأوزان مختلفة **بشكل ملحوظ**.

لذلك يجب الاجتهاد والاستفسار بالنسبة لوزن الطفل وتحديد مقدار دوائي وفقًا لجدول الأوزان. فقط في حال وجود إمكانية للاستفسار بشأن وزن الطفل، يمكن تحديد المقدار الدوائي حسب هذا الجدول.

يُمنَع إعطاء الأطفال دون عمر 3 شهور. الأطفال بعمر 3-6 أشهر أو الذين يزنون أقل من 5 كغم، يكون الاستعمال بموجب وصفة طبيب. من عمر 6 أشهر وما فوق يكون الاستعمال دون وصفة طبيب.

إذا كان معروفًا لك وزن الطفل - يجب إعطاء المقدار الدوائي كما هو ظاهر في جدول الوزن الذي يشير إلى المقدار الدوائي بحسب الوزن.

فقط في حال لم يكن معروفًا لك وزن الطفل - يتمّ تحديد المقدار الدوائي بحسب العمر كما يظهر في جدول الأعمار الذي يشير إلى المقدار الدوائي بحسب عمر الطفل.

تحذير: لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

مدة العلاج

للاستعمال للمدى القصير فقط.

لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من 24 ساعة لدى الرضع بأعمار 3-6 شهور. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 24 ساعة أو إذا تفاقمّت، يجب استشارة الطبيب.

لا يجوز استعمال هذا الدواء لأكثر من 3 أيام لدى الأطفال من عمر 6 شهور فما فوق. إذا استمرت الأعراض لأكثر من 3 أيام أو إذا تفاقمّت، يجب استشارة الطبيب. يجب تناول أقل جرعة ممكنة لأصغر فترة ممكنة من أجل تخفيف الأعراض.

استشر طبيب دون تأخير إذا كان طفلك يتناول هذا الدواء أثناء وجود عدوى لديه، وأعراض هذه العدوى استمرت أو تفاقمّت.

طريقة تناول الدواء

يجب دائمًا خضّ القئينة جيدًا قبل الاستعمال.

طريقة الاستعمال:

- تحتوي العبوة على محقّنة لقياس جرعة دوائية حتى 5 ملل.
- يجب عليك استعمال محقّنة القياس الزرققة، لقياس الكمية الصحيحة من الدواء. لا يجوز استعمال ملقحة صغيرة بيئية من أجل قياس كمية الدواء. الملاقع الصغيرة البيئية تختلف بأحجامها ويحتمل ألا تحصل على كمية الدواء الصحيحة.
- أدخل المحقّنة داخل الفوهة الخاصة الموجودة في عنق القئينة.
- لتعبئة المحقّنة، اقلب القئينة. اسحب المكبس بلطف نحو الأسفل وأنت محافظ على ثبات المحقّنة في مكانها، من أجل سحب الدواء حتى الإشارة الملائمة على ظهر المحقّنة. انظر جداول المقادير الدوائية.

- عند الانتهاء من تعبئة المحقّنة، اقلب القئينة مجدّدًا، وحزّر المحقّنة بلطف.
- أدخل طرف المحقّنة إلى الفم (بتجاه الخد) وأفرغ محتواها ببطء وبلطف.
- بعد الاستعمال، يجب إغلاق القئينة جيّدًا، يجب فصل أجزاء المحقّنة، وغسلها بالماء الفاتر والصابون وتركيها لتجفّ.

إذا استعملت أو أعطيت لطفلك مقدارًا دوائيًا أكبر

إذا تناولت أو إذا تناول طفلك جرعة أكبر من المطلوب أو إذا قام طفل بإبتلاع كمية من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فورًا إلى الطبيب أو إلى المستشفى الأقرب من أجل الحصول على رأي أخصائي حول الخطورة والاستشارة بشأن التصرف الذي يجب اتخاذه.

قد تشمل الأعراض غثيان، ألم بطن، تقيؤ (قد تظهر كمية قليلة من الدم)، صداع، زرقين في العينين، ارتباك وحركة عيّن تنفضية.

بمقايير دوائية مرتفعة تمّ التبليغ عن لعاس، آلم في الصدر، نضبات قلب قوية، فقدان الوعي، تشنجات (خصوصًا لدى الأطفال)، وهن في نوم، وإسهال، دم في البول، شعور بالبرد في الجسم ومشاكل في التنفس.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت أن تعطي أو تتناول جرعة دوائية، أعط أو تناول الجرعة الدوائية التالية بحسب الحاجة، بشرط أن تكون قد مرّت 4 ساعات من موعد تناول الجرعة السابقة. **يُمنَع إعطاء أو تناول جرعة دوائية مضاعفة.**

يُمنَع تناول الدواء في الظلام تتحقّق من الملتصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الدوائية **في كل مرة تتناول فيها دواء.** ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية بالنسبة إلى استعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كجميع الأدوية، قد يسبّب استعمال **أبيو 2%** للأطفال أعراضًا جانبية لدى قسم من المستخدمين. لا تصدّم عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية. من المحتمل ألا تعاني من أيّ منها. العرض الجانبي الأكثر شيوعًا هو تقيؤ في المعدة الذي يمكن أن يؤدي إلى مشاكل مثل صعوبات في التنفس وحرقة.

يجب التوقف عن إعطاء الدواء لطفلك وإخبار الطبيب فورًا في حالة:

- دم في البراز.
- براز زرقني أسود.
- تقيؤ دموي أو جزينات غامقة التي تبدو كحبيبات قهوة.
- صغير غير مستقر، ربو، ضيق في التنفس، طفح جلدي (الذي قد يكون وخيمًا ومصحوبًا بحويصلات أو تقشر الجلد)، حكة أو آلام، منتشر ومع نتوءات تحت الجلد ومثلمازمة ستيثيس جوسون، نظم قلب سريع، احتباس سوائل (كاحلال منتفخان أو انخفاض في كمية البول).
- تصلب الزقينة، صداع، غثيان، تقيؤ، سخونة وتوهان.

انتفاخ البطن، واللسان أو الحلق (قد تكون هذه مؤشرات لردود فعل تحسسية حادة).
رد فعل جلدي وخيم المعروف بمثلمازمة DRESS (مثلمازمة رد الفعل الدوائي مع كثرة اليوزينيات وأعراض جهازية). أعراض DRESS تشمل طفح جلدي، سخونة، انتفاخ الغدد الليمفاوية وارتفاع عدد اليوزينيات (نوع من خلايا الدم البيضاء).
طفح جلدي أحمر مع حراشف (قشور)، منتشر ومع نتوءات تحت الجلد وحويصلات تظهر في الأساس في طبّيات الجلد، في مركز الجسم والأطراف العلوية، ويكون هذا الطفح مصحوبًا بسخونة في بداية العلاج (البثور الطفحية الحادة المععمة (AGEP)، نسبة شيوعها غير معروفة). انظر البند 2.

يجب التوقف عن إعطاء الدواء لطفلك وإخبار الطبيب في حالة:

- آلم بطن غير مستمر، صعوبات في الهضم، حرقة، غثيان أو تقيؤ.
- اصفرار العينين، براز شاحب وبول غامق (قد تكون هذه مؤشرات لمشاكل في الكلى أو الكبد).
- لم حاد في الحلق المصحوب بسخونة عالية.
- كدمات أو نزيف غير متفران، إرهاب، إسهال، الإصابة بحالات عدوى أكثر من المعتاد مثل تفرّحات في الفم، حالات ركّام، آلم في الحلق، سخونة (قد تكون هذه مؤشرات لفقّر دم أو اضطرابات دموية أخرى).

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية غير شائعة:

صداع.

أعراض جانبية نادرة:

إسهال، انتفاخ أو إمساك. أخبر الطبيب إذا استمرت هذه الأعراض أكثر من عدة أيام أو إذا كانت مزعجة.

أعراض جانبية نادرة جدًا:

- مشاكل في الكلى أو الكبد قد تحدث عند استعمال إيبوبروفين.
- سكّته دماغية أو مشاكل في القلب قد تحدث عند استعمال إيبوبروفين. الاحتمالية لذلك منخفضة بمسوى المقدار الدوائي الذي يعطى للأطفال.
- تفاقم التهاب الأمعاء الغليظة (التهاب القولون -colitis) وداء كرون.
- ضغط دم مرتفع.
- قرحة في المعدة، نزيف في المعدة، التهاب في مخاطية المعدة.

أعراض جانبية نسبة شيوعها غير معروفة:

في حالات شاذة، حدثت حالات عدوى حادة في الجلد والأنسجة الخروعة خلال ظهور الحُمّاق (Varicella).
أصبح الجلد حساسًا للضوء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو إذا عانيت من عرض جانبي غير مُذكَور في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

من الممكن تبليغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية نتيجة لعلاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يحوّلك إلى استمارة عبر الإنترنت للتبليغ عن الأعراض الجانبية، أو عبر دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يخزن الدواء؟

- تجنّب التسمّم! يجب حفظ هذا الدواء، وكلّ دواء آخر، في مكان مغلق، بعيدًا عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، وهكذا تتجنّب التسمّم. لا تسبّب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنَع استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على العبوة والقئينة. تاريخ انتهاء الصلاحية ينسب إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين:** يجب التخزين بدرجة حرارة تحت الـ 25 درجة مئوية.
- بعد فتح القئينة للمرة الأولى، يمكن استعمال الدواء حتى سةة أشهر، لكن ليس ما بعد تاريخ انتهاء تاريخ الصلاحية.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة على:

Liquid maltitol, glycerol (E-422), sodium citrate, citric acid anhydrous, sodium chloride, hypromellose, xanthan gum, sodium benzoate, strawberry flavor, saccharin sodium, purified water.

Strawberry flavoring containing substances identical to natural flavorings, natural flavoring preparations, maize maltodextrin, triethyl citrate (E-1505) 8.4%, propylene glycol (E-1520) 0.1% and benzyl alcohol 0.0236%.

كيف يبدو الدواء وماذا تحوي العبوة:

المعلق كثيف وذو لون أبيض/أبيض كريم. يوجد في كل عبوة قئينة معلق ومحقّنة من أجل الدقّة في الجرعة الدوائية. الكمية في العبوة: 100 ملل، 200 ملل.

قد لا يتمّ تسويق جميع أحجام العبوات.

اسم صاحب التسجيل وعنوانه:

تبيع إنترنل م.رض، شارع دفّورا هنيّينا 124، تل أبيب 6944020

اسم المنتج وعنوانه: فار مالير إس.إي، الكوينداس 28108 مدريد، إسبانيا

تمّ تحرير هذه النشرة في شباط 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 153.81.34080

للتبسيط ولتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصّص لكلا الجنسين.