

## עלון לצרcn לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

### **ב'יבי גאם ג'יל**

#### **חוּמָרִים פְּעִילִים:**

coliin סליצילט (Choline salicylate) 8.7% w/w  
צטלקוניום כלורייד (Cetalkonium chloride) 0.01% w/w  
רשימת המרכיבים הנוספים ראה סעיף 6. ראה גם 'מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה' בסעיף 2.

קרה בעין את העلون עד סופו בטטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.  
עליך להשתמש בתרופה על פי ההוראות בסעיף המינון לעalon זה. היועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף.  
עליך לפנות לרופא במידה והتسمינאים מחמירים, או אינם משתפרים לאחר 3 ימים.

#### **1. למה מיועדת התרופה?**

ג'ל מחתא ומפיג CABMs בחולן הפה.

התרופה מיועדת להקלת בכאבי צמיחת שניינים, כיבים בחולן הפה, גירויים משניים תותבות ופציעי קור.

#### **קבוצה רפואיית:**

coliin סליצילט – משכך CABMs  
צטלקוניום כלורייד – מחתא

#### **2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:**

- אתה רגש (אלרגי) לחומרים הפעילים, או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (רשימת המרכיבים הנוספים, ראה סעיף 6).
- אתה רגש (אלרגי) לסליצילטים, אספירין, נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs) או לצטילפירידינים.
- אתה נוטל אספירין או סליצילטים אחרים (אלא אם הרופא הורה זאת).
- אין להשתמש בתינוקות מתחת לגיל 4 חודשים.
- אתה סובל מכיב קיבה פעל, או אם יש לך היסטוריה של כיב קיבה חוזר.
- אין להשתמש במצבים של מחלות ויראליות כגון שפעת או אבעבועות רוח, במיוחד בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16 שנים, מחשש לתסמונת ר'י.

#### **ażhorot miyadot haengutot leshimosh batrrofa**

- אם לא חל שיפור אחרי 3 ימים, יש להתייעץ עם הרופא.
- אין להשתמש בתרופה זו לעיתים קרובות או לתקופה ממושכת מבל' להיעזר ברופא.
- יש להකפיד על הוראות השימוש. אין לעבור על המנה המומלצת ועל תדרות השימוש, במיוחד בתינוקות וילדים מתחת לגיל 16, היהות שימוש תכוף מיד או במנה גבוהה מדי עלולים לגרום להרעלת סליציליטים. ראה סעיף 6. אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר.
- יש להימנע מגעה של הג'ל עם העיניים.

#### **ילדים ומתבגרים:**

אין להשתמש בתינוקות מתחת לגיל 4 חודשים.

#### **תגובהות בין תרופתיות:**

אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- אספירין וסליצילטים אחרים: אין להשתמש במקביל לב'יבי גאם, אלא בהוראת רופא.
- תרופות נגד קריישת דם: שימוש ב'יבי גאם במקביל לתרופות אלה, עלול להגבר את השפעתן.
- תרופות נגד שיגdon (כגון probenecid acid): שימוש ב'יבי גאם במקביל לתרופות אלה, עלול להפחית את השפעתן.

## שימוש בתרופה ומזון אין לאכול או לשות בסמוך למרייה בפה.

- הרין והנקה:**
- אין להשתמש בתרופה מבל' להיוועץ ברופא לפני התחלת הטיפול אם את בהריון, מתכנתת הרין או מניקה.
  - סלייצילטים עלולים להאריך דימומיים ולגרום לדימום בלבד או באם, ולכן אין להשתמש בהם בשלב הריון מתקדם.
  - סלייצילטים מופרשים בכמותות קטנות בחלב אם, ובמקרים נדירים מאוד עלולים לגרום לתופעות לוואי בתינוק.

## מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

- כל שפופרת מכילה כ-4 גרם (ב-7% 47%) אלכוהול (אלכוהול).
- כל מנה של כ-0.5 ס"מ מכילה כמות קטנה של אלכוהול (כ-70 מ"ג), שהינה שווה ערך לפחות מ-2 מיליליטר בירה או 1 מיליליטר יין. לכמות אלכוהול זו אין השפעה ניכרת. עלול לגרום לתחבות צריבה על עור/רירית פצעה/ה.
- תרופה זו מכילה לפחות מ-0.001 נתרן (23 מ"ג) בכל מנה, כולל נחבות נטולות נתרן.
- הgel מכיל סודיום מטה ביסוליפיט (Sodium metabisulfite) שעלול לעתים נדירות לגרום לתגובות רגיסות יתר חמורות ולעווית סימפונות (Bronchospasm).

## 3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.  
לMRIחה במקום הכאב בחלל הפה.  
לא לבליה.

### המינון המקבול בדרך כלל הוא:

- ילדים מגיל 4 חודשים עד 16 שנים:** יש לשימוש על אצבע נקיה ג'ל באורך של כ-0.5 סנטימטר (גודל אפונה) ולמרוח על האזור הכאב תוך כדי עיסוי. ניתן לחזור על טיפול זה כל 3 עד 4 שעות, אך לא יותר מ- 6 פעמים ביוםמה.
- מבוגרים:** יש לשימוש על אצבע נקיה ג'ל באורך של 1 עד 1.5 סנטימטר ולמרוח על האזור הכאב תוך כדי עיסוי. ניתן לחזור על טיפול זה כל 3 עד 4 שעות, אך לא יותר מ-6 פעמים ביוםמה.

### אין לעבור על המנה המומלצת.

אם לא חל שיפור תוך 3 ימים או אם חלה החמרה יש לפנות לרופא.

### אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר

אם נעשה שימוש במינון גבוה יותר, פנה מיד לרופא או לחדר מיען של בית החולים והבא את אריזת התרופה איתך. תסמנני מינון יתר שקשורים להרעלת סלייצילטים מסוימים: בחילוות, הקאות, חום, בלבול וחוסר התמצאות, צלצולים באוזניים, היפרונטילציה (נשימת יתר), התיבשות, סחרחות, דימום מערכת העיכול, הפרעות במאזן חומצה/בסיס, פרכוסים, תרדמת.

### אם שכחת לחשוף בתרופה

במידה ויש צורך - השתמש בג'ל לפי ההוראות בסעיף זה. אל תשתמש במנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

אין להשתמש או ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

## 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בביבי גאם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רישימת תופעות הלואן. יתכן ולא תסבול מ一封 אחת מהן.

**יש להפסיק את השימוש ולפנות מיד לרופא אם מתפתחת תגובה אלרגית כגון התקף אסטמה, עווית סימפונות או קשיי נשימה.**

## **תופעות לוואי נוספת**

**תופעת לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעת ששכיחותן טרם נקבעה):**  
דלקת, צריבה, חוסר תחושה או עקצוץ של הפה ו/או החניכיים.

## **תופעות לוואי ותגובה בין תרופתיות בילדים ותינוקות:**

דווחו מקרים של תגובה החשודה כתסמנות רוי ו/או הרעלת סליציליטים בילדים שמרחו תכשירים המכילים כלין סליצילט, אך לא הוכחה הסיבתיות במרקם אלה. ראה סעיף 'אם נטלה בטיעות מינון גובה יותר'.

**אם הופיעה תופעת לוואי, אם אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעולון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

## **5. איך לאחסן את התרופה?**

- **מנע הרעלת!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האזינה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חדש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן מתחת ל- $-C^{\circ} 25$ . יש להקפיד על סגירת הפקק היבט לאחר כל שימוש. לאחר הפתיחה הראשונה של השופורת ניתן להשתמש בג'ל במשך 2 חודשים, אך לא יותר מתאריך התפוגה המוטבע על גבי האזינה.

## **6. מידע נוסף**

### **נוסך על החומרים הפעילים, התרופה מכילה גם:**

Ethanol, choline salicylate, glycerin, hydroxypropyl methylcellulose 4000, sodium cyclamate, oil of anise, menthol, cetalkonium chloride, sodium metabisulfite, hydrochloric acid, purified water.

### **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזינה?**

gal شקוּפְּ בשפורת אלומיניום. השפורת מכילה 10 גרם.

**היצן ובעל הרישום:** מעבדות רפואי בע"מ, ת.ד. 405, ירושלים 9100301, ישראל.  
**משוקן בعلامة ע"י:** סופר-פארם (ישראל) בע"מ, ת.ד. 2171, הרצליה 4672516

**מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 131-49-31109**

לשם הפשטות והקלות הקראה עלון זה נוסח בלשון זכר, אך התרופה מיועדת לשני המינים.

נערך בנובמבר 2023 בהתאם להוראות משרד הבריאות.

I-088005