

נובמבר 2023

רופא/ה, רוקח/ת נכבד/ה,

BABY GUM – עדכוני עלוניים לצריכן ולרופא

אנו מבקשים להביא לידייעתכם כי עדכונו הульוניים של התכשיר

המרכיב הפעיל: Cetalkonium chloride 0.015 w/w, Choline salicylate 8.7%w/w

התוויות:

As an antiseptic and local pain reliever for mouth ulcers, teething pain, denture irritation, and cold Sores.

בזהductioה זה מצינינם סעיפים בהם נעשה שינוי מהותי או שינוי המהווה החמרה . מידע שהתוויסף מצין באדום.
עדכונים נוספים אשר אינם מהווים החמרה או שאינם מהותיים, אינם נכללים בהודעה זו.

ההחזרות והשינויים המהותיים שבוצעו מפורטים להלן:

עלון לצריכן:

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרכופה:

- כל שפופרת מכליה כ-4 גרם (v/v) אתנול (אלכוהול).
- כל מנה של כ-0.5 ס"מ מכליה כמות קתנה של אלכוהול (כ-70 מ"ג), שהינה שווה ערך לפחות מ2 מיליליטר בירה או 1 מיליליטר יין. לכמות אלכוהול זו אין השפעה ניכרת. עלול לגרום לתהווישת צריבה על עור/רירית פצעה.
- תרופה זו מכליה פחות מ 1mmol נתרן (23 מ"ג) בכל מנה, יכול להחשב נטולת נתרן.
- הגל מכל סodium sulfite (סודיום ביסולפיט) שועלול לעתים נדירות לגרום לתגובה רגשית יתר חמורות ולעווית סימפוניות (Bronchospasm).

עלון לרופא:

4.4 Special warnings and precautions for use

The recommended dose and frequency should not be exceeded especially in children under 16 years due to risk of Reye's syndrome and salicylate poisoning (see section 4.8 & 4.9).

This product contains salicylate and should not be used with aspirin or other salicylates except under the direction of a doctor or dentist.

Each tube contains about 4 gram (38% w/w) ethanol (alcohol).

Each dose of about 0.5 cm contains a small amount of alcohol (about 70 mg). The amount in each dose of alcohol in this medicine is equivalent to less than 2ml beer or 1 ml of wine. The small amount of alcohol in this medicine will not have any noticeable effects. It may cause burning sensation on damaged skin.

This medicine contains less than 1 mmol sodium (23mg) in each dose, that is to say essentially 'sodium-free'.

This product contains sodium metabisulfite which may rarely cause severe hypersensitivity reactions and bronchospasm.

Contact your doctor or dentist if you have an active or recurring stomach ulcer (see section 4.3).

Contact your doctor or dentist if you are currently suffering from a viral infection such as varicella (chicken pox) or influenza infection (see section 4.3.)

Consult your doctor if you are pregnant or breastfeeding.

If there is no improvement after 3 days or there is aggravation of the condition, the doctor or dentist should be consulted.

העלונים פורסמו במאגר הבריאות שבאתר משרד הבריאות (www.health.gov.il), וביתן גם לקבלו מודפס ע"י פניה לחברת מעבדות רפואי בע"מ בטל מס' 02-5893939 או בדוא"ל RA@rafa.co.il

בכבוד רב,

mgr' חנה הירש

חוקרת ממונה