

עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אוגמנטין 250 מ"ג טבליות

טבליות מצופות.

כל טבלייה מכילה: 250 מ"ג אמווקסיצילין (כ- טריידראט)

amoxicillin (as trihydrate)

125 מ"ג חומצה קלאולאנית (כ- מלח אשלגן)

clavulanic acid (as potassium salt)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוספים".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה בעבר. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אוגמנטין משמשת במבוגרים ובילדים לטיפול בזיהומים הבאים:

- זיהומים בסינוסים
- זיהום באוזן התיכונה
- דלקת גרון חריפה
- זיהומים בדרכי השתן
- זיהומים בעור וברקמות רכות לרבות זיהומים דנטליים.

אוגמנטין היא אנטיביוטיקה הפועלת על ידי קטילת חיידקים הגורמים לזרימות. היא מכילה שתי תרופות שונות הנקראות אמווקסיצילין וחומצה קלאולאנית. אמווקסיצילין שייכת לקבוצת תרופות הנקראות "פניצילינים" שלעיתים פעילותן יכולה להיפסק (להפסיק לבתי פועלות). הרכיב הפעיל الآخر (חומצה קלאולאנית) מונע זאת מלהתרחש.

קבוצה Terapeutica

אמווקסיצילין: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים.

חומצה קלאולאנית: מעכבי האנזימים בטא-לקטמאז.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאמווקסיצילין, לחומצה קלאולאנית, לפnioצילין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורטים בסעיף 6)
- הייתה לך אי פעם תגובה אלרגית חמורה לכל אנטיביוטיקה אחרת. זו יכולה לכלול פריחה בעור או נפיחות של הפנים או האגרון
- היה לך אי פעם בעיות בכבד או צהבת (הצבהה של העור) בעקבות נטילת אנטיביוטיקה.

← **אל תיכון אוגמנטין אם אחד מלאה חל עלייך.** אם אין לך בטוח, דבר עם הרופא או

הרוקח לפני נטילת אוגמנטיין.

ازהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אוגמנטיין אם:

- יש לך מחלת הנשיקה
- הנר מקבל טיפול עקב בעיות בכבד או בבליה
- איןך מטיל שתן בזרה תקינה.

אם איןך בטוח אם אחד מלאה חל עלייך, דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אוגמנטיין. במקרים מסוימים, יתכן שהרופא יבדוק את סוג החידיק הגורם לזמן שלך. בהתאם לתוצאות, יתכן שינוי לך חזק אחר של אוגמנטיין או תרופה אחרת.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם

אוגמנטיין עלולה להחמיר מצבים קיימים מסוימים, או לגרום לתופעות לוואי חמורות. אלה כוללות תגובה אלרגית, פרוכוסים (עוויותות) ודלקת של המעי הגס. עלייך לשים לב לתסמינים מסוימים בזמן שאתה לוקח אוגמנטיין, כדי להפחית את הסיכון לביעות כלשהן. ראה 'מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם' בסעיף 4.

בדיקות דם ושתן

אם אתה עובר בבדיקות דם (כגון בבדיקות המעריכות את מצב תא הדם האדום או בבדיקות לתפקוד כבד) או בבדיקות שתן (לביקורת רמות גליקוז), ידע את הרופא שאתה לוקח אוגמנטיין. זאת מושם שאוגמנטיין יכולה להשפיע על התוצאות של בדיקות מסווגים אלה.

איןטראקטיות/תגובה בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה או אם יתכן שתיקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם, תרופות צמחיות ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

- אם אתה לוקח אלופורינול (המשמש לטיפול בשיגdon) עם אוגמנטיין, יש סבירות גדולה יותר לכך שתגובה לך אלרגית עורית.
- אם אתה לוקח פרובנציד (המשמש לטיפול בשיגdon), יתכן שהרופא יחליט בהתאם את מינון האוגמנטיין.
- אם תרופות מעכבות קריית דם (כגון ארפרין או אצנווקומארול) נלקחות עם אוגמנטיין, יתכן שהיא צורך בבדיקות דם נוספות.
- אוגמנטיין יכולה להשפיע על אופן פעילותה של מתוטרקסאט (תרופה המשמש לטיפול בסרטן או במחלות שגרוניות).
- אוגמנטיין עלולה להשפיע על אופן פעילותה של מיקופנולאט מופטיל (תרופה המשמשת למניעת דחיה של איברים מושתלים).

הירין והנקה

אם את בהירין או מניקה, חושבת שיתכן שאתה בהירין או מתכונת להרות, פנו לרופא או לרוקח לקבלת ייעוץ לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכונאות

אוגמנטיין יכולות להיות תופעות לוואי והתסמינים עלולים לגרום לך להיות לא כשיר נהיגה.

אל ת נהג או תפעיל מכונאות אלא אם אתה מרגיש טוב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אוגמנטיין 250 מ"ג טבליות מכילה נתרן

תרופה זו מכילה פחות מ- 1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבלייה ולכן נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

מבוגרים וילדים השוקלים 40 ק"ג ומעלה

המינון המקביל בדרך כלל הוא:

- טבלייה 1 שלוש פעמיים ביום.

ילדים השוקלים פחות מ- 40 ק"ג

בילדים בני שש ומטה, מומלץ לטפל בתרחיף אוגמנטיין דרך הפה. טබליות אוגמנטיין אינן מומלצות.

מטופלים עם בעיות כליות וכבד

- אם יש לך בעיות בכליות יתכן שהמנה תשתנה. יתכן שהחזק אחר או תרופה אחרת יבחרו על ידי הרופא.
- אם יש לך בעיות בכבד יתכן שתצטרכ לבעז בדיקות דם תכופות יותר כדי לבדוק את תפקודו הכבד שלך.
אין לעבור על המנה המומלצת.

AIR לקחת אוגמנטיין

- יש לקחת עם הארוחה.
- יש לבളע את הטබליות בשלמותן עם כוס מים.
- אין מידע לגבי כתישה, ח齐יה ולעיסה.
- יש לחלק את המנות באופן שווה במהלך היום, לכל הפחות בהפרש של 4 שעות. אל תיקח 2 מנות בשעה אחת.
- אין ליטול אוגמנטיין למשך יותר משבועיים. אם אתה עדיין מרגיש לא טוב, יש לפנות בחזרה לרופא.

אם לקחת בטיעות מינון גבוה יותר

אם לקחת בטיעות יותר מדי אוגמנטיין, הסימנים עשויים לכלול אי נוחות בבטן (בחילה, הקאה או שלשול) או פרכויסים. פנה לרופא בהקדם האפשרי. קח את אריזת התרופה כדי להראות לרופא.

אם בטיעות בעליל מין התרופה, פונה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת לקחת אוגמנטיין

- אם שכחת לקחת מנה, קח אותה ברגע שאתה נזכר.
 - אל תיקח את המנה הבאה מוקדם מדי, אלא המtan כ-4 שעות לפני נטילת המנה הבאה.
- אין לקחת מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.
- יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק לקחת אוגמנטיין

המשך לקחת אוגמנטיין עד לסיום הטיפול, אפילו אם אתה מרגיש טוב יותר. כל אחת מהמנות חשובה עבורך על מנת לעזור להילחם בזיהום. אם חלק מהחידקים שרדו, הם

יכולים לגרום לziehom חזרה.

אין לטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנץ נוטל תרופה. הרכב

משמעותי אם הנץ זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספת בסוגה לשימוש בתרופה, **היוועץ ברופא או ברוקח.**

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באוגמנטין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשותת תופעות הלואוי. יתכן שלא תסבול מכך אחת מהן. תופעות הלואוי בהמשך עשויה להתרחש עם תרופה זו.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם:

תגובהות אלרגיות:

- פירחה בעור
 - דלקת של כלי דם (**אסקוליטיס**) אשר עשויה להראות ככתמים אדומים או סגולים בולטים על העור, אך יכולה להשפיע על אזורים אחרים של הגוף
 - חום, כאב פרקים, בלוטות נפוחות בצוואר, בית לחם או במפשעה
 - נפיחות, לפעים של הפנים או האגרון (**אנגיאידמה**), הגורמת לקשי נשימה
 - התמוטטות
 - כאבים בחזה הקשורים לתגובה אלרגית עשויים להיות תסמינים של אוטם שריר הלב המשופעל על ידי אלרגיה (**תסמונת קונייס – Kounis syndrome**).
- ← פנה מיד לרופא אם אתה חווה אחד מתסמינים אלה. **הפסיק לחת אוגמנטין.**

דלקת של המעי הגס

דלקת של המעי הגס, גורמת לששלול מימי המלווה בדרך כלל בדם וריר, כאב בטן ו/או לחום.

תסמונת אנטרוכוליטיס (דלקת במעי) הנגרמת על ידי תרופה (DIES)

DIES דווחה בעיקר בילדים שקיבלו אמוקסיצילין/חומרה קלואולאנית. זהו סוג מסוים של תגובה אלרגית עם תסמין העיקרי הקאות חזרות ונשנות (4-1 שעות לאחר מתח התרופה). תסמינים נוספים יכולים לכלול כאב בטן, עייפות (ישנוויות), שלשול ולחץ דם נמר.

דלקת חריפה של הלבלב (acute pancreatitis)

אם יש לך כאבים עזים ומתחשכים באזור הבطن זה יכול להיות סימן לדלקת לבלב חריפה.

← פנה לרופא בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ אם אתה חווה תסמינים אלה.

תופעות לוואי לפי שכיחותן:

תופעות לוואי שכיחות מודר

אליה עשויות להופיע ביותר מ- 1 מכל 10 אנשים:

- שלשול (במבוגרים).

תופעות לוואי שכיחות

אליה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- פטרת (**קנדידה** - זיהום פטריאטי של הנרתיק, הפה או קפל העור)

• בחילה, בעיקר כאשר לוקחים מינון גבוה

← אם הופיעה בחילה, קח אוגמנטין עם הארוחה.

- הקאה

- שלשול (בילדים).

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אליה עשויות להופיע ב- **עד 1 מכל 100** אנשים:

- פריחה בעור, גרד
- פריחה בולטת מוגדרת (חרלה)
- בעיות עיכול
- סחרחות
- כאב ראש.

תופעות לוואי שאינן שכיחות העשוית להופיע בבדיקות הדם שלך:

- עליה באנזימי כבד.

תופעות לוואי נדירות

אליה עשויות להופיע ב- **עד 1 מכל 1,000** אנשים:

- פריחה בעור, שעשויה לכלול שלפוחיות (שנראות כמו כתמים כהים במרכז המוקפים באזור חיוור, עם טבעת כהה מסביב לשולדים - אדמנת רב צורתית *erythema multiforme*).

← אם אתה מבחין באחד מהתסминים אלה פנה לרופא בדחיפות.

תופעות לוואי נדירות העשוית להופיע בבדיקות הדם שלך:

- מספר נמוך של תאים המעורבים בקרישת הדם
- מספר נמוך של תאי דם לבנים.

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (לא ניתן לדעת את השכיחות מתוך הנתונים הקיימים)

- תגובות אלרגיות (ראה לעיל)
- דלקת של המעי הגס (ראה לעיל)
- תסמונת אנטרוכוליטיס (דלקת במעי) הנגרמת על ידי תרופות (DIIES) (ראה לעיל)
- דלקת חריפה של הלבלב (acute pancreatitis) (ראה לעיל)
- דלקת הקרום העוטף את המוח וחוות השדרה (מנינגיטיס אספסטיבית)
- תגובות עוריות חמורות:
 - פריחה מפותחת עם שלפוחיות ועור מתקלף, בעיקר סביבת הפה, האף, העיניים ואיברי המין (תסמונת סטיבנס-ג'ונסון), ותופעה חמורה יותר, הגורמת לקליפ נרחב של העור (יותר מ- 30% משטח הפנים של הגוף - טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס)
 - פריחה אדומה מפותחת בעור עם שלפוחיות קטנות המכילות מוגלה (*bullous exfoliative dermatitis*)
 - פריחה אדומה קשキש עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות (*pustulosis exanthematosus*)
 - תסמין דמוי שפעת עם פריחה, חום, בלוטות נפוחות ותוצאות בדיקות דם חריגות (כולל עליה בכמות תאי הדם הלבנים [אוזינופיליה] ואנמיי הכבד) (תגובה לתרופה הכוללת אוזינופיליה ותסמינים מערכתיים [DRESS])
 - פריחה המאפיינת בשלפוחיות הממוקמות סביב גלד מרכזי או דמוית מחרוזת פנינים (מחלה IgA ליניארית).

← פנה מיד לרופא אם אתה חווה אחד מהתסמינים אלה.

- דלקת של הכבד (הפטיטיס)
- צהבת, הנגרמת על ידי עליה של בילירובין (חומר הנוצר בכבד) בדם שעלולה לגרום

- להצחבות העור ולובן העין
- דלקת של צינורות הכליה
- זמן קרישת דם מוארך
- פעולות יתר (היפראקטיביות)
- פרוכסים (באנשים הלווקחים מנות גדולות של אוגמנטין או שיש להם בעיות בклיה)
- לשון שחורה הנראית שעירה.

תופעות לוואי העשוויות להופיע בבדיקות הדם או השתן שלך:

- ירידת חמורה במספר תאי דם לבנים
- מספר נמוך של תאי דם אדומים (אנמיה המוליטית)
- גבישים בשתן המוביילים לפגיעה חמורה בклיות.

אם הופעתה לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה לעלון, عليك להתיעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן מתחת ל- 25°C .
- יש להשתמש בטבליות המסופקות בעטיפה אלומיניום תוך 30 יום מפתיחה העטיפה.
- אחסון באזירה המקורי כדי להגן מפני לחות.
- אין להשתמש אם הטבליות סדוקות או FAGOMOT.
- אין להשлик תרופות לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- מה מכילה אוגמנטין:
נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם -
ליבת הטבליה -

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate (Type A), magnesium stearate and colloidal anhydrous silica.

ציפוי –

Hypromellose (5 cps, 15 cps), titanium dioxide (E171), macrogol (4000, 6000) and dimeticone.

- כיצד נראה התרופה ומה תוכן האזירה:
אוגמנטין 250 מ"ג טבליות מצופות הן בין צבע לבן לאוף וויט, בצורה אליפטית, מוטבעות ב- "AUGMENTIN" על צד אחד.

הן ארוזות באריזות בליסטר בתוך עטיפות אלומיניום, באריזת קרטון. העטיפה מכילה שקיק סופח לחות. יש לשמור את שקיק סופח הלחות בתוך העטיפה ואין לאכול אותו. כל קרטון מכיל 10 או 20 טבליות.

יתכן שלא כל גדיי האריזות משוקקים.

• **בעל הרישום:** גלקסוסמיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.

• **יצרן:** גלקסוסמיטקלין טריידיניג סרוויסס לימייטד, דבלין, אירלנד.

• נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות: 026-26-25047

• לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

• סימני מסחר הינם בבעלות או בזכינות של קבוצת החברות של GSK.

© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Aug Tab 250 PT v9A