

עלון לצרכן לפי תקנות הרווקחים (תקשיים) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אלוקום משחה

0.1% מומטازון פורואט
Mometasone furoate 0.1%
כל גרם משחה מכיל:
1 מ"ג מומטازון פורואט

אלוקום קרם

0.1% מומטازון פורואט
Mometasone furoate 0.1%
כל גרם קרם מכיל:
1 מ"ג מומטازון פורואט

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ראה סעיף 6 "מידע נוסף". ראה גם סעיף 2.5 "מידע חשוב אודות חלק ממרכיבי אלוקום משחה".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

- עלון זה מכיל מידע תמציתי אודות אלוקום. אם יש לך שאלות נוספות נספנות, פנה אל הרופא או אל הרווקח.
- תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם, אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת אלוקום?

אלוקום משמשת להקלת במצב דלקת וגרד הנגרמים כתוצאה מבעיות עור מסוימות המגיבות לקורטייקוסטרואידים, כגון פסורייזיס או אטופיק דרמטיטיס.

קובצת תרפואיית: אלוקום קרם ואלוקום משחה משתייכות לקבוצת תרופות בשם קורטייקוסטרואידים טופיקליים. הן מסוגות כ"קורטייקוסטרואיד חזק". תרופות אלו נמרחות על פני העור להפחמת אדומות וגרד הנגרמים כתוצאה מבעיות עור מסוימות.

מהו פסורייזיס?

פסורייזיס הינה מחלת עור בה נוצרים תלאים ורודים, מגרדים, מכוסי קשകשים, המתפתחים על המרפקים, הברכיים, הקركפת ועל חלק גוף אחרים.

מהו דרמטיטיס?

דרמטיטיס הינו מצב הנגרם כתגובה של העור לגורמים חיצוניים כגון חומרי ניקוי, הגורמים לאדומות וגרד בעור.

2. לפני השימוש באЛОקום
2.1 אין להשתמש באЛОקום אם:

- | |
|--|
| – אתה אלרגי (רג'יש) למומטازון פורואט או לכל אחד ממרכיבי אלוקום האחרים (ראה סעיפים 2.5 ו- 6), או לתרופות אחרות דומות. |
| – אתה סובל מבעיות עור אחרות מכיוון שהן יכולות להחמיר במיוחד: רוזציאה (בעיית עור המשפיעה על הפנים); אקנזה; ניון עור (דיוקן העור); דרמטיטיס סביב הפה; גרד באברי המין; תפוחת חיתולים; פצעי קור; אבעבועות רוח; שלבקת חוגרת; יבלות; כיב עור; פצעים; זיהומי עור אחרים. |

התיעץ עם הרופא שלך או הרוקח במידה ואין בטוח.

2.2 אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש באЛОקום

צור קשר עם הרופא שלך אם הפסורייזיס שלך מחמיר או אם מופיעות אצלך בליטות מורמות מלאות מוגלה מתחת לעור.

צור קשר עם הרופא שלך מיד אם אתה חוווה טשטוש ראייה או הפרעות אחרות בראשית.

אם העור שלך נהיה מגורה או רגish לאחר השימוש באЛОקום, עליך להפסיק את השימוש בו ולספר לרופא שלך.

אם אתה חושב ש피חתה זיהום על עורך במהלך השימוש באЛОקום, עליך לספר לרופא שלך.

תופעות לוואי העולות להופיע עם קורטיקוסטרואידים לשאיפה או לבלייה עלולות לקרות גם עם קורטיקוסטרואידים בשימוש על העור, במיוחד בתינוקות ובילדים.

אם אתה משתמש באלוקום בכמות גדולה יותר מהכמות המומלצת /או למשך זמן ארוך יותר מהמומלץ, הדבר עלול להשפיע על רמות הורמוניים מסוימים בגוף, במיוחד בתינוקות ובילדים.

במוגדים, השינויים ברמות ההורמוניים עלולים לעתים נדירות להוביל לנפיחות או התעגשות של הפנים, חולשה, עייפות, וசחרורת בזמן עמידה או ישיבה.

אין לעשן או להתקרב להבות חשופות - סכנה לכויות קשות. בד (בגדים, מצעים, חビשות וכו') שהיה בoldown עם תכשיר זה נדלק בגין קלות ומהו סכנת שריפה חמורה. כיבוס של בגדים ומצעים עשוי להפחית את הצטברות התכשיר אך לא להסירו לחלוטין.

אם חלה החמרה במצבך במהלך השימוש, התיעץ עם הרופא שלך – יתכן שאתה חווה תגובה אלרגית, שיש לך זיהום או מצבך דורש טיפול אחר.

אם אתה חווה היסנות של מצבך זמן קצר לאחר הפסקת הטיפול, תוך שבועיים, אל תתחיל להשתמש באלוקום מחדש לפחות עם הרופא שלך, אלא אם כן הרופא שלך יעץ לך לעשות זאת בעבר. אם מצבך נפטר, עם היסנותו, האדרומיות מתרחבת מעבר לאיזור הטיפול הראשוני ואתה חווה תחושת צריבה, אנא פנה לייעוץ רפואי לפני התחלת הטיפול מחדש.

ילדים וمتבגרים

מאחר ולא הוכחו נתונים ייעילות ובטיוחות בשימוש באלוקום בילדים מתחת לגיל שנתיים, השימוש בילדים בקבוצת גיל זו אינה מומלצת. נדרשת זהירות מיוחדת בשימוש זו בילדים ובמתבגרים. השימוש בקבוצת גילאים זו חייבות בפיקוח רפואי.

אם נעשה שימוש באלוקום בכמות גדולה יותר מהכמות המומלצת /או למשך זמן ארוך יותר מהמומלץ, הדבר עלול להשפיע על ההורמוניים של הילד. זה עלול להוביל:

- עיכובים בגידלה ובהתפתחות
- פני ירכ או התעגשות של הפנים

2.3 אינטראקציות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקחת, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

2.4 הריאן, הנקה ופוריות

עליך לספר לרופא שלך אם אתה בהריון או מניקה, חושבת שהינך בהריון או אם אתה מתכונת להרות, לפני שתאת מתחילה את השימוש באלוקום.

2.5 מידע חשוב חלק מהמרכיבים של אלוקום משחה

אלוקום משחה מכילה פרופילן גליקול סטארט (propylene glycol stearate), העולול לגרום לגירוי בעור.

3. כיצד תשמש באלוקום?

יש להשתמש באלוקום תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגע למיןון ואופן הטיפול בתכשיר. המיןון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המיןון המקובל בדרך כלל הוא:

יש למרוח בעדינות שכבה דקה של **אלוקום** קרם או משחה לתוך האזור הנגוע בעור, פעמי אחד ביום. יש לעסוט בעדינות וביסודיות עד להעלמת התרפופה. יש למרוח בעזרת האצבע ולאחר מכן לשטוף את האצבע בסיסדיות.

אל תשמש בקרם או במשחה על הפנים שלך במשך יותר מ-5 ימים

אין לעבור על המנה המומלצת.
אין לבלווע, לשימוש חיצוני בלבד.

עליך לעמוד תמיד אחר הוראות אלה בשימוש באלווקום:
אין למסח אלווקום מתחת לחיתול של ילך, מאחר זהה מקל על המרכיב הפעיל של התרופה לחדר דרך העור וייתכן ויגרם לתופעות לא רצויות.

עליך לבדוק עם הרופא לפני CISI האזורים המטופלים בתחבושת או פלסטר. אין לכוסות אזוריים מטופלים בפנים או בילדים בתחבושת או פלסטר.
אין להשתמש בכמות גדולה של אלווקום על שטחי עור נרחבים של הגוף לתקופה ארוכה (לדוגמא כל יום לפחות שבועות רבים או חדשניים).
אין להשתמש בתוך או סביבת העיניים, כולל העפעפים, מפהת הסיכון הנדייר מאד לגלאוקומה או קטרקט. הימנו מגע עם רקמות ריריות (לדוגמא בפה ובאף). במקרה של מגע יש לשטוף בסידות.

אם השתמש באלווקום בכמות גדולה יותר מהמומלץ
אם אתה (או מישחו אחר) בלעת בטיעות אלווקום, לא אמורות להיווצר בעיות. אולם, אם אתה מודאג, עליך לראות רופא.

אם אתה משתמש באלווקום לעיתים תכופות יותר מהמומלץ, או על שטחים נרחבים של הגוף, זה עלול להשפיע על רמות חלק מההורמוניים שלך. בילדים, זה עלול להשפיע על הגדילה וההתפתחות.
אם לא השתמש באלווקום כפי שנאמר לך והשתמש לעיתים תכופות מדי ו/או לתקופה ארוכה, עליך לספר לרופא.

אם שכחת להשתמש באלווקום
חשוב להשתמש באלווקום לפני הוראות הרופא. אם שכחת להשתמש באלווקום בזמן הנוכחי, השתמש בה ברגע שנזכרת, אז המשך כמו קודם.

אם אתה מפסיק להשתמש באלווקום
אם אתה משתמש באלווקום במשך תקופה ארוכה ונראה כי בעית העור שלך השתרפה, אין להפסיק את השימוש באלווקום באופן פתאומי. אם תעשה כך, יתכן ותגלה כי העור שלך נעשה אדום ותשזה עיקוץ וצירבה. כדי להימנע מכך, יש להיוועץ עם הרופא שלך במקרה שיוריד באופן הדרגתי את תדריות השימוש באלווקום עד שתפסיק את הטיפול לחלווטין.

אין ליטול תרופות בחושך! יש לבדוק התווית והמנה בכל פעע שהינך נוטל תרופה. יש להרכיב משקפיים אם הינך זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באלווקום עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים.
אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מ一封 אחת מהן.

אנשים אחדים עלולים/aglowות שינם מוחלים מטופעות הלואאי הבאות לאחר השימוש באלווקום:

- תגובות אלרגיות בעור
- זיהומי עור חריגיים ומשננים
- אקונה
- דלקת / או זיהום של זיקרי השיער
- דיקוק של העור
- סימנים אדומים המלווים בחרבה
- דהיית צבע העור
- צירבה
- עיקוץ
- גרד
- נימול
- צמיחה יתר של השיער

- ריכוך העור וסימני מתיחה
- ראייה מטושטשת

תגובה גמila מסטרואידים: בשימוש רצוף לתקופות ממושכות, עלולה להופיע תגובה גמila עם הפסיקת הטיפול, עם חלק מהמאפיינים הבאים או עם כלום: אדרומיות בעור שיכולה להתפשט מעבר לאיזור הראשוני שטופל, תחושת צריבה או עקצוץ, גרד עז, קילוף העור, הפרשה מפצעים פתוחים.

תופעות לוואי אחרות העולות להופיע בשימוש בקורטייקוסטרואידים טופיקליים הן עור יבש, גירוי בעור, דרמטיטיס, דרמטיטיס סביב הפה, ונימי דם מוחחים.
אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי", שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את אלוקום?

- מנע הרעללה! תרופה זו, כמו כל תרופה אחרת, יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידים וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות, ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש באלוּקום אחריו מאשר תאריך התופגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התופגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בטמפרטורה שאינה עולה על 25°C.
- **אלוקום קרם** - לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש במשך 3 חודשים.
- **אלוקום משחה** - לאחר פתיחה ראשונה, ניתן להשתמש במשך חודש.
- אין להשילך תרופות לביב או לפח אשפה ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלה יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

6.1 מה מכילה אלוקום קרם

נוסף על המרכיב הפעיל, **אלוקום קרם** מכילה גם:

White soft paraffin; hexylene glycol; aluminium starch octenylsuccinate; white wax; purified water; hydrogenated soybean lecithin; titanium dioxide; phosphoric acid.

6.2 מה מכילה אלוקום משחה

נוסף על המרכיב הפעיל, **אלוקום משחה** מכילה גם:

White soft paraffin; hexylene glycol; white wax; purified water; propylene glycol stearate; phosphoric acid.

6.3 כיצד נראה אלוקום ומה תוכן האזירה

אלוקום קרם הינו קרם הומוגני חלק בצבע לבן עד אופויט. זמין בשופורת המכילה 15 גרם.
אלוקום משחה הינה משחה אטומה בצבע לבן עד אופויט. זמיןה בשופורת המכילה 15 גרם.

6.4 יצן אורגןון LLC, ניו ג'רזי ארה"ב

6.5 בעל הרישום וכותבו

אורגןון פארמה ישראל בע"מ, עתיר ידע 1, כפר סבא

נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי של משרד הבריאות:

אלוקום קרם: 060.05.26514

אלוקום משחה: 060.06.26513

לשם הפטוטות ולהקלת הקרייה, עלון זה נוסח בלשון ذכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.