

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו - 1986 תרופה זו משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רוזובסטטין אינובמד 5 מ"ג

הרכב:	הרכב:
כל טבליה מכילה: רוזובסטטין 5 מ"ג (קכלציום)	כל טבליה מכילה: רוזובסטטין 10 מ"ג (קכלציום)
Rosuvastatin 5 mg (as calcium)	Rosuvastatin 10 mg (as calcium)

רוזובסטטין אינובמד 20 מ"ג

הרכב:	הרכב:
כל טבליה מכילה: רוזובסטטין 20 מ"ג (קכלציום)	כל טבליה מכילה: רוזובסטטין 40 מ"ג (קכלציום)
Rosuvastatin 20 mg (as calcium)	Rosuvastatin 40 mg (as calcium)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים והאלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכליל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

רוזובסטטין אינובמד אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.

1. למה מיועדת התרופה?

רוזובסטטין אינובמד מיועדת לטיפול במבוגרים:

- בהיפרכולסטרולמיה ראשונית (מסוג IIa כולל היפרכולסטרולמיה משפחתית התרויגוטית) (מצבים בהם יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) או דיסליפידמיה מעורבת מסוג IIb (הפרעה ברמות השומנים השונים בדם). התרופה ניתנת כתוספת לדיאטה במצבים בהם התגובה לדיאטה ולטיפולים שאינם תרופתיים (כגון פעילות להורדת משקל) אינה מספקת.
- בהיפרכולסטרולמיה משפחתית הומוזיגוטית (מצב בו יש רמת כולסטרול גבוהה בדם) בשילוב עם דיאטה וטיפולים אחרים להורדת רמות השומנים בדם (כגון סילוק שומנים LDL (apheresis) או במקרים בהם טיפולים אלו אינם מתאימים.

קבוצה תרפויטית: מעכב אנזים HMG-CoA reductase.

רוזובסטטין אינובמד שייכת לקבוצת תרופות הנקראת סטטינים, פועלת להורדת רמת השומנים בדם, הנפוץ ביותר נקרא כולסטרול. ישנם מספר סוגי כולסטרול בדם, "כולסטרול רע" ו-"כולסטרול טוב".

רוזובסטטין אינובמד פועלת ומסייעת לגוף לחסום את ייצור ה"כולסטרול הרע" ובפניויו מהגוף ומסייעת להעלות את רמות ה"כולסטרול הטוב".

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

אתה רגיש לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף" ובסעיף 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה").
הינך בהריון , או נוסף, אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש ברוזובסטטין אינובמד הפסיקי ליטול רוזובסטטין אינובמד מיידית וידעי את הרופא שלך . יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים.
יש לך מחלת כבד.
הינך סובל מבעיות כליה חמורות.
הינך סובל ממיחושים או כאבי שרירים חזרים או בלתי מוסברים.
הינך נוטל שילוב תרופתי של סופוסבוביר/ולפסטטביר/ווקסילפטביר (משמשות לטיפול בזיהום ויראלי של הכבד הנקרא הפטיטיס C).
הינך נוטל ציקלוספורין (שימוש בציקלוספורין למשל לאחר השתלת איברים).
הינך מתחת לגיל 18.
אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק), אנא פנה לרופא שלך.
בנוסף, אין להשתמש בטבליות של 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) אם:
הינך סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכליה (אם יש ספק, אנא פנה לרופא).
הינך סובל מבעיות בפעילות בלוטת התריס (תירואיד).
הינך סובל ממיחושים או כאבים חזרים או בלתי מוסברים בשרירים , אם הינך בעל עבר משפחתי או אישי של בעיות בשרירים, או סבלת בעבר מבעיות בשרירים בעת נטילת תרופות אחרות להורדת כולסטרול.
הינך צורך כמורית גדולות של אלכוהול באופן קבוע.
מוצאך אסייאתי (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).
הינך נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיבראטים.
אם אחד מאלו נוגע אליך (או אם יש לך ספק), אנא פנה לרופא שלך.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש ברוזובסטטין אינובמד: לפני הטיפול ברוזובסטטין אינובמד ספר לרופא אם:

- הינך סובל מליקוי בתפקוד הכבד, הכליות או בלוטת התריס.**
- הינך סובל ממיחושים או כאבים חזרים או בלתי מוסברים בשרירים**, או אם אתה סבלת או בן משפחתך סבל בעבר מבעיות בשרירים, או שיש לך היסטוריה של בעיות בשרירים בעת לקיחת תרופות אחרות להורדת כולסטרול. יש ליידע מיד את הרופא המטפל אם מופיעים מיחושים או כאבים בלתי מוסברים בשרירים במיוחד אם אלו מלווים בהרגשה כללית לא טובה או חום. יש ליידע את הרופא גם אם הינך סובל מחולשת שרירים מתמשכת.
- הינך סובל או סבלת בעבר ממיאסטיה** (מחלה עם חולשת שרירים כללית הכוללת לעיתים שרירים המשמשים לנשימה), או מיאסטיה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשה בשרירי העין), מאחר שסטטינים לעיתים עלולים להחריף את המחלה או לגרום להתרחשותה (ראה סעיף 4).
- הינך צורך כמורית גדולות של אלכוהול באופן קבוע.**
- הינך נוטל תרופות נוספות להורדת כולסטרול הנקראות פיבראטים.** אנא קרא עלון זה בעיון אף אם השתמשת בתרופות להורדת כולסטרול בעבר.
- הינך נוטל תרופות המיועדות לטיפול בנגיף הכשל החיסוני האנושי** (כגון ריטונביר עם פליפנירי ו/או אטאזאנאביר). **אנא פנה לסעיף "אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות"**.
- הינך נוטל או נטלת אנטיביוטיקה המכילה חומצה פוסידית ב-7 הימים האחרונים** (לטיפול בזיהום חיידקי, בבליעה או בהזרקה). השילוב של חומצה פוסידית ורוזובסטטין אינובמד עלול לגרום לבעיות שרירי חמורות (רדומיוליזיס). אנא פנה לסעיף "אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות".
- הינך מעל לגיל 70** (הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטין אינובמד המתאים לך).
- הינך סובל מכתש נשימתי חמור.**
- אם אי פעם פיתחת פריחה חמורה בעור או קילוף בעור, שלפוחיות ו/או כאבים בפה לאחר נטילת רוזובסטטין אינובמד או תרופות קשורות אחרות.**
- מוצאך אסייאתי** (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני). הרופא יבחר מינון התחלתי של רוזובסטטין אינובמד המתאים לך.

אם אחד המצבים הרשומים מעלה מתייחס אליך (או אם אינך בטוח):

אל תיטול רוזובסטטין אינובמד 40 מ"ג (המינון הגבוה ביותר) ובדוק עם הרופא או הרוקח שלך לפני תחילת השימוש ברוזובסטטין אינובמד בכל מינון.

תגובות עור חמורות כולל תסמונת טיבינס-ג'ונסון ותסמונת התגובה התרופתית עם אאיונופיליה ותסמינים מערכתיים (DRESS) דווחו בהקשר לטיפול ברוזובסטטין אינובמד. הפסק להשתמש ברוזובסטטין אינובמד ופנה לעזרה רפואית מיידית אם הינך מבחין באחד מהתסמינים המוארים בסעיף 4.

במספר קטן של מטופלים, סטטינים עלולים להשפיע על הכבד, דבר המזוהה בבדיקת דם פשוטה הבודקת עלייה ברמות אנזימי הכבד. לכן, הרופא יבקשך לבצע בדיקות דם של תפקודי כבד, לפני ובמהלך הטיפול ברוזובסטטין אינובמד.

בזמן שהינך מטופל בתרופה זו, הרופא שלך יבצע מעקב הדוק אם יש לך סוכרת או אם הינך בסיכון לפתח סוכרת. ייתכן שהינך בסיכון לפתח סוכרת אם יש לך רמות גבוהות של סוכרים ושומנים בדם, או אם יש לך משקל עודף ולחץ דם גבוה.

ילדים ומתבגרים:

רוזובסטטין אינובמד אינה מיועדת לילדים ולמתבגרים מתחת לגיל 18 שנה.

אינטראקציות/תגובות בין-תרופתיות:

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- ציקלוספורין (בשימוש לאחר השתלת איברים)
- וארפרין, קלופידוגרל או טיקגלרור (או כל תרופה אחרת לדילול דם)
- פיבראטים (כגון גמפיברוזיל או נופיברט) או כל תרופה אחרת להורדת כולסטרול (כגון אטימיב)
- תרופות לקקול קיבה (משמשות כסותרי חומצה בקיבה)
- אירתרומיצין (אנטיביוטיקה), חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה – ראה מטה וכן בסעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש ברוזובסטטין אינובמד")
- גלולות למניעת הריון
- גורפניב (לטיפול בסרטן)
- דרולוטמיד (לטיפול בסרטן)
- קמפטייב (לטיפול בסרטן)
- טיפול הורמונלי חלופי
- פוסטמטיניב (לטיפול בספירת טסיות נמוכה)
- פנקוססטט (לטיפול ומניעה של רמות גבוהות של חומצת שתן בדם)
- טרופלונומיד (לטיפול בטרשת נפוצה)

תרופות לטיפול בזיהומים ויראליים, כולל לנגיף הכשל החיסוני הנרכש (HIV) או דלקת כבד (הפטיטיס) מסוג C, לבד או בשילוב עם (נא ראה סעיף "אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש ברוזובסטטין אינובמד"): ריטונביר, לופינביר, אטאזאנאביר, סופוסבוביר, ווקסילפרביר, אומביסטביר, פריטרפרביר, דסבוביר, ולפטסביר, גרוזופרבר, אלבסביר, גלקפרבר, פיברנטסביר.

ההשפעה של תרופות אלו עלולה להשתנות על ידי שימוש בו זמנית עם רוזובסטטין אינובמד או שהן עלולות לשנות את ההשפעה של רוזובסטטין אינובמד.

- חומצה פוסידית (אנטיביוטיקה) - אם עליך ליטול חומצה פוסידית במתן דרך הפה לטיפול בזיהום חיידקי, יהיה עליך להפסיק באופן זמני את הטיפול ברוזובסטטין אינובמד. הרופא יאמר לך מתי ניתן לחזור ליטול רוזובסטטין אינובמד. נטילת רוזובסטטין אינובמד עם חומצה פוסידית עלולה לגרום לעיתים נדירות לחולשה, רגישות, או כאב בשרירים (רדומיוליזיס). נא ראה מידע נוסף לגבי רדומיוליזיס בסעיף 4.**

שימוש בתרופה ומזון:

ניתן ליטול רוזובסטטין אינובמד ללא קשר למזון.

הריון והנקה:

אין ליטול רוזובסטטין אינובמד אם הינך בהריון או מניקה. אם נכנסת להריון תוך כדי שימוש ברוזובסטטין אינובמד **הפסיקי ליטול רוזובסטטין אינובמד מיידית** וידעי את הרופא שלך. יש להימנע מכניסה להריון על ידי שימוש באמצעי מניעה מתאימים בתקופת הטיפול בתרופה זו.

היוועץ עם הרופא או הרוקח שלך לפני נטילה של כל תכשיר.

נהיגה ושימוש במכוונת:

מרבית המטופלים יכולים לנוהג ברכב ולתפעל מכוונת בזמן השימוש ברוזובסטטין אינובמד – התרופה לא תפגום בכשירותם לבצע פעולות אלו. אולם, חלק מהמטופלים עלולים לחוש סחרחורת תוך כדי השימוש ברוזובסטטין אינובמד. אם הינך חש סחרחורת עליך לפנות לרופא בטרם הפעלת מכוונת או נהיגה ברכב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה:

התרופה מכילה קלטוח מונוהידראט אשל הינו סוג של סוכר. אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבילות לקלטח או אינך יכול לעכל סוככים מסוימים, היוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו.

התרופה מכילה פחות מ-23 מ"ג נתון בטבליה ולפיכך נחשבת נטולת נתון.

אנא ראה סעיף 6 "מידע נוסף".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. **המינון המקובל בדרך כלל:**

הטיפול עם רוזובסטטין אינובמד יתחיל עם טבליה אחת של 5 מ"ג או 10 מ"ג פעם ביום, גם אם נטלת לפני כן סטטינים אחרים במינון גבוה יותר. הבחירה במינון ההתחלתי תהיה תלויה ב:
- רמת הכולסטרול.

- רמת הסיכון שתלקה בהתקף לב או שבץ מוחי.
- מידת הסבירות כי תהיה רגיש יותר לתופעת לוואי אפשרית.
אנא היוועץ ברופא או ברוקח שלך לגבי המינון שהכי מתאים עבורך.

ייתכן כי הרופא יחליט לתת את המינון הנמוך ביותר 5 מ"ג כאשר:
- מוצאך **אסייאתי** (סיני, פיליפיני, הודי, קוריאני, ויאטנמי, יפני).

- הינך בן **70 ומעלה**.

- הינך סובל מבעיות מתונות בתפקוד הכלייה.

- הינך בסיכון לסבול מכאבי שרירים (מיופתיה).

העלאת המינון ומינון יומי מירבי

ייתכן שהרופא יחליט להעלות את המינון שאתה נוטל על מנת שיתאים עבורך. אם התחלת עם מינון של רוזובסטטין אינובמד 5 מ"ג, ייתכן שהרופא יכפיל את המינון לרוזובסטטין אינובמד 10 מ"ג, לאחר מכן 20 מ"ג ובמידת הצורך יעלה ל-40 מ"ג. אם התחלת עם מינון של רוזובסטטין אינובמד 10 מ"ג, ייתכן שהרופא יכפיל את המינון ל-20 מ"ג, לאחר מכן במידת הצורך יעלה ל-40 מ"ג. יהיה מרווח של 4 שבועות בין כל העלאת מינון.

המינון המקסימלי היומי הינו 40 מ"ג. הוא ניתן בדרך כלל לחולים עם רמות גבוהות מאוד של כולסטרול וסיכון גבוה ללקות בהתקף לב או שבץ מוחי, כאשר רמות הכולסטרול אינן יורדות מספיק עם 20 מ"ג.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם נוטלים סותרי חומצה מסוג מלחי אלומיניום או מגנזיום, יש ליטול את הרוזובסטטין אינובמד לפחות שעתיים לפני נטילה של סותרי חומצה מסוג מלחי אלומיניום/מגנזיום.

יש לבדוק את רמות הכולסטרול באופן קבוע, על מנת לוודא שהכולסטרול שלך הגיע לרמה הרצויה ושרמה זו נשמרת. ייתכן כי הרופא יחליט להעלות את המינון של התכשיר על מנת שתיקה את כמות הרוזובסטטין אינובמד שמתאימה לך.

ניתן ליטול את התרופה בכל שעות היום עם או ללא מזון. בכדי לזכור לקחת את התרופה מומלץ ליטול את התרופה מדי יום בעזר קבועה.

יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם מים.

אין מידע בנוגע לריסוק, חצייה וכתשתת הטבליה.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר עליך ליצור קשר עם הרופא או לפנות לבית החולים.
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם נשחת ליטול את התרופה, יש לדלג על המנה שנשכחה וליטול את המנה הבאה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל. אין ליטול שתי מנות ביחד כדי לפצות על זו שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך אין להפסיק את הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה רמות הכולסטרול שלך עשויות לעלות שוב.

אין ליטול תרופות בחושיך בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש ברוזובסטטין אינובמד עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

תופעות המחייבות התייחסות מיוחדת, הפסק את הטיפול ברוזובסטטין אינובמד ופנה לרופא מיד אם:

- יש לך אחת מתגובות רגישות היתר (אלרגיה) הבאות:
 - קושי נשימתי עם או ללא נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון.
 - נפיחות בפנים, בשפתיים, בלשון ו/או בגרון, שעלולים לגרום לקשיי בליעה.
 - גרד חריף בעור (עם הופעת שלפוחיות מורמות).

- כתמים אדמדמים שאינם מוגבהים, דמויי מטרה או מעגליים על הגוף, לעיתים עם שלפוחיות במרכז, קילוף עור, כיבים בפה, בגרון, באף, באיברי המין ובעיניים. לפריחות עור חמורות אלו יכול להיות שקדמו חום ותסמינים דמויי שפעת (תסמונת טיבינס-ג'ונסון).

- פריחה מפושתת, חום גבוה ובלוטות לימפה מוגדלות (תסמונת DRESS או תסמונת רגישות היתר לתרופה).

- יש לך כאבי שרירים ומיחושים לא רגילים**, אשר נמשכים זמן רב יותר מהמצופה. כמו עם סטטינים אחרים, מספר מצומצם של מטופלים חוו השפעה בלתי נעימה בשרירים, ולעיתים נדירות תופעה זו הופכת למסכנת חיים, פוגעת בשרירים וידועה בשם רדומיוליזיס (rhabdomyolysis).

- יש לך קרע בשריר.**

- יש לך תסמונת דמוית זאבת** (lupus-like disease) (syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שמופיעות ב-10 מ"ג משתמשים מתוך 100):

- כאבי ראש
- כאבי בטן
- עצירות
- הרגשת חולי
- כאב שרירים
- חולשה
- סחרחורת

עלייה בכמות החלבון בשתן - זו בדרך כלל חוזרת לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עבור רוזובסטטין אינובמד 40 מ"ג).

סוכרת. הסיכון לפתח סוכרת סביר יותר אם הינך בעל רמות גבוהות של שומנים וסוכר בדם, בעל עודף משקל ולחץ דם גבוה. עליך להיות במעקב רפואי במשך תקופת הטיפול.

תופעות לוואי שאינן שכיחות (uncommon) (תופעות שמופיעות ב-10 מ"ג משתמשים מתוך 1,000):

- פריחה בעור.
- גרד או תגובות עוריות אחרות.
- עלייה בכמות החלבון בשתן - זו בדרך כלל חוזרת לנורמה ללא צורך להפסיק ליטול את התכשיר (רק עבור רוזובסטטין אינובמד 5 מ"ג, 10 מ"ג ו-20 מ"ג).

תופעות לוואי נדירות (rare) (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- תגובה אלרגית חמורה שסימניה כוללים: נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון ו/או הגרון, קושי בבליעה ונשימה, גרד חמור בעור (עם שלפוחיות מורמות). **אם הינך חושב שיש לך תגובה אלרגית, הפסק לקחת רוזובסטטין אינובמד** ופנה מיד לעזרה רפואית.
- פגיעה בשרירי במבוגרים – **ליתר ביטחון, הפסק לקחת רוזובסטטין אינובמד דובר עם הרופא שלך מיד אם אתה חש במיחושים או בכאבי שרירים לא רגילים הנמשכים יותר זמן מהמצופה.**
- כאב בטן חמור (דלקת בלבלב).
- עלייה באנזימי כבד בדם.
- דימום או נטייה מוגברת לחבלות בשל רמות נמוכות של טסיות דם.

- תסמונת דמוית זאבת (lupus-like disease syndrome) (כולל פריחה, הפרעות במפרקים והשפעה על תאי הדם).

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) (תופעות המופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000):

- צהבת (צהבת העור והעיניים)
- הפטיטיס (דלקת בכבד)
- עקבות דם בשתן
- נזק לעצבים בזרועות וברגליים (כגון חוסר תחושה או תחושת נימול)
- כאבי פרקים
- אובדן זיכרון
- הגדלת החזה בגברים (gynecomastia)

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (תופעות ששכיחותן טרם נקבעה):

- שלשול
- שיעול
- קוצר נשימה
- בצקת (נפיחות עקב הצטברות נוזלים)
- הפרעה בשינה, כולל נדודי שינה וחלומות בלהה
- בעיות בתפקוד המיני
- דיכאון
- בעיות נשימה כולל שיעול מתמיד ו/או קוצר נשימה או חום פציעה בגיד
- חולשת שרירים קבועה
- מיאסטיניה גריבס (Myasthenia gravis – מחלה הגורמת לחולשת שרירים כללית ובמקרים מסוימים גם חולשה בשרירים המעורבים בנשימה).
- מיאסטינה אוקולרית (מחלה הגורמת לחולשה בשרירי העין).

היוועץ ברופא שלך אם הינך חווה חולשה בזרועות או ברגליים אשר מתחמרה לאחר תקופות של פעילות, ראייה כפולה או שמיטה של העפעפיים, קושי בבליעה או קוצר נשימה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

לדיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "לדיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

יש לאחסן בטמפרטורה מתחת ל-25°C.

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. **אל תגרום להקאה** ללא הוראה מפורשת ורפוא!

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

נא לשים לב לתאריך התפוגה של התכשיר! בכל מקרה של ספק, עליך להיוועץ ברוקח שסיפק לך את התרופה.

אין לאחסן תרופות שונות באותה אריזה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, cellulose microcrystalline, crosopvidone, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, triacetin, sodium hydrogen carbonate, iron oxide red.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

רוזובסטטין אינובמד 5 מ"ג: הינה טבליה ורודה, עגולה, מצופה