

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

## تريلپتین 300 ملغم أقراص مطبلية المادة الفعالة:

**يحتوي كل قرص على:**  
أوكسکاربازپین 300 ملغم  
Oxcarbazepine 300 mg

المواد غير الفعالة:  
أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية».

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء، تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.  
كنت تناول أية أدوية التي تزيد من نتاج البول (الأدوية المدرة للبول)  
كنت ت تعالج بأدوية أخرى مضادة للصرع أو بأدوية من فصيلة حاجبات قنوات الكالسيوم  
من المهم جداً أن يقوم الطبيب بفحصك بفحوص زمنية محددة  
بلغ طيبك إذا كنت تعاني من زيادة في شفوع التوبات. هذا الأمر هام بشكل خاص بالنسبة للأطفال لكنه قد يحدث أيضاً لدى الكبار من الجائز أن تضرر لجزء فحوص الدم للتأكد من أنك تناول أفضل علاج ممكن. كأنه متعلق بالحالة الصحية.  
قبل كل علاج طبي طاري، أو أي نوع من جراحه أو علاج الأنسان عليك إعلام الطبيب المسؤول عنك، بأنك تناول تريلپتین.

تريلپتین مخصص لعلاج نوبات توتيرية – إرتاجاجية عامة أولية ونوبات جزئية مع أو بدون انتشار عام ثانوي.  
**1. لا يُغَرِّر العلاج (epilepsy).**  
الفصيلة العلاجية:  
من مضادات الصرع.  
الصرع هو مرض يتميز بنوبات وإختلالات متكررة.

## 2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:  
وجد لديك فرط حساسية (ألرجيا) معروفة لـ أوكسکاربازپین (المادة الفعالة بـ تريلپتین). إيسليکاربازپین (مادة فعالة مشابهة لـ أوكسکاربازپین)  
أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 «معلومات إضافية»).  
إذا كان هذا الأمر ينطبق عليك، بلغ الطبيب قبل تناول تريلپتین.  
إذا كنت تعتقد بأنه من الجائز أن لديك حساسية، إستشر الطبيب.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء  
تجوَّح حالاً إلى طيبك إذا ظهرت لديك أمراض جانبية تدل على رد فعل من فرط الحساسية، من شأنها أن تظهر على شكل إنفاسخ في الشفتين، الوجه أو الرقبة الذي يترافق بصعوبة في التنفس، التكلم أو البلع. طفح جلدي، سخونة وألم في المفاصل.

إذا كنت تتناولين تريلپتین في أثناء إستعمال وسائل منع الحمل الفموية (أقراص منع الحمل) فمن الجائز أن تكون الدورة الطمثية لديك غير منتظمة. من الجائز ألا يعمل قرص منع الحمل ويتوارد عليك التحدث مع طيبك بالنسبة لـ أي من وسائل منع الحمل الإضافية الأخرى [مثلاً لولب رحمي (حلقة)] من شأنها أن تناسبك.

قبل العلاج – تريلپتین، ادْعِ للطبيب إذا:  
تطور لديك ذات مرة طفح جلدي غير عادي أو علامات أخرى من الحساسية خلال علاج سابق بأوكسکاربازپین (تريلپتین)، إيسليکاربازپین (مادة فعالة مشابهة لـ أوكسکاربازپین)، كاربامازپین أو أي دواء آخر

لديك مرض في القلب  
لديك مرض كلوي أو مرض كبدى

كانت تناول فحوص الدم التي أجريتها شديدة  
كنت تناول أية أدوية التي تزيد من نتاج البول (الأدوية المدرة للبول)

كنت تعالج بأدوية أخرى مضادة للصرع أو بأدوية من فصيلة حاجبات قنوات الكالسيوم  
من المهم جداً أن يقوم الطبيب بفحصك بفحوص زمنية محددة  
بلغ طيبك إذا كنت تعاني من زيادة في شفوع التوبات. هذا الأمر هام بشكل خاص بالنسبة للأطفال لكنه قد يحدث أيضاً لدى الكبار من الجائز أن تضرر لجزء فحوص الدم للتأكد من أنك تناول أفضل علاج ممكن. كأنه متعلق بالحالة الصحية.

قبل كل علاج طبي طاري، أو أي نوع من جراحه أو علاج الأنسان عليك إعلام الطبيب المسؤول عنك، بأنك تناول تريلپتین.  
بلغ طيبك أو الصيدلي إذا كنت تعاني من أمراض أخرى أو إذا كنت تعاني من أية حساسية.  
لقد حصلت لدى عد قليل من الأشخاص المتعالجين بأدوية مضادة للصرع مثل تريلپتین أفكار عن إلحاق الضرر بالذات أو الاتجار. إذا حصلت لديك مثل هذه الأفكار، في أي وقت كان، تجوَّح حالاً إلى طيبك.

الفحوص والمتابعة  
قبل العلاج – تريلپتین وخالله، من الجائز أن يقوم طيبك بإجراء فحوص الدم لتحديد المقدار الدوائي بالنسبة لك. يقول لك الطبيب متى يتوجب عليك إجراء الفحوص.

التدخّلات/التفاعلات بين الأدوية  
إذا كنت تستعملين وسيلة منع حمل هرمونية (مثل قرص لمنع الحمل). فإن تريلپتین قد يجعلها غير فاعلة. لذلك، يتوجب عليك إستعمال وسيلة منع حمل أخرى أو إضافية، غير هرمونية [مثلاً لولب رحمي (حلقة)]. خلال فترة العلاج بـ تريلپتین.

الارتفاع  
إذا كنت تتناولين هذا الدواء، إستشيري طيبك قبل أن تبدئي بالإرتفاع. إن المادة الفعالة في تريلپتین تنتقل إلى حليب الأم. بالرغم من المعلومات المتوفرة التي تبين بأن كمية تريلپتین التي تنتقل إلى الطفل الرضيع هي قليلة، فإنه لا يمكن نفي خطورة حدوث أعراض جانبية لدى هذا الرضيع. ستحتاج عـك طيبك عن الفوائد والمخاطر المحتملة بالإرتفاع خلال فترة العلاج – تريلپتین. إذا كنت ترضعين خلال فترة العلاج – تريلپتین، وكانت تعتقدين بأن رضيعك يقاوم من أعراض جانبية مثل ميل زائد للنون أو زيادة قليلة في الوزن، فتوجهي فهو إلى الطبيب.

### السيادة واستعمال الماكينات

من شأن هذا الدواء أن يؤثر على رود فعلك وعلى القدرة على السيادة أو إستعمال الأدوات أو الماكينات. من شأن تريلپتین أن يسبب لك الشعور ببعض أو دوار بشكل خاص في بداية العلاج أو عند رفع المقدار الدوائي، ومن شأنه أن يؤدي إلى تشوش في الرؤية. إندماج الرؤية، قلة التنسيق في العضلات أو تدني مستوى الوعي، بالنسبة للأطفال، يجب تحديدهم من الركوب على الدراجات أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

إن قدرك على السيادة واستعمال الأجهزة أو الماكينات قد تتأثر أيضاً من مرضك. لمعلومات إضافية راجع طيبك.

يجب بعد العلاج – تريلپتین فقط بعد فحص طبي شامل. تريلپتین مناسب لكثير من المتعالجين الذين يعانون من الصرع، لكن ليس لجميعهم.

### 3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب إستعمال المستحضر دائمًا بحسب تعليمات الطبيب. عليك الاستبضاخ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

#### المقدار الدوائي

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.  
لا تقم بتغيير المقدار الدوائي الذي وصف لك، راجع الطبيب أو الصيدلي الخاص بك إذا كنت تعتقد أن تأثير الدواء أضعف أو أقوى من اللازم.  
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

إذا كنت تستعمل، وإذا استعملت مؤخرًا أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، إـحـك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك، بالأخذ إذا كنت تستعمل.

أدوية أخرى لعلاج الصرع (مثل: كاربامازپین، فينوباربیتال أو فينیتوپین) ریفارمیپسین  
فیلوبوپین (العلاج إنرتفاع ضغط الدم)  
الأدوية التي تخفض نسبة الصوديوم في الدم مثل المدرات البولية (أدوية تساعد الكل على طرح الملح والماء من الجسم بواسطة زيادة كمية البول)  
الأدوية التي تنظم جهاز المناعة (مثل سیکلوكسپورین)

استعمال تريلپتین والطعام  
بالإمكان تناول الدواء خلال وجبة الطعام أو بعدها.

استعمال تريلپتین وإستهلاك الكحول  
لا يجوز شرب الكحول خلال فترة العلاج – تريلپتین.

#### المسنون

بالإمكان إستعمال تريلپتین لدى الكبار ما فوق عمر 65 سنة، مع التقيد بإرشادات الطبيب.

#### الأطفال والمرأهقون

بالإمكان إستعمال تريلپتین لدى الأطفال من عمر سنين وما فوق، مع التقيد بإرشادات الطبيب.

#### الحمل

يجب إبلاغ الطبيب إذا كنت في فترة الحمل. مرضعة أو تخططن للحمل.

من المهم تجنب نوبات الصرع خلال فترة الحمل. مع ذلك، إن تناول تريلپتین (أو أدوية أخرى مضادة للصرع) خلال فترة الحمل قد يعرض رضيعك للخطورة.

لا يمكن نفي خطورة حدوث إضطرابات في النمو العصبي لدىأطفال تعاني منهم من مرض الصرع وتتعالج – أوكسکاربازپین.

يبلغك الطبيب ما هي الفوائد والمخاطر المحتملة ويقرر فيما إذا كان بوسعي مواصلة العلاج بـ تريلپتین.

**طريقة التناول**  
يوجد للأعراض المطلية خط للشطر بحيث يمكن شطرها إلى نصفين وبذلك يسهل من بعها. يجب بل الأعراض المطلية مع كمية قليلة من سائل.

#### إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بل طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

#### إذا تناولت تناول تربليتين

إذا نسبت تناول جرعة دوائية واحدة في الوقت المحدد، يجب تناول الجرعة الدوائية حال تذكرك. لكن، إذا كان قد حان موعد تناول الجرعة الدوائية القادمة، فلا تتناول الجرعة الدوائية المنسية. بل العودة لنظام المقدار الدوائي الاعتيادي. لا يجوز أبداً تناول جرعة دوائية مضاعفة.

إذا نسبت تناول تربليتين على العلاج بحسب توصيات الطبيب. الأمر مهم للحصول على النتائج الأفضل ولخفض خطرة حدوث أعراض جانبية.

#### إذا توقفت عن تناول تربليتين

لا تتوقف عن العلاج بشكل مفاجئ من دون استشارة طبيبك. يبلغ الطبيب من وكيفية التوقف عن العلاج، إن إيقاف تربليتين بشكل مفاجئ قد يفاقم من وضعك.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء، ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

#### إذا توفر لديك أسللة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

#### 4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال تربليتين قد يسبب أعراضًا جانبية عند بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أي منها. تظهر هذه عادة مع بداية العلاج وتختفي بعد عدة أيام. إذا كنت تشعر بواء أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية، توجه حالاً إلى الطبيب أو تأكد من فعل ذلك من قبل شخص آخر من أبنك.

من شأن هذه الأعراض أن تكون علامات أولية لأعراض جانبية خطيرة التي تتطلب علاجاً فوريًا.

إنفاس الشفتين الوجه أو الرقبة، الذي يترافق بصعوبات في التنفس، الكلام أو في البالغ أو ردود فعل أخرى مثل: طفح جلدي سخونة وألم في المفاصل.

ردود فعل جلدية خطيرة مثل طفح جلدي، إحمرار الجلد، حويصلات على الشفتين.

العينين أو الفم وتقشر الجلد التي تترافق بسخونة. هذه الأعراض أكثر شيوعاً لدى متعالجين من دول آسيوية معينة (مثلاً تايلاند، ماليزيا والفيتنام) ولدى متعالجين من أقل صيني.

إنفاس الكاحلين، راحتي القدمين أو الجزء الأسفل من الرجل.  
إرباك شديد، نعاس، صداع أو صعوبات في تحريك الذراعين أو الرجلين.

علامات لأعراض خطيرة تؤثر على الجلد أو على الأنسجة المخاطية مثل حويصلات تقشر الجلد، ردود فعل تحسسية خطيرة.

سخونة، ألم في الحنجرة، تقرحات في جوف الفم، كدمات ليس لها تفسير يصبح لون الجلد مائل لل أحمر أو البنفسجي.

أعراض تشيه الإنفلونزا مع برقان (علامات إلتهاب الكبد).

آلام شديدة في أعلى البطن، تقيؤات، فقدان الشهية للطعام (علامات إلتهاب البنكرياس).

لدى الأطفال بأعمار تقل عن 4 سنين: وسن (نوم). رجفان. تناقص الشهية للطعام وسخطة، إنفاس وألم في المفاصل.

توجه إلى طبيبك بأسرع ما يمكن إذا كنت تشعر بواء أو أكثر من الأعراض الجانبية التالية:

صداع، رجفان، الشعور بوخز في راحتي اليدين وراحتي القدمين، طفح جلدي، عدم إنتظام الدورات الطبلية، طنين في الأذنين ليس له تفسير، إضطرابات في تناسق الحركات (coordination)، تقلبات في المزاج بشكل دائم، قلق، إكتئاب، إضطرابات في النطق.

إلغ، عن حدوث أعراض خطيرة لدى المتعالجين الذين يتلقون علاجاً متواصلاً مثل قلة الظمآن (تناقص كثافة العظام)، ومرض هشاشة العظام (ترفق العظام) وأيضاً كسر في العظام.

أعراض جانبية شائعة جداً (ظهور لدى أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة):

إرهاق، صداع، نعاس، دوار، غثيان، تقيؤات، رؤية مزدوجة.

أعراض جانبية شائعة (ظهور لدى 1 حتى 10 مستعملين من بين 100):

زيادة الوزن، إسهال، إمساك، ألم في البطن، إضطرابات في الرؤية، ضبابية الرؤية، حب الشباب، تساقط الشعر ضعف، إضطرابات في الذاكرة، قلة راحة جسدية (agitation).

أعراض جانبية نادرة جداً (ظهور لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000):

ارتفاع ضغط الدم، تناقص حمض الفوليك.

**أعراض جانبية إضافية:**  
إضطرابات في النوم، تناقص الوزن، إنفاس ضغط الدم.

عادة، هذه الأعراض الجانبية لا تتطلب علاجاً، لكن إذا تواصلت لأكثر من عدة أيام أو إذا كانت نسبة لك مشاكل معينة، فعليك استشارة طبيبك.

إذا ظهر عرض جانببي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانببي لم يذكر في هذه النشرة، عليك استشارة الطبيب.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج (وأو) الموجود على الصفحة الرئيسية «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج (وأو)» ([www.health.gov.il](http://www.health.gov.il)) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

**تريليتين 600 ملغ القرص:**  
Cellulose, microcrystalline; crospovidone; hypromellose; magnesium stearate; silica, colloidal anhydrous.

طلاء القرص:  
Hypromellose; titanium dioxide; macrogol 4000; talc; iron oxide, red; iron oxide, black.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة  
تريليتين 300 ملغ:

قرص مطلي، بيضاء، أصفر، محدب قليلاً من كلا الجانبين. عليه علامة شطر TE/TE من جانب واحد. وعلامة شطر والطباعة CG/CG من الجانب الثاني.

تريليتين 600 ملغ:  
قرص مطلي، بيضاء، لونه زهري فاتح، محدب قليلاً من كلا الجانبين. عليه علامة شطر والطباعة TF/TF من جانب واحد. وعلامة شطر والطباعة CG/CG من الجانب الثاني.

يتم تسويق كلا العلويين بعلب ذات 50 قرصاً.

صاحب الإمتياز والمصنوعة وعنوانه: نوفارتس إسرائيل، م.ض.. ص.ب. 7126، تل أبيب.

تم تحديث هذه النشرة في آب 2023

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:  
أقراص 300 ملغ - 106 80 28707

أقراص 600 ملغ - 106 81 28708

من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور على الرغم من ذلك. فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

**6 معلومات إضافية**  
يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على:

تريليتين 300 ملغ

القرص:

Cellulose, microcrystalline; crospovidone; hypromellose; magnesium stearate; silica, colloidal anhydrous.

طلاء القرص:

Hypromellose; talc; titanium dioxide (C.I. no. 77891, E171); macrogol 8000; iron oxide, yellow (C.I. no. 77492, E 172).