

|                                       |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|
| <div><span><span></span></span></div> | <div>NOVARTIS</div>        |
| <span></span>                         | <span></span>              |
| <span><span></span></span>            | <span><span></span></span> |
| <span><span></span></span>            | <span><span></span></span> |
| <span><span></span></span>            | <span><span></span></span> |
| <span><span></span></span>            | <span><span></span></span> |
| <span><span></span></span>            | <span><span></span></span> |
| <span><span></span></span>            | <span><span></span></span> |
| <span><span></span></span>            | <span><span></span></span> |
| <span><span></span></span>            | <span><span></span></span> |

**עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז- 1986**

**התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד**

## סנדאיומן ניאורל 25 מ"ג כמוסות

כל כמוסה מכילה:
ציקלוספורין 25 מ"ג
Ciclosporin 25 mg

### סנדאיומן ניאורל 50 מ"ג כמוסות

כל כמוסה מכילה:
ציקלוספורין 50 מ"ג
Ciclosporin 50 mg

## סנדאיומן ניאורל 100 מ"ג כמוסות

כל כמוסה מכילה:
ציקלוספורין 100 מ"ג
Ciclosporin 100 mg

## סנדאיומן ניאורל 100 מ"ג/מ"ל תמיסה לשתייה

**תמיסה לשתייה:** כל 1 מ"ל מכיל: ציקלוספורין 100 מ"ג
Ciclosporin 100 mg

חומרים בלתי פעילים: ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
ראה גם סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

**קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם שתשתמש בתרופה.**
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה.
אם יש לך שאלות שאינה נענה אל הן הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך.
אל תעביר אותה לאחרים.
היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

### 1. למה מיועדת התרופה?

- טיפול מניעתו של מחיית שתל בהשתלת כליה, כבד ולב שביטוב עם קורטיקוסטרואידים.
- טיפול בעת השתלת מח עצם.
- טיפול בדלקת עיניים מסוג אובאיטיס (דלקת הענבייה) שאינה על רקע זיהומי (Endogenous uveitis).
- טיפול בתסמונת נפרוטית מסוג MCD (Minimal Change disease) כאשר הטיפול הרגיל נכשל.
- טיפול במקרים קשים של דלקת מפרקים שגרונית כאשר הטיפול הרגיל אינו יעיל או שאינו מתאים.
- טיפול במקרים קשים של פסוריאזיס בחולים מעל גיל 16 שאינם מגיבים לטיפול אחר.
- טיפול במקרים קשים של אסתמה של העור (atopic dermatitis) במבוגרים למשך 8 שבועות עברת, כאשר הטיפול הרגיל אינו יעיל או אינו מתאים.
- טיפול בהשגתה של איבר או של מח עצם התפקיד של סנדאיומן ניאורל הוא לזושת את מערכת החיסון בגופך.

סנדאיומן ניאורל מונעת דחייה של איברים מושתלים על-ידי חסימת התפתחותם של תאים מיוחדים שאינם נורמלי יתקפו את הרקמה המושתלת.
סנדאיומן ניאורל מונעת דחייה של איברים מושתלים בהם הינך סובל ממחלה שאינה קשורה בהשתלה, בה תגובה חיסונית של גופך תוקפת את התאים בגופך (מחלה אוטואימונית), סנדאיומן ניאורל מדכאת את התגובות החיסוניות במחלות אלו.

**קבוצה תרפויטית:** מדכאים של מערכת החיסון.

### 2. לפני השימוש בתרופה

אם אתה לוקח סנדאיומן ניאורל לאחר השתלה, התרופה תירשם לך על-ידי מומחה בעל ניסיון בהשתלות ו/או במחלות אוטואימוניות.
המידע בעלון הן עשוי להשתנות בהתאם לסיבה לנטילת התרופה - לאחר השתלה או עבור טיפול במחלות אוטואימוניות.
מלא בדיוק אחר הוראות הרופא שלך. הן עשויות להיות שונות מהמידע הכללי בעלון זה.

|   |
|---|
| <p><b>אין להשתמש בתרופה אם:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>הינך אלרגי לציקלוספורין או לאחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה, המצויינים בסעיף 6.</li> <li>הינך נוטל תכשירים המכילים היפריום (<i>Hypericum perforatum</i>).</li> <li>הינך נוטל תכשירים המכילים <i>Dabigatran etexilate</i> (למניעת קרישי דם לאחר ניתוח) או בוסנטן (<i>Bosentan</i>) ואליסקירן (<i>Aliskiren</i>) (טיפול ביתר לחץ דם).</li></ul> <p>אם מקרים אלו רלבנטיים אליך, <b>יש ליידע את הרופא מבלי לקחת סנדאיומן ניאורל.</b> אם אינך בטוח, יש להתייעץ עם הרופא לפני התחלת הטיפול בסנדאיומן ניאורל.</p> |
|---|

**אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני ובמהלך טיפול בסנדאיומן ניאורל, יש ליידע את הרופא באופן מיידי:**

- אם יש לך סימנים של זיהום, כגון חום גבוה או כאב גרון. סנדאיומן ניאורל מדכאת את מערכת החיסון ולעולה להשפיע על יכולת הגוף להילחם בזיהומים.
  - אם אתה סובל מבעיות בכבד.
  - אם אתה סובל מבעיות בכליות. הרופא שלך יערוך בדיקות דם סדרות ועשוי להתאים את המינון במידת הצורך.
  - אם אתה מפחד לחץ דם גבוה. הרופא שלך יבדוק לך לחץ הדם שלך באופן סדיר ויתכן שייתן לך תרופה להורדת לחץ דם בהתאם לצורך.
  - אם יש לך רמות נמוכות של מגניזיום. יתכן שהרופא ייתן לך תוספי מגניזיום, במיוחד לאחר ניתוח להשתלת איברים.
  - אם יש לך רמות גבוהות של אשלגן בדם.
  - אם הינך סובל משידון (Gout).
  - אם אתה צריך לקבל חיסון.
  - אם מקרים אלו רלבנטיים אליך לפני או במהלך הטיפול בסנדאיומן ניאורל, פנה לרופא מיד.
- הגנה מפני חשיפה לשמש**

סנדאיומן ניאורל מדכאת את מערכת החיסון.
על כן, מגבירה את הסיכון להתפתחות סוגי סרטן, במיוחד סרטן העור ומערכת הלימפה.
עליך להגביל את החשיפה לשמש ולקרינת UV על-ידי לבישת בגדים מגנים מריחת קרם הגנה בעל קדם הגנה גבוה ליעילים תכופות.

**יש ליידע את הרופא לפני התחלת הטיפול אם:**

- יש לך או היו לך בעיות הקשורות בתלות באלכוהול
- יש לך אפילפסיה
- יש לך בעיות כלשהן בכבד
- את בהריון
- את מיניקה
- התרופה ניתנת לילד

אם מקרים אלו רלבנטיים אליך (או שאתה לא בטוח), פנה לרופא לפני נטילת סנדאיומן ניאורל.
זאת, מכיוון שהתרופה מכילה אלכוהול (אתנול).
ראה סעיף "שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול".

#### בדיקות במהלך הטיפול בסנדאיומן ניאורל

הרופא שלך יערוך את הבדיקות הבאות:

- רמות האשלגן בדם** - בעיקר אם עברת השתלה.
- לחץ דם** לפני התחלת הטיפול ובאופן קבוע במהלך הטיפול.

- תפקודי כבד וכליה.**
- רמות שומנים בדם.**

אם יש לך שאלות בנוגע לאופן השימוש בתרופה או למה תרופה זו נרשמה עבורך, פנה לרופא.

**אם הינך מקבל סנדאיומן ניאורל למצבים שאינם לאחר השתלה** (כגון: דלקת עיניים מסוג אובאיטיס, אובאיטיס של הלשכה המרכזית או האחורית של העין או אובאיטיס על רקע מחלה נכבד בכוֹּץ, אסתמה של העור, דלקת מפרקים שגרונית קשה או תסמונת נפרוטית), אין ליטול סנדאיומן ניאורל אם יש לך:

- בעיות בכליות (פרט לתסמונת נפרוטית)
- זיהומים שאינם פעילים בעזרת תרופות
- סרטן מכל סוג שהוא
- לחץ דם גבוה שאינו מאוזן על-ידי תרופות. במקרה שמפתח לחץ דם גבוה במהלך הטיפול ולא ניתן לאזנו, על הטיפול להפסיק את הטיפול בסנדאיומן ניאורל
- אין ליטול סנדאיומן ניאורל אם אחד מהמקרים הנ"ל חלים עליך. אם אתה לא בטוח, פנה לרופא או לרוקח לפני נטילת סנדאיומן ניאורל.

אם אתה טלח מטופל בדלקת אובאיטיס משנית למחלת בכבֿוֹץ (Behçet's uveitis), הרופא ינטר את מהלך הטיפול עם סנדאיומן ניאורל בקפדנות במיוחד אם יש לך סימפטומים נוירולוגיים (לדוגמא: שכתה מוגברת, שניוים אישיותיים המורגשים עם הזמן, הפרעות פסיכיאטריות או הפרעות במצבי הרוח, תחושת "שריפה" בגפיים, תחושה מוחלשת בגפיים, חוששת עקצוץ בגפיים, חולשה בגפיים, הפרעות בליכה, כאב ראש או כל ללא בחילה והקאה, הפרעות בריאה כולל תזונה מוגבלת של העין).

אם הינך קרשי ומטופל בסנדאיומן ניאורל עבור פסוריאזיס או אסתמה של העור, עליך להימנע מחשיפה לכל סוג של UV אוב או טיפול לאור (פוטותרפיה) במהלך הטיפול. הרופא ינטר בקפדנות את מהלך הטיפול.

#### ילדים ומתבגרים

אין לתת סנדאיומן ניאורל לילדים עבור מצבים שאינם לאחר השתלה, פרט לטיפול בתסמונת נפרוטית.

#### קשישים (בגיל ונהלה)

ישנו ניסיון מוגבל במתן סנדאיומן ניאורל לחולים קשישים. הרופא שלך צריך לנטר את תפקודי הכליה שלך. אם אתה מעל גיל 65 ויש לך פסוריאזיס או אסתמה של העור אתה מטופל בסנדאיומן ניאורל רק במקרה שהמחלה חמורה במיוחד.

#### אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

**אם אתה לוקח, או אם אתה לוקח לאחרונה, תרופה על כן כולל תרופות ללא מחשם ותוספי תזונה, ספר על כן לרופא או לרוקח.**

יש ליידע את הרופא או הרוקח לפני נטילת סנדאיומן ניאורל במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות שעשויות להשפיע על רמות האשלגן כגון תרופות המכילות אשלגן, תוספי ראשל, משנתים מסוג אצטרז אשלגן ותרופות מסוימות להורדת לחץ דם.
- מוטורקסטי. תרופה זו משמשת לטיפול בגידודים, בפסוריאזיס חמור ובדלקת מפרקים שגרונית קשה.
- תרופות שעשויות להעלות או להוריד את רמות ציקלוספורין (החומר הפעיל בסנדאיומן ניאורל) בדם.
- הרופא עשוי לבדוק את ריכוז הציקלוספורין בדמך כאשר מתחילים או מסיימים טיפול תרופתי אחר.

- תרופות שעשויות להעלות את רמות הציקלוספורין בדם:
אנטיביוטיקות (כגון: אריתרומיצין, איתרומיצין, איתרומיצין),
תרופות אנטי-פטרייתיות (וריקונאזול, איטראקונאזול),
תרופות המשמשות לבעיות בלב או לחץ דם גבוה (כגון: דילטיאזם, ניקרדיפין, וורפאסין, אמידיון),
מוטקולופראמיד (משמשת להפסקת בחילות),
גלולות למניעת היריון,
דנאזול (משמשת לטיפול בהפרעות של הווסת),
תרופות המשמשות לטיפול בשידון (אליפורגולו),
חומצה כולית ונגזרותיה (משמשות לטיפול באבני מרה),
מעכבי פרטנאזות המשמשים לטיפול באיידס, אימטיניב (משמשת לטיפול בלוקמיה או בגידולים), קולכיצין,
סלפרברי (משמשת לטיפול בפרקס כבד C), קאנדידילול (משמש בן השאר לטיפול בפרכוסים).
- תרופות שעשויות להוריד את רמות הציקלוספורין בדם:
ברביטרטים (תרופות המשמשות להשראת שינה),
נוגדי פרכוסים מסוימים (כגון קרבמזפין, פיניטואין),
אוקטרוטיד (משמש לטיפול באקרומגליה או גידולים היווראדוקרניים במעי),
תרופות אנטי-בקטריאליות המשמשות לטיפול בשחפת, אורליסטט (מסייעת בהורדה במשקל),
תרופות צמחיות (שימשות לטיפול באבני מרה),
תרופות מסוימות להורדת לחץ דם (בוסנטן, וטרבינאפין (תרופה אנטי-פטרייתית המשמשת לטיפול בזיהומים של הבהונות והציפורניים).
- תרופות אחרות שעשויות להשפיע על הכליות כגון תרופות אנטי-בקטריאליות (גנטמיצין, טרבומיצין, ציפרופלוקסאצין),
תרופות אנטי-פטרייטיות המכילות אמפוטריצין B,
תרופות נגד דלקת בדרכי השתן המכילות טרימטופרים,
תרופות לטיפול בסרטן המכילות מלפלאקן,
תרופות המשמשות להורדת כמות החומצה בקיבה (מעכבי הפרשת חומצה מסוג אנטגוטיסטים לרצפטור-H2),
טקרולימוס,
משככי כאבים (תרופות נוגדות לדלת שאינן סטירואידיות כגון דיקלופנאק),
חומצה פיברית (המשמשת להורדת שומן בדם).
- ניפדיפין. המשמשת לטיפול בלחץ דם גבוה ותועקת לב.
יתכן כי תיגרם לפיתוח של התיכיים שתפשט לעבר השיניים, אם לוקחים ניפדיפין במהלך הטיפול עם ציקלוספורין.

- דיאקסין (משמשת לטיפול בבעיות בלב),
תכשירים להורדת כולסטרוול (מעכבי HMG-CoA דרוקטאז הנקראים גם סטטינים),
פרדניזולון,
אטופוסיד (משמשת לטיפול בסרטן),
רפגליניד (תכשיר נגד סוכרת במתן דרך הפה),
מדכאים של מערכת החיסון (אברולימוס, סירוליומוס),
אמברינסטאן ותרופות אנטי-סרטניות ספציפיות הנקראות אנטראציקלינים (כגון דוקסורוביצין).

- מיקופנולט סדוים או מיקופנולט מופטייל (מדכאת של מערכת החיסון) ואלטרובומפג (משמשת לטיפול בהפרעות דמם).

אם מקרים אלו רלבנטיים אליך (או שאתה לא בטוח), פנה לרופא לפני נטילת סנדאיומן ניאורל.

#### שימוש בתרופה ומזון

אין ליטול סנדאיומן ניאורל עם אשכולית או מיץ אשכוליות מאחר והדבר עשוי להשפיע על פעולת התרופה.

#### הריון והנקה

יש להתייעץ עם הרופא או הרוקח לפני נטילת התרופה.

**יש ליידע את הרופא אם את בהריון או מתכוונת להיכנס להריון.**
הניסיון עם סנדאיומן ניאורל בהריון הינו מוגבל.
באופן כללי, אין להשתמש בסדאיומן ניאורל במהלך הריון.
אם עלייך ליטול תרופה זו, הרופא ידון עימך בתועלת ובסיכונים האפשריים הכרוכים בנטילת התרופה במהלך הריון.

**יש ליידע את הרופא אם את מיניקה.**
לא מומלץ להניק במהלך הטיפול עם סנדאיומן ניאורל מאחר וציקלוספורין, החומר הפעיל בסנדאיומן ניאורל, עובר בחלב האם ועלול להשפיע על תינוקך.

#### הפטיטיס C (צהבת C)

ספר לרופא שלך אם יש לך הפטיטיס C.
תפקודי הכבד שלך עלולים להשתנות תחת טיפול הפטיטיס C, והדבר עלול להשפיע על רמות ציקלוספורין בדמך.
הרופא שלך עשוי להירשף לנטר בקפדנות את רמות הציקלוספורין בדמך ולבצע התאמות מינון לאחר שתתחיל טיפול הפטיטיס C.

#### נהיגה ושימוש במכוונת

אתה עלול להרגיש ישנוני, מבולבל או לחוות שטטוש ראייה לאחר נטילה של סנדאיומן ניאורל.
עליך להיות זהיר בעת נהיגה או הפעלת מכוונת כאשר אתה נוטל סנדאיומן ניאורל עד שתלמד כיצד תרופה זו משפיעה עליך.
באשר לילדים, יש להזהרים מרכיבה על אופניים או משחקים בקרבת הכביש וכוונתם.

#### שימוש בתרופה וזריכת אלכוהול

כל כמוסה של סנדאיומן ניאורל 25 מ"ג, 50 מ"ג ו-100 מ"ג מכילה 25 מ"ג, 50 מ"ג ו-100 מ"ג (אלכוהול) בהתאמה, שהינו שווה ל-11.8% אחוז נפול. כל מ"ל של סנדאיומן ניאורל 100 מ"ג/ml תמיסה לשתייה מכיל 94.70 מ"ג אתנול (אלכוהול) שהינו שווה ל-12% אחוז נפח.

המנה של 500 מ"ג של סנדאיומן ניאורל מכילה אלכוהול בכמות שוות ערך לכ-13 מ"ל של בירה או 5 מ"ל יין.
לכמות קטנה זו של אלכוהול אין כל השפעה ניכרת.

**מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה סנדאיומן ניאורל מכילה שמן קיק (castor oil).**
סנדאיומן ניאורל מכילה שמן קיק, העלול לגרום לאי נוחות בקיבה ולשלשול.

#### סנדאיומן ניאורל מכילה פרופילן גליקול

תרופה זו מכילה 46.42 מ"ג פרופילן גליקול בכל כמוסה בת 25 מ"ג.

תרופה זו מכילה 90.36 מ"ג פרופילן גליקול בכל כמוסה בת 50 מ"ג.

תרופה זו מכילה 148.31 מ"ג פרופילן גליקול בכל כמוסה בת 100 מ"ג.

תרופה זו מכילה 94.70 מ"ג פרופילן גליקול בכל מ"ל של תמיסה לשתייה.

אם תינוקך בן פחות מארבעה שבועות, פנה אל הרופא או אל הרוקח לפני שתינתן תרופה זו, ובפרט אם התינוק מקבל תרופות אחרות המכילות פרופילן גליקול או אלכוהול.

#### סנדאיומן ניאורל מכילה נתון

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מיליגמול נתון (23 מ"ג) בכל כמוסה בת 25 מ"ג, 50 מ"ג ו-100 מ"ג, וניתן לומר כי היא למעשה "נטולת נתון".

### 3. כיצד השתמש בתרופה?

תמיד יש להשתמש לפי הוראות הרופא.
עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

אין לעבור על המנה המומלצת.

מינון התרופה יותאם לך על-ידי הרופא בלבד לפי הצרכים הייחודיים לך.
מינון גבוה מדי עלול להשפיע על הכליות.
יש להמשיך לבדיקות דם ולבקב בבית החולים באופן קבוע, במיוחד לאחר השתלה.
הדבר יאפשר לך לדון עם הרופא על הטיפול ולציון מהן הבעיות שאתה חווה.

#### המינון ותדירות המתן

הרופא יתאים לך את המינון הנכון של סנדאיומן ניאורל, בהסתמך על משקל גופך והסיבה לנטילת התרופה.
הרופא גם יאמר לך באיזו תדירות ליטול את התרופה.
יש לעקוב בדיוק גם אח הוראות הרופא, ולעולם לא לשנות את המינון בעצמך, גם אם הינך מרגיש טוב.

**אם אקדם לכן נטלת צורת מינון שונה של ציקלוספורין במתן דרך הפה:**

הרופא ינטר את רמות הציקלוספורין בדמך בקפדנות יתרה למשך תקופה קצרה בעקבות המעבר מצורת מינון אחת במתן דרך הפה לצורת מינון אחרת.
כאשר הינך עובר מצורת מינון אחת של ציקלוספורין במתן דרך הפה לצורת מינון אחרת, אתה עשוי לחוות תופעות לוואי.
אם הדבר קורה, אנא אמור לרופא או לרוקח, שכן יתכן שיש צורך להתיאם את המינון שהינך נוטל.
**לעולם אל תשנה** את המינון בעצמך, אלא בהוראת הרופא.

#### אופן השימוש:

#### מתי לקחת סנדאיומן ניאורל

חשוב ליטול את התרופה באותו הזמן בכל יום, בעיקר אם עברת השתלה.

#### כיצד לקחת סנדאיומן ניאורל

המינון היומי צריך תמיד להינתן באותו מנות נפרדות.

ל**ב**, יתכן כי תיגרם לפיתוח של התיכיים שתפשט לעבר השיניים, אם לוקחים ניפדיפין במהלך הטיפול עם ציקלוספורין.


**סנדאיומן ניאורל תמיסה לשתייה:**

**שימוש התחלתי בסנדאיומן ניאורל תמיסה לשתייה:**


1. יש להרים את המכסה הנמצא במרכז טבעת הסרייה המתכנית.




2. יש להסיר לגמרי את טבעת הסרייה.




3. יש להוציא את הפקק האפור, ולהשליכו.



4. יש לדחוף את יחידת הצינור עם הפקק הלבן בחוזקה לתוך צוואר הבקבוק.



5. יש לבחור מזרק בהתאם לנפח שנרשם על-ידי הרופא.
לנפח הקטן נמל 1 מ"ל או השווה לו-1 מ"ל, יש להשתמש במזרק ה-1 מ"ל.
לנפחים הגדולים מ-1 מ"ל, יש להשתמש במזרק ה-4 מ"ל.
יש להכניס את קצה המזרק לתוך הפקק הלבן.



6. יש למשוך את הבוכנה עד לשאיבת נפח התמיסה שנרשם על-ידי הרופא (יש למקם את חלקה התחתון של הבוכנה מול הסימון המתאים לנפח שנרשם על-ידי הרופא).

7. יש להוציא בעזות גדולות על-ידי דחיפה ומשיכה של הבוכנה מספר פעמים, לפני הוצאת המזרק מהבקבוק, עם המינון הרשום.
הימצאות מעט בועות קטנות אינה בעלת חשיבות ולא משפיע על המינון בשום אופן.

יש לוודא שבהזרקת יש את הכמות הנכונה של התרופה, ואז יש להוציא את המזרק מהבקבוק.



8. יש לשפוך את התמיסה מהמזרק לתוך כוס קטנה המכילה מעט נוזל, כעדיפות למיץ תפוחים או למיץ תפוחים (אך לא למיץ אשכוליות).
יש להימנע מכל מגע בין המזרק והנוזל בתוך הכוס.
יש לערבב ולשנות את התערובות כולה מיד.



9. לאחר השימוש יש לנגב את חלקו החיצוני של המזרק עם מגבון יבש, ולהחזירו למקום.
הצינור והפקק הלבן צריכים להישאר בתוך הבקבוק.
יש לסגור את הבקבוק עם הפקק המצורף בנפרד.

### שימוש חוזר בתמיסה לשתייה:

יש להחליף מסעיף 5.

#### משך הטיפול

הרופא יאמר לך כמה זמן תצטרך לקחת סנדאיומן ניאורל.
זאת, בהסתמך על האם סיבת הטיפול היא לאחר השתלה או לטיפול במחלת עור חמורה,
דלקת מפרקים שגרונית, דלקת עיניים מסוג אובאיטיס או תסמונת נפרוטית.
טיפול בפריחה חמורה נמשך בדרך-כלל 8 שבועות.

יש להמשיך לקחת סנדאיומן ניאורל כל עוד הרופא אומר לך.
אם יש לך שאלות לגבי כמה זמן לקחת סנדאיומן ניאורל, פנה לרופא או לרוקח.

**אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר**
אם נטלת מנת יתר או אם ביטות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מינון של בית חולים והבא אריות התרופה אתך.
יתכן שצטטרך טיפול רפואי.

### אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הקצוב, יש ליטול מנה מיד שתזכרת.
אלא אם כן כמעט הגיע הזמן ללקיחת המנה הבאה.
המשך לקחת את התרופה כרגיל.
בשום אופן אין ליטול שתי מנות ביחד!

#### אם אתה מפסיק את נטילת התרופה

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.
אין להפסיק את הטיפול בסנדאיומן ניאורל ללא הוראת רופא.
המשך לקחת את הטיפול גם אם הינך מרגיש טוב.
הפסקת הטיפול בסדאיומן ניאורל עשויה להעלות את הסיכון לדחיית האיבר המושתל.

**אין ליטול תרופות בחושיך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.**

**אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.**

### 4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בסנדאיומן ניאורל עלול לגרו