

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת ללא מרשם רופא

למוסין לימון למוסין דובדבן

טבליות למציצה

החומרים הפעילים וכמותם:

כל טבליה למציצה מכילה:

tyrothricin	4 mg	טירותריצין
cetrimonium bromide	2 mg	צטרימוניום ברומיד
lidocaine	1 mg	לידוקאין

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 2 סעיף "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היוועץ ברוקח אם אתה זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא אם תסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 5-7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

למוסין היא טבליה למציצה להקלת כאב גרון חזק וכאב המלווה זיהומים בחלל הפה. התרופה מיועדת למבוגרים ולילדים מעל גיל 12 שנים.

קבוצה תרפויטית:

למוסין מכילה לידוקאין (מאלחש מקומי), טירותריצין (אנטיביוטי) וצטרימוניום ברומיד (אנטיספטי).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר אם:

אתה רגיש (אלרגי) לחומרים הפעילים (לידוקאין, טירותריצין וצטרימוניום ברומיד) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני השימוש בלמוסין ספר לרופא/רוקח אם:

- אתה סובל מזה מספר ימים מכאב גרון המלווה בחום,
- יש לך חתך או פצע ברירת הפה או הגרון,
- אין הטבה בתסמינים או שהם ממשיכים מעבר ל-5-7 ימים,
- יש לך כאב גרון המלווה בחום גבוה, סחרחורת, הקאה או אי-נוחות רבה בבליעה.

לפני השימוש בתרופה עדכן את הרופא/רוקח אם אתה סובל ממחלה כלשהי או אם היו לך בעבר תגובות אלרגיות.

אין לצחצח שיניים מייד לפני או אחרי נטילת התכשיר מאחר שמשחת שיניים תפחית את יעילות התכשיר.

ילדים ומתבגרים

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת גיל 12 שנים.

תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון

אין להשתמש בלמוסין מייד לפני או תוך כדי אכילה או שתייה שכן האלחוש המקומי של לידוקאין עלול לגרום לאלחוש זמני של הלשון והגרונ ולכן יכול לפגוע בבליעה. הימנע מאכילה כל עוד תחושת אלחוש זו קיימת.

היריון והנקה

אין להשתמש בתרופה במהלך ההיריון או תקופת ההנקה. אם את בהיריון, מניקה או מתכננת להיות בהיריון, יש להיוועץ ברופא לפני השימוש בתרופות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

למוסין לימון ולמוסין דובדבן מכילות כ-1 גרם סורביטול בטבליה. סורביטול הוא מקור לפרוקטוז. אם הרופא אמר לך שיש לך אי-סבילות לסוכרים מסוימים או אם אובחנת כבעל אי-סבילות תורשתית לפרוקטוז (הפרעה גנטית נדירה של חוסר יכולת לפרק פרוקטוז), התייעץ עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו.

סורביטול עלול לגרום לאי-נוחות במערכת העיכול ויש לו השפעה משלשלת קלה.

למוסין לימון ולמוסין דובדבן מכילות פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבליה, כך שלמעשה התרופה נחשבת 'נטולת נתרן'.

טבליות למוסין דובדבן מכילות חומר טעם המכיל סינמאלדהיד, ציטרל, אאוגנול וגרניול. חומרים אלו עלולים לגרום לתגובות אלרגיות.

טבליות למוסין לימון מכילות בוטילטד הידרוקסיאניזול (E 320) אשר עלול לגרום לתגובות עור מקומיות (למשל דלקת עור ממגע) או גירוי בעיניים ובריריות.

טבליות למוסין לימון מכילות חומר טעם המכיל ציטרל אשר עלול לגרום לתגובות אלרגיות.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן השימוש בתרופה.

המינון המקובל בדרך כלל הוא:

ילדים מעל גיל 12 ומבוגרים:

לכאבי גרון קלים – בינוניים: יש למצוץ טבליה אחת כל 2-3 שעות.

לכאבי גרון חזקים: ניתן למצוץ טבליה אחת כל 1-2 שעות.

אין לעבור מינון של 12 טבליות ב-24 שעות.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אופן השימוש:

בזמן מציצת למוסין דובדבן ו/או למוסין לימון טבליה להקלת כאב גרון, יש להניע את הטבליה לאט בתוך הפה.

אל תאפשר לה להתמוסס בתוך פנים הלחי!

בעת טיפול בשלפוחיות/אפטה, יש להניח לטבליה להתמוסס לאט ישירות על המקום הפגוע.

אין ללעוס/לשבור או לבלוע את הטבליה למציצה. יש למצוץ את הטבליה לאט ולחזור לפי הצורך.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

מינון יתר של צטרימוניום ברומיד עלול לגרום לבחילות והקאות.

מינון יתר של לידוקאין עלול לגרום להשפעות מזיקות על מערכת העצבים המרכזית ועל מערכת הלב וכלי

הדם.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מייד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את

אריזת התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדיקת התווית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.
אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בלמוסין עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש בתרופה ולפנות מייד לרופא אם אתה חש באחת מהתופעות הבאות:

- **תופעות אשר יכולות להעיד על תגובה אלרגית:**
 - קושי בנשימה או בבליעה,
 - נפיחות של הפנים, שפתיים, לשון או גרון,
 - גרד חמור בעור המלווה בפריחה אדומה או בליטות בעור.
- שלשול מתמשך או חמור, שלשול עם דם וריירית, כאבים בטבור או התכווצויות ו/או חום,
- כאשר מופיע זיהום חדש,
- אם התסמינים מחמירים.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 מתוך 10,000 משתמשים)
גירוי מקומי בפה או בגרון (אי נוחות בפה), בעיקר בשימוש בתדירות גבוהה לתקופה ממושכת.
שימוש בטירותריצין על פצעים טריים יכול להוביל לדימום.

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000)

- גרד, פריחה
- בחילות, במיוחד כאשר משתמשים במינונים גבוהים של התרופה או כאשר הטבליות נלקחות על בטן ריקה (מיוחס ללידוקאין שהטבליות מכילות).

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** יש לאחסן בטמפרטורה הנמוכה מ-25°C ולהגן מאור ולחות.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

למוסין טבליות למציצה בטעם לימון:

sorbitol, citric acid, talc, lemon flavour (containing butylated hydroxyanisole [E 320], citral, sorbitol [E 420]), guar galactomannan, magnesium stearate, colloidal anhydrous silica, saccharine sodium, quinoline yellow lake, peppermint flavour, spectracol green lake.

למוסין טבליות למציצה בטעם דובדבן:

sorbitol, guar galactomannan, citric acid, talc, povidone, saccharine sodium, magnesium stearate, cherry flavour (containing cinnamaldehyde, citral, eugenol, geraniol), iron oxide red.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

למוסין לימון הן טבליות למציצה מלבניות, מנוקדות, בעלות קצוות משופעים, בצבע צהוב כהה עד צהוב לימוני. כל אריזה מכילה 24 או 50 טבליות למציצה. ייתכן שלא כל גודלי האריזות משווקים.

למוסין דובדבן הן טבליות למציצה מלבניות, מנוקדות, בעלות קצוות משופעים, בצבע ורוד-אדום. כל אריזה מכילה 24 טבליות למציצה.

בעל הרישום וכתובתו:

דיפריס ושות' בע"מ, רחוב הברזל 32, תל-אביב.

שם היצרן וכתובתו:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad-Vilbel, Germany.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

למוסין לימון: 117-80-29908

למוסין דובדבן: 117-79-29907

עודכן בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.