

עלון לצרכן לפי תקנות הרווחחים (תקנירם) התשמ"ז - 1986
התרופה משוקקת על פי מרשם רפואי בלבד

דימתיל פומרט טבע 240 מ"ג
כמוסות קשות עמידות לפרק בקיבה

כל כמוסה מכילה:
Dimethyl fumarate 240 mg דימתיל פומרט 240 מ"ג

דימתיל פומרט טבע 120 מ"ג
כמוסות קשות עמידות לפרק בקיבה

כל כמוסה מכילה:
Dimethyl fumarate 120 mg דימתיל פומרט 120 מ"ג

למידע על מרכיבים בלתי פעילים - ראה סעיף 6 "מידע נוסף".
קראו בעיון את העلون עד סוףו לפני שימוש תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספת, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלות. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה אינה מיועדת לילדים מתחת לגיל 18. לא קיים מידע לגבי הבטיחות והיעילות של דימתיל פומרט טבע בקבוצת גיל זו.

1. למה מיועדת התרופה?

דימתיל פומרט טבע מיועדת לטיפול בטרשת נפוצה התקפית הפוגתית בחולמים מבוגרים.

קבוצה רפואיית: תרופה המשפיעה על מערכת העצבים.

טרשת נפוצה הינה מחלת כרונית המשפיעה על מערכת העצבים המרכזית, לרבות המוח וחוט השדרה. טרשת נפוצה התקפית מאופיינת בהתקפים חזריים (נסנים) של תסמיין מערכת העצבים. התסמינים משתנים ממחלה לחולה, אבל בדרך כלל כוללים קשיים בהילכה, תחושה של חוסר שווי משקל וקשיים בראייה (לדוגמא ראייה מוטושתת או ראייה כפולה). תסמינים אלה עשויים להיעלם לחלוון כאשר ההתקף חולף, אבל חלק מהבעיות עלולות להישאר.

איך דימתיל פומרט טבע פועלת

נראה כי דימתיל פומרט טבע מונעת מערכת החיסון מלפגוע במוח ובחות השדרה. זה עשוי גם למנוע התדרדרות עתידית של מחלתך.

2. לפני השימוש בתרופה

אין לשימוש בתרופה זו אם:

- אתה רגיש (אלרג) לחומר הפעיל או לכל אחד מהרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה. לרשימה המרכיבים הבלתי פעילים, ראה סעיף 6, "מידע נוסף".
- ישנו חסד או שנבדק ונמצא שאתה סובל מזמן מוח נדיר הנקריא לויואנצפלופתיה רב-מוקדית מתקדמת (PML).

ازהירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

הרופא המתפל יפנה אותך לבדיקת דם לצורך ספירת תא הדם הלבנים שלך, וכן יבדוק כי הכליות והכבד פעילים richtig. הרופא המתפל יבצע בדיקות אלו מעת לעת במהלך הטיפול. אם מספר תא הדם הלבנים שלך ירד במהלך הטיפול, יתכן והרופא ישකול לבצע בדיקות נוספות או להפסיק את הטיפול.

לפני הטיפול בדימתיל פומרט ידע את הרופא אם:

- הנר סובל ממחלה כלות חמורה
- הנר סובל ממחלה כבד חמורה
- הנר סובל ממחלה במערכת העיכול
- הנר סובל מזיהום חמור (כגון דלקת ריאות)

שלבket חוגרת עלולה להתרכש במהלך הטיפול בדימתייל פומרט טבע. במקרים מסוימים, התרכשו סיבוכים רציניים. עליך להודיע לרופא באופן מיידי אם אתה חושד בסימפטומים של שלבket חוגרת.

אם אתה סבור שמחלה הטרשת הנפוצה שלר מחמירה (למשל חולשה או שינויים בראשית) או אם אתה מבחין בתסמינים חדשים, שוחח עם הרופא מיד כי אלה עשויים להיות תסמינים של זיהום מוח נדרי הנקרה ליקואנטופתיה וב-מקדיות מתקדמת (PML). PML הוא מצב חמור שלא יכול להוביל לנכות קשה או מוות.

ילדים ומתבגרים:

אין לשימוש בדימתייל פומרט טבע ילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 שנים. עליות ובתיות התרופה בקבוצת גיל זו אינה ידועה.

תגובהות בין-תרופתיות

- אם אתה לוקח, או אם לוקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. במיוחד יש ליתדעת את הרופא או הרוקח אם אתה לוקח:
 - תרופות המכילות פומרטים (נגזרות של חומצה פומרית) לטיפול בפסורי-אדים.
 - תרופות המשפיעות על מערכת החיסון של הגוף, כולל תרופות נסוכות לטיפול בטרשת נפוצה כגון (rituximab or mitoxantrone)
 - חיסונים - לקיחת דימתייל פומרט טבע ביחד עם חיסונים מסוימים ספציפיים (חיסונים המורכבים מגנייפים חיצים) עלולה לגרום לזיהום ולכן צריך להימנע מלקיים. הרופא שלך ייעץ אולי סוגים אחרים של חיסון (חיסונים המורכבים מגנייפים מומתמים) ינתנו.
 - תרופות המשפיעות על הכליות כגון סוגים מסוימים של אנטיבוטיקה (טיפול בziehomin), משתנים, סוגים מסוימים של משככי כאבים (כגון איבופרופן ותרופות דומות לטיפול בדלקת ותרופות ללא מרשם) ותרופות המכילות ליתיום.

שימוש בתרופה ומהזן

יש ליטול את התרופה עם מזון. הדבר עשוי לסייע במצטט חלק מתופעות הלוואי השכיחות מאוד (ראה סעיף 4 "תופעות לוואי").

שימוש בתרופה וצריכת אלכוהול

יש להימנע משתיית משקה אלכוהולי מרוכז (מעל ל- 30% כהה בנפח) בכמות גדולה (יותר מכך) בסמוך לנטיילת דימתייל פומרט טבע. יש להמתין שעה בין התרופה למשקה כדי שסתמיותם ביניהם עלולה להגברת תופעות לוואי בקיבה כגון דלקת הקיבה, במיוחד באנשים המודעים לכך.

הרין, הנקה ופוריות

אם הינך בהריון, חשוב שתאת בהריון או מתכונת להיכנס להריון דווחי זאת לרופא בהקדם האפשרי. את רופאך תדונו יחד האם עלייך להמשיך טיפול זה.

הרין

אין ליטול טקפיידרה אם את בהריון אלא אם שוחחת על כך עם הרופא.

הנקה

לא ידוע האם החומר הפעיל (דימתייל פומרט) עבר לתוך הלב אם. אין לשימוש בתרופה בזמן הנקה. הרופא שלך ייעזור לך להחליט האם להפסיק להנקה או להפסיק ליטול דימתייל פומרט טבע אחרי שישקול את התועלת האפשרית של ההנקה לתינוקר מול התועלת האפשרית של הטיפול עבורך.

נהיגה ושימוש במכונות

השפעת דימתייל פומרט טבע על נהיגה ושימוש במכונות לא ידועה. השימוש בדיםתייל פומרט טבע לא צפוי להשפעה על יכולת הנהיגה שלך והשימוש במכונות. יש להיוועץ ברופא אם מחלתו מאפשרת לך לבצע את הפעולות הללו.

מיעוט חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ 23 מ"ג נתרן בכמותה, כלומר היא למשה נחשבת ל"נטולת נתרן".

3. כיצד השתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד לפני הוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

- המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

• המינון המקובל בדרך כלל הוא:

המינון ההתחלתי הינו- 120 מ"ג פעמיים ביום במשך 7 ימים

ולאחר מכן המינון הרגיל הינו- 240 מ"ג פעמיים ביום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

- יש לבלווע את התרופה עם מים ועם האוכל

במידת הצורך, בכדי להקל על הבליעה, ניתן לפתח את הקמוסה ולבלווע את כל הטבליות המוכלות בה בזה אחר זו מיד לאחר הפתיחה.

• אין לחצוץ, לכתחזק, להמיס, למצוץ או ללווע את הקמוסה או את הטבליות המוכלות בה כיוון שהטבליות מצופות ביציפי אנטרי (ציפוי עמיד לפירוק בקיבלה) המועד להגנה על הקיבה.

- נטילת דימתייל פומרט טبع עם אוכל יכולת לעוזר בהחפתת חלק מתופעות הלואאי השכיחות מאוד (ראה סעיף 4).

בדיקות ומעקב

לפני תחילת השימוש ובמהלך השימוש בתרופה הרופא יפנה אותך לבדיקת דם, תפוקדי כליה וכבד.

אם נטלה בטיעות מינון גבוהה יותר, עליך לפנות לרופא.

אם נטלה מנת יתר או אם בטיעות בלבד לצדמן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה שניתר.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרושים, ונשארו לפחות עד 4 שעות עד הזמן הבאה, ניתן לקחת את המנה שהחמצצת; אחרת רק את המנה הבאה בזמן הרגיל, אין ליטול מנה כפולה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה בכל פעם שהן נטלו תרופה. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בדיםתייל פומרט טبع עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואאי. יתכן ולא תסבול מכך אחת מהם.

תופעות לוואי חמורות:

- דימתייל פומרט טבע עלולה לגרום לספירת למפוציטים נמוכה (סוג של תא דם לבנים). ספירה נמוכה של תא דם לבנים עלולה להגביר את הסיכון לדיות, כולל סיכון לזיוהם מוח נדר בשם progressive multifocal leukoencephalopathy (PML).
 - **ליוקאנצפלופתיה רב-מוקדית מתקדמת PML** - עלולה להוביל לנכות חמורה או מוות. נמצא כי PML התרחשה לאחר שנה עד 5 שנים של הטיפול, וכך הרופא צריך להמשיך לנטר את ספירת תא הדם הלבנים שלך במהלך הטיפול, עליך להמשיך לעקב אחר כל סימפטום פוטנציאלי של PML כפי שמוסברמטה. הסיכון ל- PML עשוי להיות גבוה יותר אם נטלה בעבר תרופה המחייבת את המערכת החיסונית.
 - התסמינים של PML עשויים להיות דומים להתקף של טרשת נפוצה. התסמינים יכולים לכלול חולשה חדשה או החמרה באחד של הגוף; סרבול, שינוים בראיה, בחשיבה, או בזיכרון; או בלבול או שינויים באישיות, קשיים בדיבור ובקשות הנמשכים יותר מכמה ימים.
 - אם אתה סבור שהתרשת הנפוצה שלך מחמירה או אם אתה מבחין בתסמינים חדשים בזמן שאתה מטופל בדימתייל פומרט טבע, חשוב מאד שתדבר עם הרופא שלך על הקדם האפשרי. בנוסך שוחח גם עם בן/בת הזוג שלך או הוצאות הרופאי וידע אותך בטיפול שלך. תסמינים עולמים להופיע מבלוי שתהיה מודע להם בעצמך.
 - יש לפנות מיד לרופא אם אתה סובל מחד או יותר מתרומות אלו.
 - תגבות אלרגיות חמורות - השכיחות של תגבות אלרגיות חמורות לא ניתן להערכת מהמידע הקיים (לא ידוע).
 - הסמקה של הפנים או הגוף היא תופעת לוואי שכיחה מאוד, אולם אם אתה סובל מהסמקה המלאה בפריחה אדומה או חרפת ובאחד מהתסמינים הבאים:
 - התנפחות הפנים, השפתיים, הפה והלשן (*angioedema*)
 - צפצופים, קשי נשימה וקוצר נשימה (*dyspnoea, hypoxia*)
 - סחרחות, איבוד הכרה (*hypotension, anaphylaxis*)
 אלו יכולים לבטא תגובה אלרגית חמורה.
- יש להפסיק את השימוש ויש לפנות מיד לרופא.**

תופעות לוואי נוספת:

תופעות לוואי שכיחות מאוד - **תופעות שמופיעות ביוטר משמש אחד מעשרה** הסמקה של הפנים או הריגשת חום, צריבה או גירוד בגוף, שלשול, בחילה, כאבי בטן או התכווצויות בבטן. נטילת דימתייל פומרט טבע עם אוכל יכולה לשיער להפחית תופעות לוואי אלה.

בבדיקה שני עלולים להופיע קטונים. היועץ ברופא בוגר לאופן הטיפול בתופעות לוואי אלו. יתכן והרופא יפחית את המינון לא הוראה מפורשת מהרופא.

תופעות לוואי שכיחות - תופעות שמופיעות ב-10-1 מעתמדים מתוך 100

דלקת של דופן המעי (גסטרואנטרייטיס), תחולשת שריפה, גלי חום, הקאות, קשיי עיכול (דיספסיה), דלקת של דופן הקיבה (גסטרייטיס), הפרעות במערכת העיכול, פריחה, אדמומיות בעור (כתמים ורודים או אדומים-אריתמה), גרד בעור, תחולשת חום.

תופעות לוואי המופיעות בבדיקות דם או שתן

ירידה בספירת תא הדם הלבנים (ליוקופניה, לימפופניה) בדם. ירידה בכמות תא הדם הלבנים עלולה להצביע על כך שכולתו של הגוף להיאבק בзиוהומים פחותה. אם הנך סובל מזיוהום רציני (כגון דלקת ריאות) יש לפנות מיד לרופא. חלבון (אלבומין) בשתן.

עליה בرمות אנזימי הכבד (AST, ALT) בדם.

תופעות לוואי שאין שכיחות - תופעות שמופיעות ב 10-1 מעתמשים מתוך 1,000
תגובה אלרגית (رجישות יתר)

ירידה ברמת הטסיות בدم.

תופעות לוואי שכיחות אינה ידועה (תופעות שכיחות טרם נקבעה)
דלקת בכבד ועליה ברמות אנדמיי הכבד בدم (ALT או AST בלבד עם ביילרוביון).

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה
עלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי
ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות קישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי".
שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-
ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוח ראייתם של ילדים /או תינוקות
ועל ידי קר תמנע הרעלת. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון
של אותו חודש.

תנאי אחסון

יש לאחסן את התרופה מתחת ל- °C 25
ניתן להשתמש בתרופה עד 90 ימים לאחר פתיחת הבקבוק לראשונה אך לא יותר מאשר התפוגה המופיע על גבי
האריזה.

6. מידע נוסף

נוסך על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Silicified microcrystalline cellulose, Methacrylic acid and ethyl acrylate copolymer dispersion
Croscarmellose sodium, Methacrylic acid copolymer (Type A), Talc, Triethyl citrate, Colloidal silicon
dioxide, Magnesium stearate, Gelatin, Titanium dioxide, FD&C Blue #1, FD&C Red #3, FD&C Red #40
.and Black printing ink

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

דימתיל פומרט טב 240 מ"ג - כמוסת ג'לטין קשה, בצבע תכלת אטום. הן על מכוסה הכמהה והן על גופ הכמהה מודפס
הכתובת A240.
דימתיל פומרט טב 120 מ"ג - כמוסת ג'לטין קשה, גופ בצבע לבן אטום ומכסה בצבע תכלת אטום. הן על מכוסה הכמהה
והן על גופ הכמהה מודפס הכתובת A188 .

הכמהה ארוזות בבקבוק פלסטיק עם פקק קשה פתיחה לילדים.

בכל אריזה של דימטיל פומרט טبع 240 מ"ג - 60 כמוסות .

בכל אריזה של דימטיל פומרט טבע 120 מ"ג - 14 כמוסות.

שם הייצור ובעל הרישום וכתובתו: טבע ישראל בע"מ, דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

העלון נערך ביוני 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

240 מ"ג- 164-31-35914

120 מ"ג- 165.74.36525

לשם הפשטות והקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר, אך התרופה מיועדת לבני שני המינים.