

تيمودال

5 ملغ، 20 ملغ، 100 ملغ، 250 ملغ
كبسولات

كل كبسولة تحتوي:

Temozolomide 5 mg, 20 mg, 100 mg, 250 mg
تيموزولوميد 5 ملغ، 20 ملغ، 100 ملغ، 250 ملغ

لقائمة المواد الغير فعّالة، أنظر بند 6 "معلومات إضافية". أنظر أيضاً بند 2.7 "معلومات هامة بخصوص جزء من مركبات تيمودال".

اقرأ النشرة بتمعن قبل أن تستعمل الدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات ملخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي.
- هذا الدواء وُصف لعلاجك. لا تعطه للآخرين. قد يسبب لهم الضرر، حتى لو بدا أن وضعهم الطبي مشابه لوضعك.
- هذا الدواء غير مخصص للأطفال تحت جيل 3 سنوات، لأنه لا توجد معلومات بخصوص الاستعمال بمعالجين تحت جيل 3 سنوات. المعلومات بخصوص الأطفال فوق جيل 3 سنوات محدودة.

1. لأي غرض مخصص تيمودال؟

1.1 ما هو تيمودال؟

تيمودال يحتوي على دواء يُدعى تيموزولوميد. هذا الدواء مُخصص ضد أورام سرطانية، لعلاج أنواع مختلفة من أورام في المخ. تيمودال ينتمي لمجموعة الأدوية التي تدعى الأدوية السامة للخلايا أو لأدوية العلاج الكيميائي. المجموعة العلاجية: مستحضر مضاد للورم.

1.2 لأي غرض يستعمل تيمودال؟

كبسولات تيمودال مخصصة للعلاج:

- في المرضى البالغين الذين يعانون من ورم أرومي دقيقي متعدد الأشكال الذي شُخص لأول مرة (شكل خاص من ورم في المخ) بالدمج مع علاج بالإشعاعات وبعد ذلك كعلاج وحيد؛
- في الأطفال فوق جيل 3 سنوات، المراهقين والبالغين الذين يعانون من ورم دقيقي خبيث مثل ورم أرومي دقيقي متعدد الأشكال أو ورم نجمي كشمي (أشكال خاصة من أورام في المخ)، التي تعود للظهور أو تستمر في التطور بعد علاج عادي؛
- كبسولات تيمودال مخصصة أيضاً كعلاج خط أول للمرضى البالغين الذين يعانون من ورم ميلاني خبيث نقيلي متقدم.

2. قبل استعمال تيمودال

2.1 لا يجوز استعمال تيمودال إذا:

- كنت أرجياً (لديك حساسية) لتيموزولوميد أو لأي واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها هذا الدواء (المُفصّلة في بند 6).
- كان لديك في الماضي رد فعل أرجي لداكاربازين (دواء مضاد للسرطان الذي يُسمى أحياناً DTIC). علامات رد فعل أرجي تشمل شعور بحكة، ضيق نفس أو صغير، انتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو الحلق.
- كان هناك هبوط وخيم بكريات دم معينة (كبت للنخاع العظمي)، مثل تعداد كريات الدم البيضاء لديك وتعداد صفائح الدم لديك. خلايا الدم هذه مهمة من أجل محاربة التلوثات أو من أجل تجلط دم سليم. سيقوم الطبيب بفحوصات دم من أجل التأكد أن لديك ما يكفي من خلايا الدم هذه قبل بدء العلاج.
- كنت حاملاً أو مرضعة.

2.2 تحذيرات خاصة بخصوص استعمال تيمودال

قبل العلاج بتيمودال، تحدث مع طبيبك، الصيدلي أو الممرضة،

- لأنه يتوجب عليك أن تكون تحت متابعة منتظمة لتطور وضع وخيم من تلوث في الصدر الذي يُدعى الالتهاب الرئوي بالمتكيسة الجوزية (PCP). إذا كنت معالماً تم تشخيصه لأول مرة (ورم دقيقي متعدد الأشكال) قد تأخذ

تيمودال لمدة 42 يومًا بالدمج مع اشعاعات. في هذه الحالة، سيصف الطبيب لك أيضًا دواءً الذي سيساعدك في منع هذا النوع من التهاب الرنتين (PCP).

- إذا عانيت في الماضي أو من الممكن أنك تعاني من التهاب كبد من نوع B، ذلك لأن **تيمودال** قد يُسبب نشاطًا متجددًا للفيروس الذي يُسبب التهاب الكبد من نوع B وقد يسبب خطرًا على الحياة في حالات معينة. سيتم فحص المعالجين بشكل دقيق من قبل الطبيب الخاص بهم للكشف عن أعراض للتلوث قبل بدء العلاج.
- إذا كان لديك تعداد منخفض لخلايا الدم الحمراء (فقر دم)، خلايا دم بيضاء أو صفائح، أو مشاكل في تجلط الدم قبل بدء العلاج، أو تطورت أثناء العلاج. قد يقرر طبيبك تقليل الجرعة، التدخل، وقف أو تغيير علاجك. قد تحتاج أيضًا علاجات أخرى. في حالات معينة، من الممكن أن تكون هناك حاجة لوقف العلاج **بتيمودال**. سيتم إجراء فحوصات دم لك بفترات متقاربة أثناء العلاج من أجل رصد الأعراض الجانبية ل**تيمودال** على خلايا الدم لديك.
- لأنه من الممكن أن يكون لديك اختطار (احتمال الخطر) ضئيل لتغيرات أخرى في خلايا الدم لديك، يشمل سرطان الدم.
- إذا كان لديك غثيان و/أو تقيؤ، وهي أعراض جانبية شائعة جدًا ل**تيمودال** (انظر بند 4)، قد يصف لك الطبيب دواءً (مضاد للتقيؤ) من أجل المساعدة بمنع التقيؤ.
- إذا كنت تتقيأ بفترات متقاربة قبل أو أثناء العلاج، اسأل طبيبك بخصوص الزمن الأمثل لتناول **تيمودال** حتى يكون التقيؤ تحت السيطرة. إذا كنت تتقيأ بعد تناول الجرعة، لا يجوز تناول جرعة ثانية في نفس اليوم.
- إذا كنت تُطور حمى أو أعراض تلوث، توجه لطبيبك فورًا.
- إذا كنت مُسنًا فوق جيل 70 سنة، قد تكون أكثر عرضة للتلوثات، كدمات أو نزيف.
- إذا كانت لديك مشاكل في الكبد أو الكلى، قد تكون هناك حاجة لملاءمة جرعة **تيمودال**.
- باستخدام الدواء هناك اختطار للتسبب باعتلال في الكبد، يشمل فشل كبد الذي قد يشكل خطرًا على الحياة. لذلك، هناك حاجة للقيام بفحوصات وظائف الكبد قبل وأثناء العلاج **بتيمودال**.

2.3 التفاعلات/ردود الفعل بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أدوية أخرى، بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية أو إضافات تغذية، أخبر الطبيب المعالج أو الصيدلي عن ذلك. يجب اعلام الطبيب أو الصيدلي خصوصًا إذا كنت تتناول: أدوية أخرى المستعملة بعلاج السرطان، أدوية أخرى التي تكبت النخاع العظمي، أو حمض الفالبوريك.

2.4 تناول تيمودال مع الطعام والشراب

يجب تناول الكبسولات على معدة فارغة؛ مثلًا، على الأقل ساعة واحدة قبل تناولك وجبة الفطور. يجب بلع الكبسولات كاملة مع كأس ماء.

2.5 الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حاملاً، تظنين أنك حامل أو تخططين للحمل، إستشيري طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. ذلك لأنه ممنوع استعمال **تيمودال** أثناء الحمل إلا إذا أمرك الطبيب بشكل صريح بالقيام بذلك. على منالقيات العلاج القادرات على الحمل خلال فترة العلاج **بتيمودال** استخدام وسائل منع حمل فعالة خلال العلاج ولمدة 6 أشهر على الأقل بعد نهاية العلاج.

عليك التوقف عن الإرضاع خلال العلاج **بتيمودال**.

الخصوبة بالرجال

تيمودال قد يسبب عقم دائم. على المتعالجين الرجال استعمال وسائل منع فعالة وأن لا يتسببوا بحمل زوجاتهم لمدة 3 أشهر على الأقل من وقف العلاج. يُوصى بتلقي استشارة بخصوص حفظ خلايا منوية قبل البدء بالعلاج.

2.6 السياقة واستعمال الماكينات

تيمودال قد يسبب لك الشعور بالتعب والنعاس. في هذه الحالة، لا يجوز السياقة أو تشغيل معدات أيًا كانت أو ماكينات أيًا كانت أو الركوب على الدراجة الهوائية حتى ترى كيف يؤثر هذا الدواء عليك (انظر بند 4).

2.7 معلومات هامة بخصوص جزء من مركبات تيمودال

يحتوي **تيمودال** على لاكتوز (نوع سكر). إذا قيل لك من قبل طبيبك أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، توجه لطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

يحتوي تيمودال على الصوديوم
يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 مليمول صوديوم (23 ملغ) في كل كبسولة، أي إنه يعتبر في الواقع "خاليا من الصوديوم".

2.8 الأطفال والمراهقين

لا يجوز إعطاء هذا الدواء لأطفال تحت جيل 3 سنوات وذلك لأنه لم يتم فحصه. تيمودال مخصص للعلاج بأطفال من جيل 3 سنوات لأنواع مختلفة من أورام المخ (مثل ورم ارومي دبقي متعدد الأشكال أو ورم نجمي كشمي)، التي تعود للظهور أو تستمر بالتطور بعد علاج عادي. بالرغم من ذلك، المعلومات بخصوص أطفال فوق جيل 3 سنوات محدودة.

3. كيفية استعمال تيمودال؟

يجب تناول تيمودال دائماً بالضبط حسب تعليمات الطبيب. من المهم جداً التحقق مع طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا. للأخطاء بطريقة تناول الدواء من قبلك قد تكون تأثيرات صحية وخيمة. لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

هذا الدواء غير مخصص للإعطاء للرضع والأطفال تحت جيل 3 سنوات.

سيقرر طبيبك بخصوص الجرعة الدقيقة من تيمودال التي عليك تناولها، التي تعتمد على حجم الجسم (طول، وزن)، وإذا عولجت بالسابق بعلاج كيميائي أم لا. من الممكن أن يُطلب منك تناول أدوية إضافية قبل أو بعد تناول تيمودال، من أجل منع أو لأجل السيطرة على الغثيان والتقيؤ.

كيفية تناول الدواء (لكل المرضى):

يجب تناول الجرعة التي وُصفت لك من تيمودال مرة في اليوم على معدة فارغة، مثلاً على الأقل ساعة واحدة قبل وجبة الفطور. من المحبذ تناول الجرعة في نفس الساعة كل يوم. يجب بلع الكبسولة بكاملها مع كأس من الماء. لا يجوز فتح، سحق أو مضغ الكبسولة. ينتمي تيمودال إلى مجموعة أدوية تدعى الأدوية السامة للخلايا أو أدوية للعلاج الكيميائي. يشكل فتح الكبسولات خطر التعرض غير المعتمد للدواء عبر استنشاقه أو ملامسته للجلد أو للأنسجة المخاطية. لتقليل خطر التعرض غير المعتمد لتيمودال، لا يجوز فتح الكبسولات. في حالة تضرر الكبسولة، امتنع عن لمس مسحوق الكبسولة للجلد والأنسجة المخاطية (عينين، أنف) (انظر بند 2). في حال ملامسة المسحوق، يجب شطف اليدين.

حسب الجرعة التي حُددت لك، قد يُطلب منك بلع أكثر من كبسولة واحدة في نفس الوقت، ومن الممكن أن يُطلب منك بلع كبسولات بمقادير مختلفة في نفس الوقت (مقادير – كمية المادة الفعالة في الكبسولة، بالملغرامات). لون غلاف الكبسولة والكتابة على الكبسولات المختلفة مختلف بالنسبة للمقادير المختلفة (انظر الشرح في الجدول أدناه).

مقدار	لون غلاف الكبسولة
تيمودال 5 ملغ كبسولات	أخضر
تيمودال 20 ملغ كبسولات	أصفر
تيمودال 100 ملغ كبسولات	زهري
تيمودال 250 ملغ كبسولات	أبيض

عليك التأكد بأنك تفهم بشكل كامل وتذكر النقاط التالية:

- كم كبسولة عليك أن تأخذ في كل "يوم جرعة". أطلب من طبيبك أو الصيدلي كتابة ذلك (يشمل اللون).
 - ما هي أيام الجرعة لديك – أيام تناول الدواء.
- افحص الجرعة مع طبيبك في كل مرة تبدأ فيها دورة جديدة من العلاج، وذلك لأنه قد تكون مختلفة عن دورة العلاج السابقة.

فحوصات ومتابعة

أثناء العلاج عليك إجراء فحوصات دم بفترات متقاربة من أجل تتبع وضع خلايا الدم لديك. كذلك، سيتم إجراء فحص لوظائف الكبد لديك قبل وأثناء العلاج، لأن هناك اختطار لاعتلال الكبد الذي قد يُشكل خطرًا على الحياة (انظر أيضًا بند 2).

في حالة التقيؤ بعد تناول الدواء، لا يجوز تناول جرعة إضافية في نفس اليوم.

إذا تناولت جرعة أعلى عن طريق الخطأ

إذا تناولت عن طريق الخطأ كبسولات تيمودال أكثر مما قيل لك، توجه فورًا للطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

إذا نسيت تناول تيمودال

يجب تناول الجرعة المنسية في أقرب وقت ممكن خلال نفس اليوم. إذا مر يوم علاج كامل، افحص مع طبيبك. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة من أجل التعويض عن الجرعة المنسية، إلا إذا امرك الطبيب بذلك.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من المصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا كانت لديك أسئلة إضافية أيًا كانت بخصوص استعمال الدواء، اسأل طبيبك، الصيدلي أو الممرضة.

4. أعراض جانبية

كما بكل دواء، استعمال تيمودال قد يتسبب بأعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرع عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية، فقد لا تعاني من أي منها.

يجب التوجه للطبيب على الفور إذا كان لديك أحد ما يلي:

- رد فعل أرجي (حساسية مفرطة) وخيم (شرى، صفير أو صعوبات تنفس أخرى)،
- نزيف غير مسيطر عليه،
- نوبات (اختلاجات)،
- حمى،
- قشعريرة،
- ألم رأس وخيم غير عابر.

العلاج بتيمودال قد يسبب هبوطاً بأنواع معينة من خلايا الدم. الأمر قد يسبب لك ارتفاع بالكدمات أو النزيف، فقر دم (نقص بخلايا الدم الحمراء)، حمى، وهبوط بالمقاومة للتلوثات. الهبوط بعد خلايا الدم يدوم عادةً لفترة قصيرة. في حالات معينة، قد يكون متواصل وقد يؤدي لصورة وخيمة من فقر الدم (فقر الدم اللاتسجي). سيفحص طبيبك دمك بشكل ثابت من أجل الكشف عن تغييرات، ويقرر إذا كانت هناك حاجة لعلاج ما. في حالات معينة، سيتم تقليل جرعتك من تيمودال أو سيتم وقف العلاج.

أعراض جانبية إضافية تم الإبلاغ عنها مفصلة أدناه:

الأعراض الجانبية الشائعة جدا (أعراض قد تؤثر في أكثر من مستعمل واحد من بين عشرة) هي:

- فقدان الشهية، صعوبات في الكلام، صداع
- تقيؤات، غثيان، إسهال، إمساك
- طفح، تساقط الشعر
- تعب

الأعراض الجانبية الشائعة: (قد تؤثر في حتى 1 من بين 10 مستعملين) هي:

- تلوّثات، تلوّثات في الفم
- انخفاض عدد خلايا الدم (قلة العدلات، قلة اللمفاويات، نقص الصفائح الدموية)
- رد فعل تحسسي
- ارتفاع مستوى السكر في الدم
- تضرّر الذاكرة، اكتئاب، قلق، ارتباك، نقص القدرة على النوم أو النوم المتواصل
- تضرر التناسق وتوازن الجسم
- صعوبة في التركيز، تغيير في الحالة الذهنية أو اليقظة، نسيان
- دوخة، اضطراب في الإحساس، شعور بالوخز، رجفة، طعم شاذ
- فقدان النظر الجزئي، رؤية غير سليمة، رؤية مزدوجة، ألم في العينين
- صمم، طنين في الأذنين، ألم في الأذنين
- تخثر دموي في الرئتين، أو الساقين، ضغط دم مرتفع
- التهاب الرئتين، ضيق في التنفس، التهاب القصبات الهوائية (bronchitis)، سعال، التهاب الجيوب الأنفية
- ألم في المعدة أو البطن، صعوبات في الهضم/حرقة، صعوبة في الابتلاع
- جلد جاف، حكة
- ضرر في العضلات، ضعف العضلات، آلام في العضلات

- ألم في المفاصل، ألم في الظهر
- التبول في أحيان قريبة، صعوبة في السيطرة على التبول
- حمى، أعراض شبيهة بالزكام، ألم، شعور عام سيئ، نزلة أو زكام
- احتباس السوائل، تورم الساقين
- ارتفاع إنزيمات الكبد
- انخفاض الوزن، ارتفاع الوزن
- ضرر بسبب الأشعة

الأعراض الجانبية غير الشائعة (قد تؤثر في 1 من أصل 100 مستخدم) هي:

- تلوّثات في الدماغ (meningoencephalitis herpetic، تلوّثات في الدماغ تحدث بسبب فيروس الهربس)، بما في ذلك حالات التي انتهت بالوفاة
- تلوّث الجروح
- تلوّثات جديدة أو تلوّثات يتم تفعيلها (متكررة) تحدث بسبب الفيروس المضخم للخلايا (Cytomegalovirus)
- تلوّثات يتم تفعيلها (متكررة) عبر فيروس يُسبب التهاب الكبد من النوع B
- سرطان ثانوي يشتمل على اللوكيميا
- انخفاض تعداد خلايا الدم (نقص الصفيحات، فقر الدم، قلة الكريات البيض)
- نقاط حمراء تحت الجلد
- مرض السكري الكاذب (diabetes insipidus، تشتمل الأعراض على إنتاج كميات كبيرة من البول وشعور بالعطش)، مستوى منخفض من البوتاسيوم في الدم
- تقلبات في المزاج، هلوسة
- شلل جزئي، تغييرات في حاسة الشم
- ضرر في السمع، تلوّث في الأذن الوسطى
- ضربات قلب (خفقان، عندما تشعر بضربات قلبك)، موجات حرارة
- تورم البطن، صعوبات في السيطرة على حركة الأمعاء، بواسير، جفاف الفم
- التهاب الكبد، وضرر في الكبد (بما في ذلك قصور عمل الكبد الذي أدى إلى الوفاة)، اضطراب في تدفق المرارة (رُكود صفراوي)، ارتفاع البيليروبين
- حويصلات على الجسم أو الفم، تقشّر الجلد، تهيج الطفح، احمرار الجلد المصحوب بألم، طفح حاد مصحوب بتورم الجلد (بما في ذلك راحتي اليدين، والقدمين)
- حساسية جلدية مفرطة لضوء الشمس، طفح (شرى)، تعرق مفرط، تغيير لون الجلد
- صعوبة في التبول
- نزيف مهلي، تهيج المهبل، نقص الدورة الشهرية أو نزيف شديد أثناء الدورة الشهرية، ألم في الثديين، عجز جنسي
- رجفة، تورم الوجه، تغيير لون اللسان، عطش، مشاكل في الأسنان
- جفاف العينين

إذا ظهر أحد الأعراض الجانبية، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة البيت بموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يُوجه للاستشارة الإلكترونية للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق الدخول للرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف تخزن تيمودال؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأولاد و/أو الأطفال، يستحسن الاحتفاظ به في خزانة مغلقة، وهكذا تمنع التسمم. البلع عن طريق الخطأ قد يكون قاتلاً بالنسبة للأطفال. لا تسبب التقيؤ دون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على اللاصقة وعبوة الكرتون. تاريخ انتهاء الصلاحية يعود لليوم الأخير من الشهر المذكور.
- شروط التخزين: لا يجوز التخزين فوق 25 درجة مئوية.

توجه للصيدلي إذا لاحظت تغيير أيًا كان بمظهر الكبسولات.

- لا يجوز رمي أدوية للمجاري أو سلة المهملات البيئية. إسأل الصيدلي عن كيفية رمي أدوية لم تعد بالاستعمال. هذه الطرق تساعد في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي تيمودال أيضا على:
محتوى الكبسولة:

Anhydrous lactose, sodium starch glycolate, stearic acid, tartaric acid, colloidal anhydrous silica.

(أنظر بند 2.7 "معلومات هامة بخصوص جزء من مركبات تيمودال").

تيمودال 5 ملغ كبسولات: كل كبسولة تحتوي 132.8 ملغ لاكتوز لأمائي.
تيمودال 20 ملغ كبسولات: كل كبسولة تحتوي 182.2 ملغ لاكتوز لأمائي.
تيمودال 100 ملغ كبسولات: كل كبسولة تحتوي 175.7 ملغ لاكتوز لأمائي.
تيمودال 250 ملغ كبسولات: كل كبسولة تحتوي 154.3 ملغ لاكتوز لأمائي.

غلاف الكبسولة:

تيمودال 5 ملغ كبسولات:

gelatin, titanium dioxide, sodium lauryl sulfate, yellow iron oxide, FD & C Blue 2.

تيمودال 20 ملغ كبسولات:

gelatin, titanium dioxide, yellow iron oxide, sodium lauryl sulfate.

تيمودال 100 ملغ كبسولات:

gelatin, titanium dioxide, sodium lauryl sulfate, red iron oxide.

تيمودال 250 ملغ كبسولات:

gelatin, titanium dioxide, sodium lauryl sulfate.

حبر الطباعة:

Shellac, anhydrous ethyl alcohol, isopropyl alcohol, n-butyl alcohol, propylene glycol, purified water, ammonium hydroxide, potassium hydroxide, and black iron oxide.

كيف يبدو تيمودال ومحتوى العبوة

تيمودال 5 ملغ كبسولات هي ذات جسم-كبسولة أبيض سدود، غطاء كبسولة أخضر سدود، ويوجد عليها طباعة بحبر أسود. على غطاء الكبسولة مطبوع "TEMODAL". على جسم الكبسولة مطبوع "5 mg"، شعار شيرينغ بلاو وخطين.
تيمودال 20 ملغ كبسولات هي ذات جسم-كبسولة أبيض سدود، غطاء كبسولة أصفر سدود، ويوجد عليها طباعة بحبر أسود. على غطاء الكبسولة مطبوع "TEMODAL". على جسم الكبسولة مطبوع "20 mg" شعار شيرينغ بلاو وخطين.

تيمودال 100 ملغ كبسولات هي ذات جسم-كبسولة أبيض سدود، غطاء كبسولة زهري سدود، ويوجد عليها طباعة بحبر أسود. على غطاء الكبسولة مطبوع "TEMODAL". على جسم الكبسولة مطبوع "100 mg" شعار شيرينغ بلاو وخطين.

تيمودال 250 ملغ كبسولات هي ذات جسم وغطاء كبسولة أبيضين سدودين، ويوجد عليها طباعة بحبر أسود. على غطاء الكبسولة مطبوع "TEMODAL". على جسم الكبسولة مطبوع "250 mg" شعار شيرينغ بلاو وخطين.

حجم العبوات: عبوة الكيس لكل كبسولة

الكبسولات للبلع تُغلف على حدة باكياس وتُصَرَّف في كراتين التي تحتوي على 5 أو 20 كبسولة.

قد لا تكون كافة أحجام العبوات مُسَوَّقة.

صاحب التسجيل وعنوانه:

شركة ميرك شارپ ودوهم (إسرائيل - 1996) م.ض، هحاراش 34، هود هشارون.

تم تحريرها في تشرين الثاني 2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

120.28.30114 تيمودال 5 ملغ:

120.29.30115 تيمودال 20 ملغ:

120.30.30116 تيمودال 100 ملغ:

120.31.30119 تيمودال 250 ملغ:

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. بالرغم من ذلك، الدواء مُخصص لكلا الجنسين.