

נובמבר 2023

רופא/ה רוקח/ת נכבד/ה,

חברת נוברטיס ישראל בע"מ מבקשת להודיעכם על עדכון העלון לצרכן של התכשירים:

מספר רישום	שם תכשיר
162-95-35898-00/1	Aripiprazole Sandoz <sup>®</sup> 5
162-96-35899-00/1	Aripiprazole Sandoz <sup>®</sup> 10
162-97-35911-00/1	Aripiprazole Sandoz® 15
162-99-35971-00/1	Aripiprazole Sandoz® 30

aripiprazole :מרכיב פעיל

tablets :צורת מינון

## התוויות רשומות:

## 5mg; 10mg; 15mg:

Aripiprazole Sandoz is indicated for the treatment of schizophrenia, for the treatment of moderate to severe manic episodes in Bipolar I disorder and for the prevention of a new manic episode in patient who experienced predominantly manic episodes and whose manic episodes responded to aripiprazole treatment.

Aripiprazole Sandoz is indicated for use as an adjunctive therapy to antidepressants for the treatment of major depressive disorder (MDD). Efficacy was established in two 6-week trials in adults with MDD who had an inadequate response to antidepressant therapy during the current episode.

Aripiprazole Sandoz is indicated for the treatment of irritability associated with autistic disorder. Efficacy was established in two 8-week trials in pediatric patients (aged 6 to 17 years) with irritability associated with autistic disorder (including symptoms of aggression towards others, deliberate self-injuriousness, temper tantrums, and quickly changing moods).

## 30mg:

Aripiprazole Sandoz is indicated for the treatment of schizophrenia, for the treatment of moderate to severe manic episodes in Bipolar I disorder and for the prevention of a new manic episode in patient who experienced predominantly manic episodes and whose manic episodes responded to aripiprazole treatment.

בהודעה זו מצויינים רק הסעיפים בהם בוצעו שינויים מהותיים בלבד בעלון לצרכן.

מקרא לעדכונים המסומנים מטה:

תוספת החמרה – כתב כחול

תופעות לוואי .4

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 100):

- חולשה; תשישות; חוסר אנרגיה.
  - ירידה במשקל; אובדן תיאבון.
  - <u>ירידה ברמות פרולקטין בדם.</u>
- עוויתות או תנועות בלתי רצוניות; צורך להיות בתנועה כל הזמן.
  - הקאות; בחילות; תחושת אי-נוחות בקיבה; עצירות.



- סחרחורות, כאבי ראש; קשיי שינה, חרדה ותחושת אי-שקט; טשטוש ראייה.
  - מחלות בדרכי הנשימה העליונות.

..

## תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-1-10 משתמשים מתוך 10,000):

- תרומבוציטופניה (ירידה ברמת הטסיות בדם).
- רפרוף עליות (atrial fibrillation); חסם עלייתי-חדרי; פרפור פרוזדורים (atrial fibrillation); תעוקת חזה (אנגינה פקטוריס); זרימת
  דם לא מספקת לשריר הלב (איסכמיה של שריר הלב); התקף לבוד (al flutter); דום נשימתי; כשל לבבי אי ספיקת לב.
  - אצירת שתן<del>; <u>הרטבה</u> השתנה לילית</del>.

..

למידע נוסף, ניתן לעיין בעלון לצרכן המצורף להודעה זו.

העלון לצרכן נשלח לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug

כמו כן ניתן לקבל את העלון המודפס על ידי פניה לבעל הרישום – נוברטיס ישראל בע"מ, בטלפון מספר 03-9201111

לעדכונכם בברכה,

דפנה סנדבסקי,

רוקחת ממונה חטיבת סנדוז,

נוברטיס ישראל בע"מ