



עלון לצריך לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

בקסרו

תרחיף להזרקה במצרך מוכן לשימוש

כל מנה (0.5 מ"ל) מכילה:

ארבעה חלבונים רקומביננטיים מחידק הניסרית מנינגייטיס מקבוצה B:

- | | |
|-------------|---|
| 50 מיקרוגרם | - Recombinant <i>Neisseria meningitidis</i> group B NHBA fusion protein |
| 50 מיקרוגרם | - Recombinant <i>Neisseria meningitidis</i> group B NadA protein |
| 50 מיקרוגרם | - Recombinant <i>Neisseria meningitidis</i> group B fHbp fusion protein |
| 25 מיקרוגרם | - Outer membrane vesicles (OMV) from <i>Neisseria meningitidis</i> group B strain NZ98/254 measured as amount of total protein containing the PorA P1.4 |

לרשימת החומרים הבלתי פיעלים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 - " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 - " מידע נוספת".

קרא בעיון את העلون עד סוףו לפני שימוש אתה או ילך **תשמשו בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. תרופה זו נרשמה בעבר או בעבר ילך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

חיסון פועל החל מגיל חדשניים ומעליה כנגד מחלת מנינגווקוקית פולשנית הנגרמת על ידי חיידק הניסרית מנינגייטיס (*Neisseria meningitidis*) מקבוצה B.

קבוצה רפואיית:

חיסון מקבוצת המנינגווקוק מסוג B.

בקסרו מכיל ארבעה רכיבים שונים מפני השטח של חיידק הניסרית מנינגייטיס (*Neisseria meningitidis*) מקבוצה B.

חיידק זה עלול לגרום לziehheimits חמוריים ולעיטים מסכני חיים, כגון דלקת קרום המוח (דלקת של מעטה המוח וחוט השדרה) וספסיס (אלח דם).

החיסון פועל על ידי גירוי ספציפי של מערכת החיסון הטבעית של המתחסן ובכך נותן הגנה נגד המחלות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה או ילדך רגשים (אלרגיים) לחומרים הפעילים או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).

ażhorot miyohdot haengavot leshimush batrrofa :
לפני הטיפול בבكسרו ספר לרופא אם:

- לך או ילדך יש זיהום חמוץ עם חום גבוה. במצב זה, החיסון יידחה. במקרה של זיהומים קלים, כגון צינון, לא יהיה צורך לדוחות את החיסון, אולם יש לדבר עם הרופא או האחות תחיליה.
- לך או ילדך יש המופilia או כל בעיה אחרת אשר עלולה למנוע מהדם להיקrush כראוי, כגון טיפול במדללי דם (נוגדי קרישה). דבר עם הרופא או האחות תחיליה.
- אתה או ילדך מטופלים בתרופה כגון אקווליזומאב, אשר חוסמת את פעילותה של מערכת המשלימים, מהוות חלק מערכות החיסון. אתה או ילדך נמצאים בסיכון גבוה לחЛОות במחלת הנגרמת על ידי חידק ניסריה מניגיטיס מקבוצה B, על אף שאתה או ילדך חוסנתם עם בקסרו.
- הילד שלך נולד לפני הזמן (לפני או בשבוע 28 של ההריון), ביחס אם היו לו קשיי נשימה. הפסיקת נשימה או נשימה לא סדירה במשך זמן קצר עלולה להיות שכיחה יותר בשלושת הימים הראשונים לאחר החיסון בתנוקות אלה, וייתכן שיידקקו למשך מיום אחד.
- לך או ילדך יש אלרגיה לאנטיביוטיקה קנמייצין. אם אכן קיימת, רמת הקנמייצין בחיסון נמוכה. אם לך או ילדך עשוי להיות אלרגיה לקנמייצין, דבר תחיליה עם הרופא או האחות.

עלפונ, תחושת עילפון או תגבות אחרות הקשורות לחץ עשויות להתרחש כתגובה לכל זריקה עם מחלת. ספר לרופא או לאחות אם חוות התגובה צזו בעבר.

אין מידע על שימוש בבקסרו במבוגרים מעל גיל 50 שנים. ישנו מידע מוגבל לגבי השימוש בבקסרו בחולים עם מצב רפואי כרוני או עם מערכת חיסון מוחלשת. אם לך או ילדך יש מערכת חיסון מוחלשת (למשל כתוצאה שימוש בתרופות המדכאות את מערכת החיסון או זיהום VII או פגם תורשתי במערכת החיסון הטבעית של הגוף), ייתכן כי ייעילות בקסרו תהיה פחותה.

בדומה לכל חיסון אחר, ייתכן כי בקסרו לא יגן באופן מלא על כל מי שמתחסן.
אינטראקטיות/תגבות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם תקח לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

ספר לרופא או לאחות אם אתה או ילדך לוקחים או תקחتم לאחרונה או עשויים לתקח תרופות אחרות כלשהן או אם קיבלתם לאחרונה כל חיסון אחר.

בקסרו יכול להינתן באותו הזמן עם כל אחד ממרכיבי החיסון הבאים: דיפטירה, טטנוז, שעלת, המופיליס אינפלואנזה δ, פוליו, דלקת כבד B, פנמאוקוקוי, חצבת, חזרת, אדמת, אבעבועות רוח ומניגוקוקוי A, C, W, Y. דבר עם הרופא או האחות למידע נוסף.

כאשר בקסרו ניתן באותו הזמן עם חיסונים אחרים, יש לתת אותו באתר הזרקה נפרדים. יתכן כי הרופא או האחות יבקש מך לתת ליילדך תרופות אשר מורידות את החום בזמן ולאחר המתן של בקסרו. הדבר יעזור להקטין חלק מתופעות הלועאי של בקסרו.

הירין והנקה

אם את בהירין או מניקה, חשבת שייתכן שתאת בהירין או אם את מתכוננת להרות, התיעצי עם הרופא לפניו שבקסרו ניתן לך. יתכן שהרופא עדין ימליץ שתקבלי בקסרו אם את בסיכון לחשיפה לזמן מוגזק.

נהיגה ושימוש במכונות

לבקסרו אין השפעה או יש השפעה זניחה על היכולת לנוהג ולהפעיל מכונות. עם זאת, חלק מהתופעות המוזכרות בסעיף 4 "טופעות לוואי" עלולות להשפיע באופן זמני על היכולת לנוהג או להפעיל מכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התכשיר מכיל פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) למנה, כלומר הוא מוגדר כתכשיר "לא נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

בקסרו (0.5 מ"ל) ניתן לך או ליילדך על ידי רופא או אחות. הוא יזרק לתוך השריר, בדרך כלל בירך אצל תינוקות או בזרוע העליונה אצל ילדים, מתבגרים ומבוגרים.

חשוב לעקוב אחר הוראות הרופא או האחות על מנת שתאתה או ילדך תשלימו את כל סדרת הזריקות.

המינון המקובל הוא:

תינוקות בגילאי 2 עד 5 חודשים מעת המנה הראשונה
הילד שלך יקבל סדרה התחלתיות של שתיים או שלוש זריקות חיסון ולאחריה מנה נוספת (מנת דחף).

- הזריקה הראשונה תינתן לא מוקדם מגיל חמודשים.
- אם ניתנות שלוש זריקות ראשונות, המרווח בין הזריקות יהיה לפחות חודש אחד.
- אם ניתנות שתי זריקות ראשונות, המרווח בין הזריקות יהיה לפחות חמודשים.
- מנת דחף תינתן בין גילאי 12 ל-15 חודשים, לאחר מרוחך של לפחות 6 חודשים מהזריקה الأخيرة של הסדרה התחלתיות. במקרה של עיכוב, אין לחת את מנת הדחף יאוחר מגיל 24 חודשים.

תינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים מעת המנה הראשונה
תינוקות בגילאי 6 עד 11 חודשים יקבלו שתי זריקות חיסון ולאחריה מנה נוספת (מנת דחף).
- המרווח בין הזריקות יהיה לפחות חמודשים.

ילדים בגילאי 12 עד 23 חודשים מעת המנה הראשונה
ילדים בגילאי 12 עד 23 חודשים יקבלו שתי זריקות חיסון ולאחריה מנה נוספת (מנת דחף).
- המרווח בין הזריקות יהיה לפחות חמודשים.
- מנת הדחף תינתן לאחר מרוחך של 12 עד 23 חודשים מהזריקה השנייה.

ילדים בגילאי 2 עד 10 שנים מעת המנה הראשונה
ילדים בגילאי 2 עד 10 שנים יקבלו שתי זריקות חיסון.
- המרווח בין הזריקות יהיה לפחות חודש.
ויתכן שילדך יקבל זריקה נוספת (מנת דחף).

מתבגרים ומבוגרים מגיל 11 שנים מעת המנה הראשונה
מתבגרים (מגיל 11 שנים) ומבוגרים יקבלו שתי זריקות חיסון.
- המרווח בין הזריקות יהיה לפחות חודש.
ויתכן שתקבל זריקה נוספת (מנת דחף).

מבוגרים מעל גיל 50 שנים
לא קיימ מיעד במבוגרים מעל גיל 50 שנים. התיעץ עם הרופא אם ישנה תועלת עבור בקבלה בקורסו.

אין לעבר על המנה המומלצת.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בקסרו עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

כאשר בקסרו ניתן לך או לילדך, תופעות הלואן השכיחות מאוד (עלולות להופיע ביותר ממשתמש אחד מעשרה) שאתה או יליך (דוח בכל קבוצות הגיל) עלולים לחוות הם:

- כאב/רגישות במקום ההזרקה, אדמומיות העור במקום ההזרקה, נפיחות בעור במקום ההזרקה, התקשות העור במקום ההזרקה.
- תופעות לוואי הבאות עשויות גם לאחר קבלת החיסון.

תינוקות וילדים (עד 10 שנים)

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- **יותר מ-1 מכל 10** אנשים:

- חום (38 מעלות צלזיוס ומעלה)
- אובדן תיאבון
- רגישות במקום ההזרקה (כולל רגישות חמורה במקום ההזרקה שעלולה לגרום לבכי בעת הזרקת האיבר שבו הזרק החיסון)
- כאבים במפרקים
- פריחה בעור (ילדים בגיל 12 חודשים עד 23 חודשים) (לא שכיח לאחר זריקת דחף)
- ישנוניות
- תחושת עצבנות
- בכி לא רגיל
- הקאה (לא שכיח לאחר זריקת דחף)
- שלשלול
- כאב ראש

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10** אנשים:

- פריחה בעור (תינוקות וילדים בגילים 2 עד 10 שנים)

תופעות לוואי לא שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 100** אנשים:

- חום גבוה (40 מעלות צלזיוס ומעלה)
- פרכויסים (כולל פרכויסי חום)

- עור יבש

- חיוורון (נדיר לאחר זריקת דחף)

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 1000** אנשים:

- מחלת קוואסאקי העשויה לכלול תסמינים כגון חום הנמשך יותר מחמשה ימים, המלווה בפריחה בעור על מרכז הגוף, ולעיתים מלאה בהתקלפות עור הידיים והאצבעות, נפיחות בבלוטות הצואר, עיניים, שפטים, גרון ולשון אדומים.
- גרד בעור, פריחה בעור

מתבגרים (Mageil 11 שנים) ומבוגרים

תופעות לוואי שכיחות מודרנית

אליה עלולות להופיע ב- **יותר מ-1 מכל 10** אנשים:

- כאב במקום ההזרקה הגורם לחוסר יכולת לבצע פעולות יומיות רגילות
- כאב שרירים ומפרקים
- בחילה
- תחושה כללית לא טובה
- כאב ראש

תופעות לוואי נוספת:

בלוטות ליפפה מגדלות.

תגובהות אלרגיות העשויה לכלול נפיחות חמורה של השפטים, פה, גרון (העלולה לגרום לקשיים בבליעה), קשיי נשימה המלאים בצפצופים או שיעול, פריחה, איבוד הכרה ולחץ דם נמוך מאוד.

התמוטטות (חולשת שרירים פתאומית), יכולת תגובה ירודה מהרגיל או חוסר ערנות, חיוורון או עור בצלב כחליל בילדים צעירים. תחושת עילפון או עילפון.

פריחה בעור (במתבגרים Mageil 11 שנים ובמבוגרים).

חום (במתבגרים Mageil 11 שנים ובמבוגרים).

תגובהות באטר ההזרקה כגון נפיחות נרחבת של האיבר שחוץ, שלפוחיות במקום או סביב אזור ההזרקה וגושם קשים באזור ההזרקה (היכולים להישאר יותר מחודש).

קשיין בצוואר או רגשות לא נעימה לאור (פוטופוביה), המציגות על גירוי מניגיאלי, דוחון באופן ספורדי זמן קצר לאחר ההתחסנות. תסמינים אלו היו קלים וחולפים.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואה מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צינה בעלון, عليك להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות ([המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il/](http://www.health.gov.il)

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה ותוויות המזرك. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן בקירור ($C -8^{\circ}$). אין להקפיא.
- יש לאחסן באירועה המקורי על מנת להגן מפני.
- אין להשאיר תרופות לביב או לפסולת הביתיית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Sucrose, sodium chloride, aluminium hydroxide, histidine and water for injections.

ראה גם סעיף 2 בעלון – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האירועה:
 - בקסרו הינו תרכיף להזרקה במזרק המוכן לשימוש. התרכיף הינו נוזל לבן אוטום.
 - גדלי אירוע: מזרק אחד או עשרה מזרקים עם או בלי מחתמים. יתכן שלא כל גגלי האירועים משוקקים.
- בעל הרישום: גלקסומיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בל 25, פתח תקווה.
- יצרן: GSK חיסונים I.R.S., סינה, איטליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 155-59-34399.
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK.

©2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

The following information is intended for healthcare professionals only:

Upon storage a fine off-white deposit may be observed in the pre-filled syringe containing the suspension.

Before use, the pre-filled syringe should be well shaken in order to form a homogeneous suspension.


The vaccine should be visually inspected for particulate matter and discolouration prior to administration. In the event of any foreign particulate matter and/or variation of physical aspect being observed, do not administer the vaccine. If two needles of different lengths are provided in the pack, choose the appropriate needle to ensure an intramuscular administration.

Do not freeze.

Bexsero must not be mixed with other vaccines in the same syringe. Should concomitant administration of other vaccines be necessary, vaccines must be administered at separate injection sites.


Care must be taken to ensure that the vaccine is injected intramuscularly only.

Instructions for the pre-filled syringe



Hold the syringe by the barrel, not by the plunger.

Unscrew the syringe cap by twisting it anticlockwise.



To attach the needle, connect the hub to the Luer Lock Adaptor and rotate a quarter turn clockwise until you feel it lock.

Do not pull the syringe plunger out of the barrel. If it happens, do not administer the vaccine.

Disposal

Any unused medicinal product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements.

Bex PT V3