



עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת ללא מרשם רופא

פניסטיל ג'ל 0.1% w/w

Dimethindene Maleate 0.1% w/w

דימטינדן מליאט 0.1% w/w

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר – ראה סעיף 6 וסעיף 2 תחת הכותרת "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה.

עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח. עליך להשתמש בתכשיר על פי ההוראות בסעיף המינון בעלון זה. היועץ ברוקח אם הינך זקוק למידע נוסף. עליך לפנות לרופא במידה ותסמיני המחלה (סימפטומים) מחמירים או אינם משתפרים לאחר 7 ימים.

1. למה מיועדת התרופה?

פריחה, גרד, מחלות עור לא דלקתיות, כוויות, עקיצות חרקים, דלקת עורית על רקע אלרגי ואקזמה. **קבוצה תרפויטית:** אנטי היסטמינים

פניסטיל ג'ל מנטרל את השפעת ההיסטמין, אחד החומרים המופרשים במהלך התגובה האלרגית. במגע עם העור, פניסטיל ג'ל מקל על הגרד הנגרם כתוצאה מהתגובה האלרגית. בנוסף פניסטיל ג'ל הינו בעל תכונת אילחוש מקומית. פניסטיל ג'ל הינו ג'ל המבוסס על מים והוא מאפשר לחומר הפעיל לחדור היטב לעור במהירות (תוך מספר דקות) להקלה על עור מגרד ומגורה.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל דימטינדן מליאט או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה פניסטיל ג'ל, כמפורט בסעיף 6 של העלון.
- כאשר קיימת אלרגיה ידועה לעקיצות חרקים.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בפניסטיל ג'ל, ספר לרופא: אם יש לך מחלה אחרת, אם אתה אלרגי, אם אתה כבר נוטל או משתמש בתרופות אחרות דרך הפה או במריחה (אפילו בטיפול עצמי!).

אזהרות נוספות:

- הימנע ממריחה על אזורים נרחבים, על פצעים פתוחים, על נגעים נרחבים בעור או על עור פגום (כגון כוויות), במיוחד בילדים קטנים ובתינוקות.
- הימנע מחשיפה ממושכת לשמש של האזורים המטופלים.
- התייעץ עם הרופא במקרה של גירוד משמעותי או נגעים מורחבים.
- התייעץ עם הרופא אם התסמינים ממשיכים יותר מ-7 ימים.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

הריון והנקה

בזמן הריון והנקה, יש למרוח פניסטיל ג'ל בזהירות, ולא למרוח על אזורים נרחבים, משופשפים או מודלקים של העור. אין למרוח את הג'ל על הפטמות בזמן ההנקה.

נהיגה ושימוש במכוונות

לפניסטיל ג'ל אין השפעה או שיש לו השפעה זניחה על היכולת לנהוג ולהפעיל מכוונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

פניסטיל ג'ל מכיל פרופילן גליקול בריכוז של 150 מ"ג/גרם: פרופילן גליקול עלול לגרום לגירוי של העור.

פניסטיל ג'ל מכיל בנזלוקוניום כלוריד בריכוז של 0.05 מ"ג/גרם: בנזלוקוניום כלוריד עלול לגרום לגירוי של העור. אם הינך מניקה, אין למרוח את התכשיר על החזה, כיוון שהחומר עלול לעבור בחלב האם.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או עם הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ולאופן הטיפול בתכשיר. המינון המקובל בדרך כלל הוא: מבוגרים וילדים:

למרוח שכבה דקה 2-4 פעמים ביום על האזור הפגוע ולעסות בעדינות. **אין לעבור על המנה המומלצת.**

משך הטיפול

אין להשתמש בפניסטיל ג'ל יותר מ-7 ימים ברצף מבלי להיוועץ ברופא.

אין בלולע. לשימוש חיצוני בלבד.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך. **אין ליטול תרופות בחושך! בודק התווית והמנה בכל פעם שהינך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.** אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בפניסטיל ג'ל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש להפסיק את השימוש ולהיוועץ ברופא אם מופיעה תגובה אלרגית בעור, לרבות פריחה וגירוד. זוהי תופעת לוואי נדירה מאוד (very rare) המופיעה בפחות ממשתמש אחד מתוך 10,000. תופעות שכיחות (uncommon) – תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000: יובש בעור או תחושת צריבה. **אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא הזכרה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.**

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה/התווית. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון:

אחסן מתחת ל-25°C.

6. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם: Purified Water, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide Solution, Carbomer, Disodium edetate, Benzalkonium Chloride
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
ג'ל שקוף עד צהבהב וכמעט חסר ריח.
אריזה: שפופרת אלומיניום סגורה בפקק מפלסטיק.
גודל האריזה: 30 גרם או 100 גרם.
ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.
- בעל הרישום וכתובתו: ג'י.אס.קיי. קונסיומר הלת'קר ישראל בע"מ, ת.ד. 3256, פתח תקווה
- שם היצרן וכתובתו: ג'י.אס.קיי. קונסיומר הלת'קר SARL, ניון, שוויץ.
- העלון נערך במרץ 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 133-24-24020
- לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינות של קבוצת החברות של GSK. ©2023 קבוצת החברות של GSK או הזכיון שלה.