



Инструкция по применению в соответствии с фармацевтическими стандартами (препараты) - 1986

Препарат продается без рецепта врача

Фенистил гель 0,1%

Диметиндена малеат 0,1%

Dimethindene Maleate 0.1% w/w

Перечень неактивных компонентов и аллергенов в препарате приведен в пункте 6, а также в пункте 2 под заголовком «Важная информация о некоторых из ингредиентов препарата».

Внимательно и полностью прочитайте инструкцию перед применением препарата.

Данная инструкция содержит краткую информацию о препарате. Если у вас имеются дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Используйте препарат в соответствии с указаниями в пункте «Дозировка» данной инструкции.

Проконсультируйтесь с фармацевтом, если вам необходима дополнительная информация. При обострении признаков заболевания (симптомов) или отсутствии улучшения через 7 дней - обратитесь к врачу.

1. Показания к применению:

Сыпь, зуд, невоспалительные заболевания кожи, ожоги, укусы насекомых, аллергический дерматит и экзема.

Терапевтическая группа: Антигистаминные средства

Гель Фенистил нейтрализует действие гистамина - одного из веществ, выделяющихся при аллергической реакции. При нанесении на кожу Фенистил гель облегчает зуд, вызванный аллергической реакцией. Кроме того, Фенистил гель обладает местно-анестезирующим действием. Фенистил гель представляет собой гель на водной основе. Это позволяет действующему веществу эффективно и быстро проникать в кожу (в течение нескольких минут), облегчая зуд и раздражение.

2. Перед применением препарата

Не следует принимать препарат в следующих случаях:

- при гиперчувствительности (аллергии) к активному ингредиенту – диметиндена малеат, либо к любому другому компоненту, содержащемуся в лекарстве (перечень приведен в пункте 6);
- при диагностированной аллергии на укусы насекомых.

Особые предостережения относительно использования препарата

Перед началом лечения препаратом Фенистил гель сообщите врачу: если у вас есть другое заболевание, если у вас есть аллергия, если вы уже принимаете другие препараты перорально или наружно, в форме мазей (даже при самолечении!).

Дополнительные предостережения

- Избегайте нанесения на обширные участки, на открытые раны, на обширные поражения кожи или на поврежденные участки кожи (например, при ожогах), особенно у маленьких детей и младенцев.
- Избегайте длительного воздействия солнечных лучей на обрабатываемые участки.
- Обратитесь к врачу в случае значительного зуда или обширных поражений кожи.
- Обратитесь к врачу, если симптомы сохраняются более 7 дней.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Если вы принимаете, либо недавно принимали другие лекарственные препараты, включая безрецептурные препараты и биодобавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и кормление грудью

Во время беременности и кормления грудью Фенистил гель следует применять с осторожностью, не нанося на обширные, натертые или воспаленные участки кожи.

Не наносите гель на соски в период грудного вскармливания.

Вождение и управление механизмами

Фенистил гель не влияет на способность управлять транспортными средствами или механизмами.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

Фенистил гель содержит пропиленгликоль в концентрации 150 мг/г: пропиленгликоль может вызвать раздражение кожи.

Фенистил гель содержит бензалкония хлорид 0,05 мг/г: бензалкония хлорид может вызвать раздражение кожи. Если вы кормите грудью, не следует наносить препарат на область груди, так как вещество может проникать в материнское молоко.

3. Как использовать препарат?

При возникновении сомнений касательно дозировки и способа применения препарата проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

Принятая дозировка, как правило

Взрослым и детям:

Нанести тонким слоем на пораженные участки кожи и легко помассировать. Применять 2-4 раза в день.

Не превышать рекомендуемую дозу.

Продолжительность лечения

Не следует применять Фенистил гель более 7 дней подряд без консультации врача.

Не глотать. Только для наружного использования.

В случае передозировки или случайного приема препарата внутрь ребенком немедленно обратитесь к врачу или в приёмный покой больницы, взяв с собой упаковку препарата.

Лекарства нельзя принимать в темноте! При каждом приёме препарата проверяйте его название и дозировку на упаковке. Если нужно, надевайте очки.

Если у вас есть дополнительные вопросы относительно применения препарата, проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом.

4. Побочные эффекты

Как и при лечении любым другим препаратом, применение Фенистил геля может вызвать побочные эффекты у части пациентов. Не пугайтесь при чтении списка побочных эффектов. Возможно, вам не придется столкнуться ни с одним из них.

Прекратите использование препарата и обратитесь к врачу, если возникла кожная аллергическая реакция, в том числе сыпь и зуд. Это очень редкий побочный эффект (very rare), проявляющийся с частотой ниже 1:10 000.

Нечасто встречающиеся побочные эффекты (uncommon) - проявляющиеся с частотой 1-10 на 1,000: сухость кожи или чувство жжения.

В случае появления или усугубления какого-либо из побочных эффектов, либо проявления побочного эффекта, не упомянутого в данной инструкции, проконсультируйтесь с врачом.

Сообщить о побочных эффектах в министерство здравоохранения можно, заполнив форму отчета о побочных эффектах по ссылке «Отчет о побочных эффектах в результате медикаментозного лечения» на главной странице веб-сайта Министерства здравоохранения (www.health.gov.il), либо по ссылке: <https://sideeffects.health.gov.il/>

5. Как хранить препарат?

Не допускайте отравления! Во избежание отравлений данный препарат, как и все другие лекарства, следует хранить в закрытом месте, недоступном для детей и находящемся вне их поля зрения. Не вызывайте рвоту без получения четкого указания врача.

Не используйте препарат после истечения срока годности (exp. date), указанного на упаковке/этикетке. Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Условия хранения:

Хранить при температуре ниже +25 °C.

6. Дополнительная информация

- Помимо действующего вещества препарат содержит:
Purified Water, Propylene Glycol, Sodium Hydroxide Solution, Carbomer, Disodium edetate, Benzalkonium Chloride
- Внешний вид препарата и содержимое упаковки:
прозрачный, слегка желтоватый гель почти без запаха.
Упаковка: алюминиевая туба, закрытая пластиковой крышкой.
Размер упаковки: 30 граммов или 100 граммов.
В продаже могут быть представлены не все размеры упаковок.
- Владелец регистрационного удостоверения и его адрес: GSK Консьюмер Хелскейр Израиль Лтд., п/я 3256, Петах-Тиква
- Производитель и его адрес: GSK Консьюмер Хелскейр SARL, Ньон, Швейцария.
- Отредактировано в марте 2023 согласно указаниям Министерства здравоохранения.
- Регистрационный номер лекарства в государственном реестре Министерства здравоохранения: 133-24-24020
- Данная инструкция изложена в мужском роде из соображений простоты и удобства чтения. Тем не менее, данный препарат предназначен для представителей обоих полов.

Торговые знаки принадлежат GSK на правах собственника или на основании лицензионного договора. ©2023 GSK или лицензиат.

FenGel PT v2.2