



تم تحديث محتوى هذه النشرة وفقاً لتعليمات وزارة الصحة بتاريخ: تشرين الثاني 2017
نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) – 1986
يسوق الدواء بدون وصفة طبية

كورسوديل غسول للفم

المادة الفعالة:

كلور هيكسيدين ديكلوكونات 0.2% w/v

chlorhexidine digluconate 0.2% w/v

قائمة المواد الإضافية مفصلة في الفقرة 6.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي. هذا الدواء مخصص للإستعمال لدى المتعالجين ما فوق عمر 12 سنة. ما دون هذا العمر يجب التوجه للطبيب قبل الإستعمال.

عليك إستعمال المستحضر بطريقة صحيحة. إستشر الصيدلي إذا كنت تحتاج لمعلومات إضافية.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

- لإعاقة تشكّل البلاك
- كمساعد لعلاج ومنع إلتهاب اللثة (gingivitis)
- كمساعد للحفاظ على صحة الفم
- للإستعمال بعد عمليات جراحة الأسنان أو علاجات الأسنان، لتسريع شفاء اللثة
- للإستعمال للتقرحات، للإلتهاجات عقب أطقم الأسنان ولفطريات الفم

الفصيلة العلاجية: مطهر

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا كان لديك رد فعل تحسسي لـ كلور هيكسيدين ديكلوكونات أو لأحد مركبات الدواء.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

- لا يجوز الإستعمال لدى الأطفال دون عمر 12 سنة إلا بتوصية من الطبيب.
- لا يجوز الإستعمال بأي مكان آخر عدا فمك. لا يجوز البلع. إغسل بالماء بشكل شامل إذا دخل شيء إلى داخل عينيك أو أذنيك.
- في حال حدوث رد فعل تحسسي شديد، عليك التوقف عن الإستعمال والتوجه فوراً لتلقي المساعدة. أنظر «أعراض جانبية».
- لا يجوز الإستعمال فوراً بعد فرك أسنانك. أنظر «كيفية إستعمال الدواء» لمعلومات إضافية.
- لا يجوز تبييض الأقمشة التي كانت بتلامس مع غسول الفم.
- قد يظهر تبقع مؤقت للأسنان واللسان. أنظر «أعراض جانبية».
- من الممكن أن يطرأ تغير على حاسة التذوق، أو أن تشعر بحرقة. أنظر «أعراض جانبية».

إذا كنت تستعمل، أو إذا إستعملت مؤخراً أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

الحمل والإرضاع

من الممكن إستعمال الدواء، إذا كنت في فترة الحمل أو مرضعة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

مكروچول چلیسیرول هیدروکسی سیترات قد يؤدي لردود فعل في الجلد.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

استعمل فقط إذا كان الختم على السداد/ العلبه موجوداً بأكمله قبل الفتح.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

لا يجوز البلع.

من شأن معاجين الأسنان أن تضر بفعالية غسول الفم. بعد فرك أسنانك، اغسل فمك بشكل شامل مع الماء وانتظر 5 دقائق قبل إستعمال كورسوديل غسول للفم. بدلاً من ذلك، يمكنك أيضاً إستعمال غسول الفم في وقت آخر من اليوم.

المقدار الدوائي الإعتيادي هو:

إستعمل مرتين في اليوم. إملأ الغطاء حتى خط 10 ملل. اغسل الفم بشكل شامل لمدة دقيقة واحدة ومن ثم إبصق.

إلتهاب اللثة: يوصى بالإستعمال لمدة شهر.

تقرحات في الفم وفطريات الفم: إستمر بالإستعمال لمدة يومين بعد الشفاء.

إلتهابات الفم عقب أطقم الأسنان: قم بتنظيف ونقع طقم الأسنان خاصتك بغسول الفم لمدة 15 دقيقة مرتين في اليوم.

بعد عمليات جراحة الأسنان: القيام بالغسل وفقاً لتعليمات طبيب الأسنان خاصتك.

إذا إستمرت أعراضك. **توجه للطبيب.**

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال كورسوديل غسول للفم قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

توقف عن إستعمال غسول الفم وتوجه فوراً للمساعدة الطبية إذا ظهر لديك **طفح، إنتفاخ في الفم أو في الوجه** أو إذا كانت لديك **صعوبات في التنفس**. من شأن هذه الأعراض أن تكون علامات لرد فعل تحسسي شديد والذي هو نادراً جداً.

توقف عن إستعمال غسول الفم وتوجه للطبيب إذا ظهر لديك **هياج في الفم، ألم أو إنتفاخ للوجه - الخدين**.

أعراض جانبية أخرى يمكن حدوثها:

تبع مؤقت للسان. يختفي ذلك مع توقف العلاج.

تبع مؤقت للأسنان. يمكن إزالته عادة بواسطة فرك الأسنان. يمكنك منع التبع بواسطة الإمتناع عن شرب الشاي، القهوة، أو النبيذ الأحمر - خاصةً بعد ساعة من الإستعمال، وعن طريق الفرك اليومي بواسطة معجون الأسنان (أنظر «كيفية إستعمال الدواء») إذا بقي التبع يمكن إزالته بواسطة التنظيف والصقل عند طبيب الأسنان أو أخصائية صحة الأسنان. يمكنك أن تنظف طقم أسنانك بواسطة مادة لتنظيف أطقم الأسنان.

من المحتمل أن تلاحظ **تغير في حاسة التذوق، شعور بحرقة، خدر، أو وخز في اللسان** عندما تستعمل غسول الفم لأول مرة. يختفي ذلك عادة مع إستمرار العلاج. إذا إستمرت الأعراض - **يجب التوجه للطبيب**.

إذا حدث **تقشر للجلد داخل الفم**، خفف غسول الفم مع كمية مساوية من الماء.

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط «تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي» الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب أو الصيدلي.

5. كيفية تخزين الدواء؟

تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن مجال رؤية ومتناول أيدي الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية، للإستعمال حتى 6 شهور من الفتح.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً –

Purified water, Sorbitol, Glycerol, Macrogolglycerol hydroxystearate and Optamint 291616 flavour.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة –

محلول شفاف، صافٍ إلى عكر قليلاً، برائحة النعنع. قنينة ذات 300 ملل مع غطاء لولبي.

صاحب الامتياز والمستورد: جي.إس كيي كونسيومر هيلث كير إسرائيل م.ض.، ص.ب. 3256، بيتح – تكفا.

موقع التصنيع: أوميچا فارما مانيفوفاكتشرينج GmbH & Co. KG، هيرينبيرغ، ألمانيا.

أقرت وزارة الصحة بصيغة هذه النشرة ومحتواها فحص ورخص في تاريخ: حزيران 2014؛ تم تحديث هذه النشرة بموجب تعليمات وزارة الصحة بتاريخ: تشرين الثاني 2017

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

029-96-21599

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.

©2019 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Cor MW PT v7a