



Содержание данной инструкции обновлено в соответствии с указаниями
Министерства Здравоохранения в Ноябре 2017

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ СТАНДАРТАМИ (ПРЕПАРАТЫ) – 1986**

Препарат отпускается без рецепта врача

Корсодил ополаскиватель для рта

Активное вещество:

хлоргексидин диглюконат 0.2% w/v

chlorhexidine digluconate 0.2% w/v

Список дополнительных веществ приводится в разделе 6.

Внимательно и полностью прочитайте данную инструкцию перед применением препарата. Данная инструкция содержит основные сведения о препарате. Если у Вас есть дополнительные вопросы, обратитесь к врачу или фармацевту.

Препарат предназначен для пациентов старше 12 лет. Перед началом лечения пациентов младше 12 лет, следует проконсультироваться с врачом.

Правильно применяйте препарат. Посоветуйтесь с фармацевтом, если Вы нуждаетесь в дополнительной информации.

1. ДЛЯ ЧЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕН ПРЕПАРАТ?

- Для замедления образования зубного налета
- Как вспомогательное средство для лечения и профилактики воспаления десен (гингивита)
- Как вспомогательное средство для поддержания гигиены полости рта
- Применяется после операций или стоматологических процедур, для стимулирования заживления десен
- Применяется при язвах, воспалениях, вызванных зубными протезами, и при грибковом поражении полости рта

Фармакологическая группа: Антисептик

2. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА

Не следует применять препарат, если у Вас была аллергическая реакция на хлоргексидин диглюконат или на один из ингредиентов препарата.

Особые предостережения относительно применения препарата

- **Не применять детям младше 12 лет**, кроме как по рекомендации врача.
- **Препарат предназначен только для полости Вашего рта.** Не глотать. Если какое-то количество препарата попало в глаза или уши, тщательно промойте их водой.
- **В случае тяжелой аллергической реакции прекратите применение препарата и немедленно обратитесь за помощью.** Смотрите раздел “Побочные явления”.
- **Не применять сразу после чистки зубов.** Смотрите раздел “Как следует применять препарат” для дополнительной информации.
- **Не отбеливайте текстильные изделия**, которые были в контакте с ополаскивателем для рта.
- **Может возникнуть временное окрашивание зубов и языка.** Смотрите раздел “Побочные явления”.
- Возможно изменение вкусовых ощущений, или же Вы ощутите чувство жжения. Смотрите раздел “Побочные явления”.

Если Вы принимаете или недавно принимали другие лекарственные препараты, включая препараты, отпускаемые без рецепта врача, и пищевые добавки, сообщите об этом врачу или фармацевту.

Беременность и кормление грудью

Можно применять препарат, если Вы беременны или кормите грудью.

Важная информация о некоторых ингредиентах препарата

Макроголглицерол гидроксистеарат может вызвать кожные реакции.

3. КАК СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТ?

Выясните у врача или фармацевта, если Вы не уверены.

Применяйте, только если до первого применения на крышке флакона или упаковке имеется неповрежденная защитная пленка.

Не превышайте рекомендуемую дозу.

Не глотайте.

Зубные пасты способны нарушить активность ополаскивателя для рта. После чистки зубов с зубной пастой тщательно прополощите рот водой и подождите 5 минут, прежде, чем применять препарат Корсодил ополаскиватель для рта. Вы также можете применять ополаскиватель для рта в любое другое время в течение дня.

Обычная доза:

Применяйте два раза в день. Наполните крышку до отметки 10 мл. Тщательно прополощите рот в течение одной минуты, а затем выплюньте.

Воспаление десен: Рекомендуется применять в течение одного месяца.

Афты (язвы) во рту и грибок полости рта: Продолжайте применять в течение 2 дней после заживления.

Воспаление в ротовой полости вызванное зубными протезами: Почистите Ваши протезы и погружайте их в ополаскиватель для рта два раза в день в течение 15 минут.

После стоматологических операций: Промывайте в соответствии с указаниями Вашего стоматолога.

Если симптомы у Вас продолжают, **обратитесь к врачу.**

Не применяйте препараты в темноте! Каждый раз при применении препарата проверяйте этикетку и дозировку. В случае необходимости пользуйтесь очками.

4. ПОБОЧНЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Как и при лечении любым лекарством, применение Корсодила ополаскивателя для рта способно вызывать побочные явления у части пациентов. Не тревожьтесь при чтении списка побочных явлений. Возможно, Вы не будете страдать ни одним из них.

Прекратите применение ополаскивателя для рта и **немедленно обратитесь для получения медицинской помощи**, если у Вас возникла **сыпь, отек рта или лица**, или **у Вас затруднено дыхание**. Эти явления могут быть симптомами тяжелой аллергической реакции, которая очень редко встречается.

Прекратите применение ополаскивателя для рта и **обратитесь к врачу**, если у Вас появились **раздражение ротовой полости, болезненность или припухлость внутренней стороны щеки**.

Другие побочные явления, которые могут возникнуть:

Временное окрашивание языка. Это явление проходит с прекращением лечения.

Временное окрашивание зубов. Обычно это устраняется чисткой зубов. Вы можете избежать окрашивания, воздержавшись от употребления чая, кофе или красного вина – особенно в течение первого часа после применения ополаскивателя, а также ежедневной чисткой зубов зубной пастой (см. раздел “Как следует применять препарат”). Если окрашивание сохраняется, его можно устранить чисткой и полированием зубов у стоматолога или гигиениста. Ваши зубные протезы Вы можете почистить с помощью средства для чистки протезов.

Возможно Вы ощутите **изменение вкусовых ощущений, жжение, онемение или покалывание языка**, при первом ополаскивании рта Корсодилом. Обычно это прекращается в ходе лечения. Если явления продолжаются – **обратитесь к врачу.**

Если возникло **слущивание слизистой оболочки полости рта**, разбавьте ополаскиватель для рта равным количеством воды.

О побочных явлениях можно сообщить в Министерство Здравоохранения, нажав на ссылку “Отчет о побочных явлениях вследствие медикаментозного лечения”, находящуюся на домашней странице сайте Министерства здравоохранения (www.health.gov.il) и направляющую на форму онлайн, предназначенную для отчета о побочных явлениях, или зайдя по ссылке:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

Если появилось побочное явление, если одно из побочных явлений становится более выраженным, или Вы страдаете от побочного явления, не упомянутого в данной инструкции, Вам следует посоветоваться с врачом, стоматологом или фармацевтом.

5. КАК ХРАНИТЬ ПРЕПАРАТ?

Избегайте отравления! Этот препарат, как и любой другой, надлежит хранить в закрытом, недоступном для детей и/или младенцев месте и вне поля их зрения, во избежание отравления. Не вызывайте рвоту без получения точных указаний врача.

Не применяйте препарат по истечении срока его годности (exp. date), указанного на упаковке. Датой истечения срока годности является последний день указанного месяца.

Хранить при температуре ниже +25°C. **Применять в течение 6 месяцев с момента открытия флакона.**

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В дополнение к активному веществу, препарат также содержит -

Purified water, Sorbitol, Glycerol, Macrogolglycerol hydroxystearate and Optamint 291616 flavour.

Как выглядит препарат и какво содержимое упаковки - прозрачный раствор, от ясного до слегка мутного, с запахом мяты. Флакон с завинчивающейся крышкой, содержащий 300 мл препарата.

Владелец лицензии и импортер: GSK Консьюмер Хелскейр Израиль Лтд., а/я 3256, Петах Тиква.

Производственный объект: компания Омега Фарма Мануфакчуринг GmbH & Co. KG, Херренберг, Германия.

Формат данной Инструкции установлен Министерством Здравоохранения и ее содержание проверено и утверждено Министерством Здравоохранения в Июне 2014. Инструкция была обновлена в Ноябре 2017, в соответствии с указаниями Министерства Здравоохранения

Регистрационный номер препарата в Государственном Реестре лекарственных средств Министерства Здравоохранения: 029-96-21599

Торговые марки являются собственностью или лицензированы группой компаний GSK.
©2019 Группа компаний GSK или ее франчайзи.

Cor MW PT v7a