

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תקנירים) התשמ"ו-1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

סנווי® 75 מ"ג

סנווי® 150 מ"ג

טבליות מצופות

החומר הפעיל: החומר הפעיל הוא סולריאמפטול (solriamfetol).

סנווי® 75 מ"ג

כל טבילה מכילה 89.25 מ"ג סולריאמפטול הידרוכלורייד ששווה ל-75 מ"ג סולריאמפטול.

סנווי® 150 מ"ג

כל טבילה מכילה 178.50 מ"ג סולריאמפטול הידרוכלורייד ששווה ל-150 מ"ג סולריאמפטול.

לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר, אנא ראה פרק 6: "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סוף בטרכם תשמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי במצבם הרפואית דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

- סנווי מיועדת לשיפור ערנות ולהפחיתת ישנניות יתר במהלך שעות היום במטופלים בוגרים עם נרקולפסיה (עם או ללא קטפלקסיה).
- סנווי מיועדת לשיפור ערנות ולהפחיתת ישנניות יתר במהלך שעות היום (EDS) במטופלים בוגרים עם הפרעת נשימה חסימתית בשינה (OSA) אשר ישנן היתר במהלך שעות היום שלהם לא טיפולה בצורה מספקת באמצעות טיפול ראשוני להפרעת נשימה חסימתית בשינה, כדוגמת זרם אויר בלחץ חיובי מתמשך (CPAP).

קבוצה תרפואיית: חומרים פסикו-אנאლפטיים (מעוררים), סימפטומימטיים בעלי פעילות מרכזית.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל סולריאמפטול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה.
- היה לך התקף לב בשנה האחרונות.
- יש לך בעיות לב חריפות, כמו כאב בחזה שהופיע לאחרונה, או כאב בחזה שנמשך זמן רב יותר או חמור יותר מהרגיל, לחץ דם גבוה שאינו מבוקר כהלה באמצעות תרופות, דופק לא סדיר בצורה חריגה או בעיות לב חריפות אחרות.
- אתה לוקח תרופה הנקראית 'מעכבי' מונואמין אוקסידאז' (MAOI) לדיכאון או מחלת פרקינסון, או לקחת MAOI ב-14 הימים האחרונים.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

לפני הטיפול בסנווי, ספר לרופא אם יש לך או הי' לך:

- בעיות בריאות نفسית, כולל פסיכון (שינוי בתפישת המציאות) ושינויים קיצוניים במצב הרוח (הפרעה דו-קוטבית).
- בעיות לב, התקף לב או שbez.

- לחץ דם גבוה.
- אלכוהוליזם או כל שימוש לרעה בתרופות או תלוות.
- בעיה בעיניים הנקראת גלאוקומה צרת חזית.

ספר לרופא שלך או לרופק אם אחד המצביעים המציגים מעלה רלוונטיים לרפוי התחלת הטיפול. זאת כיוון שסנווי עשוי להחמיר חלק מהבעיות הללו. הרופא שלך ירצה לנטר כיצד התרופה משפיעה עליו.

סנווי לא מחליף את הטיפול הראשוני להפרעת נשימה חסימתית בשינה כדוגמה סיפאף. עליך להמשיך להשתמש טיפול זה בנוסף לסנווי.

ילדים וمتתגרים:

סנווי לא מומלץ בשימוש בילדים ומתתגרים מתחת לגיל 18. לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתcsiיר זה בילדים ומתתגרים.

אינטראקטיות/ תגבות בין תרופיות:

אם אתה לוקח, או אם לך תחת לאחרונה, **תרופות אחרות כולל תרופה ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרופק.** במיוחד אם אתה לוקח:

'מעכבי מונואמין אוקסידאז' (MAOI)' - אין לך תחת סנווי אם אתה לוקח תרופה הנקראת 'מעכבי מונואמין אוקסידאז' (MAOI)' כדיאון או מחלת פרקייסון, או לך תחת MAO-B-14 הימים האחרונים כיוון שנטיילת MAO עם סנווי עשויה להעלות את לחץ הדם שלך.

היוועץ עם הרופא שלך או הרופק אם אתה נוטל תרופות שעשוית להעלות את לחץ הדם שלך או קצב הלב שלך, או אם אתה לוקח חומרים דופמיגריים (למשל פרמיפקסול, לבודופה, מתילפנידאט) המשמשים לטיפול במחלת הפרקייסון, דיאון, תסמונת الرجل הקופצת (restless leg syndrome) והפרעת קשב, ריכוז והיפראקטיביות (ADHD).

שימוש בתרופה ומצון:

ניתן לך תחת סנווי עם אוכל או בין הארוחות.

הריאן, הנקה ופוריות:

המידע הנוגע לשימוש בסנווי בנשים בהריון היו מוגבל.

אם אתה בהריון או מניקה, חשוב שתאת עשויה להיות בהריון או מתכנת להיכנס להריון, היועצי ברופא שלך או ברופקטרם נטילת תרופה זו.

אין להשתמש בסנווי במהלך הריאן או בנשים פוריות שאינן משתמשות באמצוי מנעהיעלים.

סנווי עלול להיות מופרש לחלב אם. ההשפעה של סנווי על התינוק היונק או על ייצור החלב אינה ידועה. עליך להחליט יחד עם הרופא שלך האם להימנע מהנקה או להפסיק או להימנע מהטיפול בסנווי, תוך שיקול יתרונות ההנקה עבורך ועבור הילד שלך ויתרונות הטיפול עבורך.

יש לנטר תינוקות אשר נחשפו לsonovi במהלך ההנקה אודוות סימנים של אגיטציה, אינסומניה, והאתה בעליה במשקל.

נהיגה ושימוש במכוניות:

אתה עשוי לחשש מסוחרר או שיכולת הריכוז שלך עשויה להיפגע; יש לנתקט בזיהירות מרבית בעת נהיגה או שימוש במכוניות.

דבר עם הרופא שלך או הרופק אם אתה לא בטוח כיצד המצב הרפואי שלך או תרופה זו משפיעים עליו בהקשר לפעולות הדורשות תשומת לב, כגון נהיגה ושימוש במכוניות, בתחלת הטיפול או אם המנה שלך השתנתה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתcsiיר תמייד בהתאם להוראות הרופא.

עליך לבדוק עם הרופא או הרופק אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתcsiיר.

המיןון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

המיןון המקביל בדרך כלל הוא:

- עבור נרקלופסיה, הטיפול לרוב תחיל עם מנת של 75 מ"ס פעם ביום, ב�отוקר כאשר אתה קם. יתכן שחלק מהמטופלים יזקקו למנה התחלתית של 150 מ"ג. הרופא שלך ינחה אותך אם זה רלוונטי לך. הרופא שלך עשוי לרשותך לך מנת נמוכה יותר של 37.5 מ"ג. תוכל להשיג מנת זאת באמצעות נטילת חצי טבליה של 75 מ"ג. יש לשבור את הטבלייה באמצעות קו החציה.
- עבור הפרעת נשימה חסימתית בשינה, הטיפול לרוב מתחילה מנת של 37.5 מ"ג פעם ביום, בботוקר כשאתה קם. תוכל להשיג מנת זאת באמצעות נטילת חצי טבליה של 75 מ"ג. יש לשבור את הטבלייה באמצעות קו החציה.
- לאחר טיפול של לפחות 3 ימים, הרופא שלך עשוי להעלות את המנה הימית שלך למנה המתאימה ביותר.

המנה המומלצת המרבית של סנווי היא 150 מ"ג ליום.

אין לעבור על המנה המומלצת.

קשיים (מעל גיל 65)

קח את המנה הימית הרגילה אלא אם יש לך בעיות כליה (ראה מטה "מטופלים עם בעיות כליה").

מטופלים עם בעיות כליה

אם יש לך בעיות כליה יתכן שהרופא שלך יצטרך לשנות את המנה.

דרך מתן

סנווי היא לשימוש דרך הפה. יש לקחת סנווי בبوتוקר כאשר אתה קם.

ניתן לקחת סנווי עם אוכל או בין הארוחות.

כתישה/חציה/לעיסה

טבלייה של 75 מ"ג - ניתן לחצות באמצעות קו החציה על מנת ליטול מיןון של 37.5 מ"ג בהתאם להוראות הרופא. אין לכטוש/ללעoso.

טבלייה של 150 מ"ג - לא ניתן לחצות את הטבליות. אין לכטוש/ללעoso.

אם נטילת בטעות מיןון גבוהה יותר

אם נטילת יותר סנווי מהנדרש, היועץ ברופא שלך.

התסמינים הבאים זהוו כאשר מטופלים קיבלו 900 מ"ג (פ' 6 מהמנה הימית המרבית): תנעויות בלתי רצויות (דיסקינזיה מאוחרת) ותחושת עצבנות וחוסר יכולת להישאר במקום (אקטואיזציה). תסמינים אלה נעלמו כשהרופא השימוש בסנווי.

אם נטילת מנת יתר או אם בטעות בעלILD מן התרפופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית החולים הקרוב ביותר והבא אריזת התרפופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרפופה

אם שכחת ליטול תרפופה זו בזמן המועד, תוכל עדין ליטול אותה אם נותרו מעל ל-9 שעות עד לשעת השינה. אין ליטול מנת כפולה על מנת לפצוץ על המנה שנשכחה.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק את הטיפול בתרפופה ללא התיעצחות עם הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרפופה

היוועץ ברופא שלך לפני הפסיקת נטילת סנווי.

אין ליטול תרופות בחושר! בדוק את התווית והמנה **בכל פעע שהן נוטל תרופה**. הרכב משקפיים אם הנר זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה זו, הייעץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בסנוסי עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשותת תופעות הלואוי. יתכן ולא תסבול מכך אפילו אחת מהן.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common) - תופעות שימושיות ביותר משתמש אחד מעשרה

- כאבי ראש

תופעות לוואי שכיחות נורמלית (common) - תופעות שימושיות ב-1-10 משתמשים מתוך 100

- חרדה, קשיי שינה, עצבנות, סחרורת, תחושת מתה, העזת יתר
- דופק מהיר או לא סדר, נקרא גם פלפיטזיות, חוסר נוחות בחזה
- לחץ דם גבוה
- תחושת חול, שלשול, כאב בטן, עצירות, הקאות
- שיעול, הידוק או חריקת שניים, יובש בפה
- אובדן תיאבון

תופעות לוואי שאין שכיחות (rare) - תופעות שימושיות ב-1-10,000 משתמשים מתוך 1,000,000

- תחושת עצבנות, חוסר מנוחה, חוסר יכולת להתרכך, רעד
- עלייה בקצב לב הגבוה בהרבה מהרגיל
- קצר נשימה
- כאב בחזה
- צמא
- ירידת משקל

דוחות גם על פריחה בעור, סרפדת וגרד.

אם הופעה **תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא ציינה בעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.**

דיווח על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למ משרד הבריאות באמצעות לחיצה על ה קישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הביתי של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדוח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il> ועל ידי שליחת דואר אלקטרוני ליחידה לבטיחות מטופלים של בעל הרישום ב: drugsafety@neopharmgroup.com.

5. כיצד לאחסן את התרופה?

אריזת בליסטר: אחסון מתחת ל- 25°C .

בקופקים: אחסון מתחת ל- 25°C . יש לשמור את המיכל סגור היטב על מנת להגן מלחות. מרגע הפתיחה, יש להשתמש בתוך 120 ימים, לפחות מתחת ל- 25°C .

מנع הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים / או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מרופא.

אין להשתמש בתרופה לאחר תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.

אין להשליך תרופות למי הבוי או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח כיצד להיפטר מתרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלה יעזרו להגן על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Hydroxypropyl cellulose (HPC), Magnesium stearate (MgSt), Polyvinyl alcohol, Polyethylene glycol (Macrogol), Titanium dioxide, Talc, Yellow iron oxide.

כיצד נראה התרופה ומה תוכן הארץיה:

סנווֹי® 75 מ"ג

טבלייה מווארכת בצבע צהוב עד צהוב כהה/כתום עם הטבעה של "75" על צד אחד וקוו חצאיים בצד הנגדי.

סנווֹי® 150 מ"ג

טבלייה מווארכת בצבע צהוב עם הטבעה של "150" על צד אחד.

סנוי זמין באזיות בליסטר המכילות 7, 28 או 56 טבליות מצופות ובבקבוקים של 30 או 100 טבליות.
יתכן שלא כל גודלי הארץיות משוקקים.

יערן:

סילאטו סירוטי ייצור בע"מ, דבלין 2, מחוז דבלין, EK84 D02, אירלנד.

בעל רישום:

ニアופרム בע"מ, השילוח 6, ת.ד. 7063, פתח תקווה 4917001

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

סנווֹי® 75 מ"ג: 99-49-37284-99

סנווֹי® 150 מ"ג: 99-49-37285-172

עלון זה נבדק ואושר על ידי משרד הבריאות בנובמבר 2023.

לשם הפשטות ולהקלת הקראיה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.