

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة

(مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

لوتان 12.5، 50، 100 أقراص

التركيب:

يحتوي كل قرص من لوتان 12.5 على:

لوسارتان بوتاسيوم 12.5 ملغ

يحتوي كل قرص من لوتان 50 على:

لوسارتان بوتاسيوم 50 ملغ

يحتوي كل قرص من لوتان 100 على:

لوسارتان بوتاسيوم 100 ملغ

لقائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر الرجاء أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية" والفقرة 2.7 "معلومات هامة عن بعض مركبات لوتان".

اقرأ هذه النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.

- تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن لوتان. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.
- وُصف هذا الدواء للعلاج من أجدك، لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يُستعمل لوتان 12.5 ملغ، 50 ملغ و 100 ملغ لعلاج قصور القلب. يُستعمل لوتان 50 ولوتان 100 أيضاً لعلاج فرط ضغط الدم (ضغط دم مرتفع) ويساهمان في خفض الخطورة لحصول حوادث قلبية وعائية، مثل سكتة، لدى مرضى لديهم ضغط دم مرتفع وزيادة في سماكة البطين الأيسر (البطين الرئيسي) للقلب. لوتان 50 ولوتان 100 يوفران أيضاً حماية للكلية عن طريق إعاقة تفاعل مرض الكلى لدى مرضى السكري من نوع 2 الذي يترافق بإفراز بروتين في البول (بيلة بروتينية).
الفصيلة العلاجية: لوتان عبارة عن حاجب للمستقبل أنجيوتنسين II.

2) قبل إستعمال الدواء

2.1 لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألرجي) لـ لوسارتان أو لكل واحد من المركبات الأخرى لهذا الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").
- كنت حاملاً بما يزيد عن 3 أشهر (يُفضل أيضاً الإمتناع عن تناول لوتان في بداية الحمل - أنظر الفقرة 2.5، الحمل، الإرضاع والخصوبة).
- وجد لديك خلل شديد في وظيفة الكبد.
- وجد لديك سكري أو خلل في الأداء الوظيفي الكلوي وكت متعالجاً بدواء لخفض ضغط الدم يحتوي على الأيسكيريين.

2.2 تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع طبيبك، أو مع الصيدلي قبل تناولك للدواء.
من الواجب عليك إخبار طبيبك إذا كنت تعتقدن بأنك حامل (أو من شأنك أن تصبحي حاملاً)، لا يوصى بتناول لوتان في بداية الحمل ولا يجوز تناوله إذا كنت حاملاً أكثر من 3 أشهر، لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً للطفل إذا تم تناوله في هذه المرحلة (أنظري الفقرة 2.5، الحمل، الإرضاع والخصوبة).

قبل العلاج بـ لوتان من المهم إخبار الطبيب إذا:

- كان لديك سابقة لوزمة وعائية (إنتفاخ الوجه، الشفتين، الحنجرة و/أو اللسان) (أنظر أيضا الفقرة 4، "الأعراض الجانبية").
- كنت تعاني من كثرة التقيؤ أو الإسهال اللذين يؤديان إلى فقدان سوائل و/أو أملاح من جسمك بشكل حاد.
- كنت تتلقى مدرات بولية (أدوية تزيد من كمية الماء التي تطرحها عن طريق كليتيك) أو تخضع لنظام تغذية محدود الملح، الذي يؤدي إلى فقدان سوائل وأملاح من جسمك بشكل حاد (أنظر الفقرة 3 "كيفية إستعمال الدواء").
- علمت بأن لديك تضيق أو إسداد في الأوعية الدموية المؤدية إلى كليتيك أو إذا إجتزت عملية زراعة كلية مؤخرًا.
- وجد لديك خلل في وظيفة كبدك (أنظر الفقرتين 2.1 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" و- 3 "كيفية إستعمال الدواء").
- كنت تعاني من مشاكل في قصور القلب، مع أو بدون تضرر الكلى، أو بمشاركة إضطرابات خطيرة ومهددة للحياة في نظم القلب. يجب توخي الحذر خاصة عندما تكون مُتعالجاً في نفس الوقت بحاجب بيتا (β-blocker).
- وجدت لديك مشاكل في صمامات القلب أو في عضلة القلب.
- كنت تعاني من مرض قلبي إكليلي (الناجم عن نقص تدفق الدم في الأوعية الدموية للقلب) أو مرض دماغي وعائي (الناجم عن إنخفاض تدفق الدم في الدماغ).
- كنت تعاني من فرط الألدوستيرونيد الأولي (متلازمة مرتبطة بزيادة إفراز هرمون الألدوستيرون من قِبل الغدة الكظرية، الناجمة عن خلل في الغدة).
- كنت تتناول أياً من الأدوية التالية التي تُستعمل لعلاج إرتفاع ضغط الدم:
 - مثبط ACE (مثلاً: إنالابريل، ليزينابريد، راميبريل)، خصوصاً إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى لها علاقة بمرض السكري.
 - الأيسكيريين

من شأن طبيبك أن يفحص وظيفة الكلى لديك، ضغط الدم وكمية الشوارد الكهربائية (البوتاسيوم مثلاً) في دمك بفترات زمنية ثابتة.
أنظر أيضاً معلومات في الفقرة 2.1 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا".
• كنت تتناول أدوية أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (أنظر أيضاً معلومات في الفقرة 2.3 "التداخلات/التفاعلات بين الأدوية").

2.3 التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تتناول:

إحك لطبيبك إذا كنت تتناول إضافات البوتاسيوم، بدائل الملح الحاوية على بوتاسيوم، أدويةحافظة للبوتاسيوم مثل مدرات بول معينة (أميلوريد، تريامتيرين، سبيرونولاكتون) أو أدوية أخرى التي قد ترفع نسب البوتاسيوم في المصل (مثلاً، هيدريازين، أدوية تحتوي على تريبتوبريم)، حيث أن مشاركتها مع لوتان غير موصى به.
يجب الحذر خاصة إذا كنت تتناول الأدوية التالية خلال فترة العلاج بـ لوتان:
• أدوية أخرى لخفض ضغط الدم، لأنها قد تخفض أكثر من ضغط الدم لديك.
• قد ينخفض ضغط الدم أيضاً نتيجة لتناول واحد من الأدوية/مجموعة الأدوية التالية: مضادات الإنكثاب من نوع ثلاثية الحلقة، أدوية مضادة للذهان، باكوفين، أميفوستين.

• مضادات الإلتهاب الالاستيروئيدية - مثل إندوميثاسين، يشمل مثبطات COX-2 (أدوية التي تقلل من الإلتهاب والتي يمكن إستعمالها من أجل المساعدة في تخفيف الألم). لأنها قد تقلل من تأثير لوسارتان على خفض ضغط الدم.

من الجائز أن يضطر طبيبك إلى تغيير الجرعة الدوائية و/أو إتخاذ وسائل حذر أخرى: إذا كنت تتناول مثبط ACE أو الأيسكيريين (أنظر أيضاً معلومات في الفقرة 2.1 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا" وفي الفقرة 2.2 "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

إذا وجد لديك خلل في وظيفة الكلى، فإن الإستعمال المتزامن لهذه الأدوية قد يؤدي إلى تدهور في الأداء الوظيفي الكلوي.

لا يجوز تناول لوسارتان بمشاركة أدوية تحتوي على ليثيوم دون إشراف خثيث من قبل طبيبك. وسائل حذر خاصة (على سبيل المثال إجراء فحوص الدم) قد تكون مناسبة.

2.4 إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول لوتان مع أو بدون طعام.

يجب الإمتناع عن شرب عصير الجريب فروت أثناء تناول لوتان.

2.5 الحمل، الإرضاع والخصوبة

الحمل

أنت ملزمة بإبلاغ طبيبك إذا كنت تعتقدن بأنك حامل (أو من شأنك أن تصبحي حاملاً). سيوصيك طبيبك عادة بالتوقف عن تناول لوتان قبل أن تصبحي حاملاً أو في اللحظة التي علمت فيها بأنك حامل وسيوصيك بتناول دواء آخر بدلاً من لوتان. لا يوصى بتناول لوتان في بداية الحمل ولا يجوز تناوله إذا كنت حاملاً أكثر من 3 أشهر، لأنه قد يسبب ضرراً خطيراً للطفل إذا تم تناوله بعد الشهر الثالث للحمل.

الإرضاع

أخبري طبيبك إذا كنت مرضعة أو تخططين في البدء بالإرضاع. لوتان غير موصى به للأمهات المرضعات، ومن شأن طبيبك أن يختار لك علاجاً آخرًا إذا كنت معينة بالإرضاع. خاصة إذا كان طفلك مولود للثوم، أو ولد قبل الأوان.

يجب إستشارة طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء.

2.6 السباحة وإستعمال الماكينات

لا يتم إجراء أبحاث بخصوص التأثيرات على القدرة على السباحة أو تشغيل الماكينات. من غير المرجح أن يؤثر لوتان على قدرتك على السباحة أو تشغيل الماكينات. بالرغم من ذلك، وكما هو الحال مع العديد من الأدوية الأخرى التي تستعمل لعلاج إرتفاع ضغط الدم، فإن لوسارتان قد يؤدي إلى دوام أو نعاس عند بعض الأشخاص. إذا كنت تقاسي من دوام أو نعاس، فعليك إستشارة طبيبك قبل أن تحاول تنفيذ مثل هذه الأنشطة.

2.7 معلومات هامة عن بعض مركبات لوتان

تحتوي أقراص لوتان على لكتوز (لمحتوى اللكتوز، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية"). إذا قيل لك من قبل الطبيب أن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، إتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء.

أقراص لوتان تحتوي على بوتاسيوم (لمحتوى البوتاسيوم، أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائماً تناول لوتان بالخبيط كما قال لك الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً.

يحدد طبيبك الجرعة الدوائية ومدة العلاج.

يحدد طبيبك الجرعة الدوائية الملائمة من لوتان. مع الأخذ بعين الاعتبار حالتك وفيما إذا كنت تتناول أدوية أخرى. من المهم مواصلة تناول لوتان لاطالما وصفه لك طبيبك، من أجل الحفاظ على السيطرة على ضغط الدم لديك.

المرضى الكبار الذين يعانون من إرتفاع ضغط الدم

يبدأ العلاج عادة بإستعمال 50 ملغ لوسارتان (قرص واحد من لوتان 50) مرة في اليوم. من المفترض تحقيق التأثير الأعظم لخفض ضغط الدم بعد 3-6 أسابيع من بدء العلاج. لدى بعض المتعالجين قد يتطلب الأمر أحياناً إلى رفع الجرعة الدوائية من الدواء بعد ذلك إلى 100 ملغ من لوسارتان (قرص واحد من لوتان 100)، مرة في اليوم. إذا كان لديك انطباع بأن تأثير لوسارتان أقوى أو أضعف مما ينبغي، الرجاء عدم مع طبيبك أو الصيدلي.

المرضى الكبار الذين يعانون من ضغط دم مرتفع، سكري من نوع 2 وبرتوتين في البول يبدأ العلاج عادة بإستعمال 50 ملغ لوسارتان (قرص واحد من لوتان 50) مرة في اليوم.

لدى مرضى معينين هناك حاجة أحياناً إلى رفع الجرعة الدوائية للدواء إلى 100 ملغ لوسارتان (قرص واحد من لوتان 100)، مرة في اليوم، حسب تأثير الدواء على ضغط الدم.

بالإمكان تناول لوسارتان سوية مع أدوية أخرى لخفض ضغط الدم (مثلاً مدرات اللول، حاجبات قنوات الكالسيوم، حاجبات ألفا أو حاجبات بيتا ومستحضرات ذات فعالية مركزية)، وكذلك، أيضاً مع إنسولين وأدوية أخرى التي تستعمل بشكل شائع لخفض نسبة الجلوكوز في الدم (مثلاً، سولفونيل يوريا، جليتازون ومثبطات جلوكوكوزديان).

المرضى الكبار الذين يعانون من قصور القلب

يبدأ العلاج عادة بإستعمال 12.5 ملغ لوسارتان (قرص واحد من لوتان 12.5) مرة في اليوم. عادة، ينبغي زيادة الجرعة كل أسبوع، خطوة تلو الأخرى (مما يعني 12.5 ملغ لليوم خلال الأسبوع الأول، 25 ملغ لليوم خلال الأسبوع الثاني، 50 ملغ لليوم خلال الأسبوع الثالث، 100 ملغ لليوم خلال الأسبوع الرابع، 150 ملغ لليوم خلال الأسبوع الخامس) حتى الوصول إلى الجرعة الدوائية الداعمة التي حددها طبيبك. الجرعة الدوائية العظمى هي 150 ملغ (ثلاثة أقراص من لوتان 50 ملغ)، مرة في اليوم.

عند علاج قصور القلب، يُعطى لوسارتان غالباً بمشاركة مدر للبول (دواء الذي يزيد من كمية الماء التي تخرجها عن طريق كليتيك) و/أو ديجيتاليس (دواء الذي يساعد على تقوية وتحسين نجاعة عمل القلب) و/أو حاجب بيتا.

الجرعة الدوائية لدى فئات خاصة من المرضى

من شأن الطبيب أن يوصي بجرعة دوائية أقل، خاصة عند بدء العلاج لدى مرضى معينين، مثل هؤلاء الذين يتعالجون بجرعات دوائية عالية من المدرات البولية، لدى مرضى لديهم خلل في الكبد أو لدى مرضى تزيد أعمارهم عن 75 سنة. لا يجوز إستعمال لوسارتان لدى مرضى لديهم خلل خطير في الكبد (أنظر الفقرة 2.1 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا")

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

طريقة الإعطاء

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل مع كأس من الماء. عليك محاولة تناول الجرعة الدوائية اليومية الخاصة بك في نفس الوقت تقريباً من كل يوم. من المهم مواصلة تناول لوتان حتى يبرك الطبيب خلاف ذلك.

لوتان 12.5: لا يجوز شطر القرص.

لوتان 50: لوتان 100: عند الحاجة بالإمكان شطر القرص للإستعمال الفوري.

لا تتوفر معلومات بخصوص سحق أو مضغ القرص.

إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

أعراض فرط الجرعة الدوائية هي: إنخفاض ضغط الدم، تزايد النبض، من الجائز حدوث إنخفاض في النبض.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلغ طفلك بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول الجرعة الدوائية اليومية، فلا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة. تناول الجرعة الدوائية التالية في الموعد الإعتيادي وإستشر الطبيب.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

من المهم مواصلة تناول لوتان طالما يصف لك طبيبك للحفاظ على السيطرة على ضغط دمك.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك. إذا توفرت لديك أية أسئلة إضافية حول إستعمال هذا الدواء، إسأل الطبيب أو الصيدلي الخاص بك.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال لوتان قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

يجب التوقف عن إستعمال الدواء والتوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ القريبة إذا ظهر:

رد فعل تحسسي خطير (طفح، حكة، إنتفاخ الوجه، الشفتين، الفم أو الحنجرة التي قد تؤدي إلى صعوبة في البلع أو في التنفس). هذا عرض جانبي خطير لكنه نادر الذي يظهر بشيوع قدره 10-1 متعاطلين من بين 10,000. قد تحتاج إلى علاج طبي طارئ أو المبيت في المستشفى.

أعراض جانبية إضافية تم التبلغ عنها عند إستعمال لوتان:

شائعة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين 10):

دوار: ضغط دم منخفض (خاصة بعد حدوث تزايد في فقدان الماء من الجسم من داخل الأوعية الدموية، على سبيل المثال لدى مرضى لديهم قصور قلبي شديد أو يخضعون للعلاج بجرعات دوائية مرتفعة من المدرات البولية)؛ أعراض لإنخفاض ضغط الدم الإنشاصي المتعلقة بالجرعة الدوائية مثل، إنخفاض ضغط الدم الذي يظهر عند القيام من وضعية الإستلقاء أو الجلوس؛ إنهاك؛ إرهاق؛ إنخفاض نسبة السكر في الدم أكثر مما ينبغي (hypoglycemia)؛ إرتفاع نسبة اليوتاسيوم أكثر مما ينبغي في الدم (hyperkalemia)؛ تغيرات في وظيفة الكلية، بما ذلك قصور الكلى؛ إنخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)؛ إرتفاع اليوريا في الدم، الكرياتينين في المصل واليوتاسيوم في المصل لدى مرضى لديهم قصور قلبي.

غير شائعة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين 100 شخص):

ميل للنوم؛ صداع؛ إضطرابات في النوم؛ شعور بتزايد نظم القلب (خفقان)؛ ألم شديد في الصدر (angina pectoris)؛ ضيق التنفس (dyspnoea)؛ ألم في البطن؛ إسماع شديد؛ إسهال؛ غثان؛ قشور شرى (urticaria)؛ حكة (pruritus)؛ طفح؛ إنتفاخ موضعي (وذمة)؛ سعال.

نادرة (قد تؤثر على حتى شخص واحد من بين 1,000 شخص):

فرط الحساسية؛ وذمة وعائية؛ إتهاب الأوعية الدموية (إلتهاب وعائي، بما في ذلك Henoch-Schönlein purpura)؛ خدر أو الشعور بالوخز (paraesthesia)؛ إغفاء (syncope)؛ نبض سريع جداً وغير منتظم (رجفان أذيني)؛ سكتة؛ إتهاب الكبد (hepatitis)؛ إرتفاع في نسبة الألبانين أمينو ترانسفيراز في الدم (ALT)، الذي يزول عادة مع التوقف عن العلاج.

غير معروفة (لا يمكن تقدير الشيعو من المعلومات المتوفرة):

إنخفاض في عدد صفيحات الدم؛ شقيقة؛ إضطرابات في وظائف الكبد؛ آلام في العضلات والمفاصل؛ أعراض تشبه الإنفلونزا؛ آلام في الظهر وإلتهاب في المسالك البولية؛ زيادة في الحساسية للششم (photosensitivity)؛ آلام عضلية مجهولة السبب تتراقق بيول داكن (بولون الشاي) (rhabdomyolysis)؛ عجز جنسي؛ إتهاب البنكرياس (pancreatitis)؛ إنخفاض نسب الصوديوم في الدم (hyponatraemia)؛ إكتئاب؛ شعور عام غير جيد؛ رنين، أزيز، دوي أو ققطقة في الأذنين (طننين)؛ إضطراب في التذوق.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان التبليغ لشركة "يونيفارم.م.ص."

(5) كيفية تخزين لوتان؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال لوتان بعد إنتقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ إنتقضاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية وفي مكان محمي من الضوء.
- لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. إن إتخاذ هذه الإجراءات يساعد في الحفاظ على جودة البيئة.

(6) معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:

Lactose anhydrous; Microcrystalline cellulose; Pregelatinized starch; Magnesium stearate; Opadry white Y-1-7000.

يحتوي لوتان 12.5 على يوتاسيوم بالكمية التالية: 1.06 ملغ (0.027 ميلي - مكافئ).

يحتوي لوتان 50 على يوتاسيوم بالكمية التالية: 4.24 ملغ (0.108 ميلي - مكافئ).

يحتوي لوتان 100 على يوتاسيوم بالكمية التالية: 8.48 ملغ (0.216 ميلي - مكافئ).

يحتوي لوتان 12.5 على لكتوز بالكمية التالية: 25.1 ملغ.

يحتوي لوتان 50 على لكتوز بالكمية التالية: 100.4 ملغ.

يحتوي لوتان 100 على لكتوز بالكمية التالية: 200.8 ملغ.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

لوتان معبأ داخل لويحات (بليستر) داخل علبة كرتون. يوجد في كل علبة 10.7، 14، 15، 20، 28 أو 30 قرصاً. من الجائز ألا تتسوق كافة أحجام العلبة.

أقراص لوتان 12.5 هي مطلية، مستديرة، محدبة من كلا الجانبين، لونها أبيض.

أقراص لوتان 50 هي مطلية، مستديرة، محدبة من كلا الجانبين مع خط للشطر من جانب واحد، لونها أبيض.

أقراص لوتان 100 هي مطلية، بيضوية، محدبة من كلا الجانبين مع خط للشطر من جانب واحد، لونها أبيض.

إسم صاحب الإمتياز: يونيفارم م.ص. ب. 21429، تل أبيب، 6121301.

إسم المنتج وعنوانه: يونيفارم م.ص. ب. بارك الصناعة "مافو كرمل".

أرقام سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

لوتان 12.5: 137 93 31629 01

لوتان 50: 137 94 31630 01

لوتان 100: 139 36 31707 01

تم إعداده في كانون الثاني 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

من أجل سهولة وتهوية القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.