



עלון לצריכן לפי תקנות הרווקחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986
התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

רלבר אליפטה 92/22 מק"ג, אבקה לשאיפה

כלמנה המשחררת ממושך האליפטה מכילה:

92 מק"ג פלוטיקזון פורואט (22 מק"ג Fluticasone furoate) וילאנטרול (כטሪפנטאט)[Vilanterol (as trifenatate)].

רלבר אליפטה 184/22 מק"ג, אבקה לשאיפה

כלמנה המשחררת ממושך האליפטה מכילה:

184 מק"ג פלוטיקזון פורואט (22 מק"ג Fluticasone furoate) וילאנטרול (כטריינטאט)[Vilanterol (as trifenatate)].

לרשימת החומרים הבלטיים פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".
קרא בעיון את העلون עד סופו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווקת.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

רלבר אליפטה מכילה שני חומרים פעילים: פלוטיקזון פורואט ו- וילאנטרול. שני חזקים שונים של רלבר אליפטה זמינים: פלוטיקזון פורואט 92 מיקרוגרם/וילאנטרול 22 מיקרוגרם ופלוטיקזון פורואט 184 מיקרוגרם/וילאנטרול 22 מיקרוגרם.

החזק של 92/22 מק"ג משמש לטיפול סדייר במחלה ריאות חסימתית כרונית (COPD) במבוגרים, ובאסתמה במבוגרים ובמתבגרים מגיל 12 שנים ומעלה.

החזק של 184/22 מק"ג משמש לטיפול באסתמה במבוגרים ובמתבגרים מגיל 12 שנים ומעלה.

החזק של 184/22 מק"ג אינו מאושר לטיפול במחלה ריאות חסימתית כרונית (COPD). יש להשתמש ברלבר אליפטה בכל יום ולא רק כשיש לך בעיות נשימה או תסמינים אחרים של COPD ואסתמה. אין להשתמש בה כדי להקל על התקף פתאומי של קוצר נשימה או צפיפות. אם אתה חווית התקף מסווג זה, عليك להשתמש במושך המיעוד להקלת מהירה (כגון סאלבוטאמול). אם אין ברשותך מושך להקלת מהירה, צריך קשר עם הרופא.

קבוצה רפואיות:

וילאנטרול הוא אגוניסט לרצפטור בטא-2. פלוטיקאון פורואט הוא קורטיקוסטרואיד. פלוטיקאון פורואט שירט לשפחת תרופות הנקרת קורטיקוסטרואידים, לעיתים נקרת גם סטרואידים. קורטיקוסטרואידים מפחיתים דלקת. הם מפחיתים את הנפיחות והגירוי במעברי הנשימה הקטנים שבריאות וכן בהדרגה מקלים על בעיות נשימה.

קורטיקוסטרואידים מסוימים גם למניע התקפי אסתמה והחמרה של COPD.

וילאנטרול שירט לשפחת תרופות הנקרת מרחיבי סمفונוֹת ארכוי טווח. הוא מרפה את שריריהם שבמעברי הנשימה הקטנים שבריאות, ובכך עוזר לפתח את דרכי הנשימה ומקל על האויר להיכנס ולצאת מהריאות. כשהוא ניטל באופן סדייר, הוא עוזר למעברי הנשימה הקטנים להישאר פתוחים.

כשהה לוקח את שני החומרים הפעילים הללו יחד באופן סדייר, הם יסייעו לשלוט בקשי הנשימה שלך יותר מאשר כל אחד מהם בלבד.

אסתמה היא מחלת ריאות חמורה ארכוכ-טווח שבה שריריהם המקייפים את מעברי הנשימה הקטנים מתכווצים (*היצרות סمفונוֹת*) ונעשה נפוחים ומוגרים (דלקת). התסמינים באים והולכים וכוללים קוצר נשימה, צפופים, לחץ בחזה ושיתול. נצהה כי רלבר אליפטה מפחיתה התלקחות ותשミニים של אסתמה.

מחלת ריאות חסימתית כרונית (COPD) היא מחלת ריאות חמורה ארכוכ-טווח שבה דרכי הנשימה הופכות לדלקתיות ומעובות. התסמינים כוללים קוצר נשימה, שיתול, אי נוחות בחזה ושיתול עם ליחה. נצהה כי רלבר אליפטה מפחיתה התלקחות של תשミニ COPD.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לפלוטיקאון פורואט, לוילאנטרול או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (מפורט בסעיף 6).
- אתה סבור שהרשום לעיל מתיחס אליו, **אל תשמש ברלבר אליפטה עד שתתברר זאת עם הרופא.**

ازהירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול ברלבר אליפטה, ספר לרופא אם:

- יש לך מחלת כבד, שכן קיימת סבירות גבוהה יותר שתחולוה תופעות לוואי. אם יש לך מחלת כבד ביונונית או חמורה, הרופא יגביל את המנה שלך לחזק הנמור של רלבר אליפטה (92/22 מיקרוגרם פעם ביום).
- יש לך בעיות לב או לחץ דם גבוה.
- יש לך שחפת (TB) של הריאה, או זיהומים ממושכים או זיהומים שלאטופלו.
- אי פעם נאמר לך שיש לך סוכרת או רמת סוכר גבוהה בדם.

- יש לך בעיות בבלוטתthyroid).
 - יש לך רמת אשלגן נמוכה בدم.
 - אתה חווה טשטוש בראייה או הפרעות ראייה אחרות.
- ← בדוק עם הרופא לפני שאתה משתמש בתרופה זו אם אתה סבור שאחד מהלך מתייחס אליו.

בזמן שאתה משתמש ברלבר אליפטה

- קשיי נשימה מייד לאחר השימוש ברלבר אליפטה**
- אם אתה חווה לחץ בבית החזה, שיעול, צפופים או קוצר נשימה מייד לאחר השימוש במסאף רלבר אליפטה:
- ← הפסיק להשתמש בתרופה זו ופנה מיד לקבלת עזרה רפואי, לאחר שייתכן שאתה סובל ממצבי רפואי חמור הקריי ברונכוספאזם פרדוקסלי.
- פנה אל הרופא אם אתה חווה טשטוש בראייה או הפרעות ראייה אחרות.
 - פנה אל הרופא אם אתה חווה תחרשת צמא מוגברת, הטלת שתן תכופה או עייפות לא מוסברת (סימנים לרמת סוכר גבוהה בדם).

זיהום של הריאה

אם אתה משתמש בתרופה זו ל-COPD אתה עלול להיות בסיכון מוגבר לפתח זיהום של הריאות היידרואיד דלקת ריאות. ראה סעיף 4 למידע על התסמינים שעליך לשים לב אליהם בזמן שאתה משתמש בתרופה זו. ספר לרופא בהקדם האפשרי אם אתה מפתח אחד מהתסמינים האלה.

ילדים ומתבגרים
אין לתת תרופה זו לילדים מתחת לגיל 12 שנים לטיפול באסתמה, או לילדים ומתבגרים בכל גיל לטיפול ב-COPD.

אינטראקטיות/תגובה בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לקחת לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. אם אין לך מידע מה התרופה שלך מכילה, שוחח עם הרופא או הרוקח.

תרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן פעולתה של תרופה זו, או להעלות את הסבירות שהריאו לך תופעות לוואי. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות הקרניות חוסמי בטא, כגון מטופרולול, המשמשות לטיפול **בלחץ דם גבוה או בעיות לב**.
- קטוקונזול, לטיפול **בזיהומים פטרייטיים**.
- ריטונאביר או קויביסיטאט לטיפול **בזיהומים של HIV**.
- אגונייסטים אדרנרגיים ארוכי-טוחה לבטא-2, כגון סאלמטרול.

← ספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקה אחת מהתרופות האלה.
אם אתה נוטל אחת או יותר מן התרופות הללו, ייתכן כי הרופא ירצה לבצע מעקב קפדי
אחר מכך, כיוון שלאה עלולות להגבר את תופעות הלועאי של רלבר אליפטה.

הירין והנקה
אם את בהירין או מניקה, חושבת שיתכן שאתה בהירין או אם אתה מתכוון להרות,
התיעצי עם הרופא לפני השימוש בתרופה זו. אל תשתמשי בתרופה זו אם אתה בהירין אלא
אם הרופא אמר לך שאתה יכול.
לא ידוע אם מרכיבי תרופה זו יכולים לעבור לחלב אם. אם את מניקה, عليك לבדוק עם
הרופא לפני שתשתמשי ברלבר אליפטה. אל תשתמשי בתרופה זו אם אתה מניקה אלא אם
הרופא אמר לך שאתה יכול.

נהייה ושימוש במכונות
לא סביר שתרופה זו תשפי על יכולתך לנוהג או להשתמש במכונות.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
רלבר אליפטה מכילה קטוץ
אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך סיבות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני השימוש
בתרופה זו.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. عليك לבדוק עם הרופא או לרוקח
אם איןך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

אסטמה

המינון המקביל לטיפול באסתמה הוא שאיפה אחת (92 מ"ג של פלוטיקאוזן פורואט
ו- 22 מ"ג של וילאנטרול) פעם ביום באותו הזמן בכל יום.
אם יש לך אסתמה חמורה, הרופא עשוי לחייב שעליך להשתמש בשאייפה אחת מהמשאף
בחזק הגבולה יותר (184 מ"ג של פלוטיקאוזן פורואט ו- 22 מ"ג של וילאנטרול). גם mana
זו נלקחת פעם ביום באותו הזמן בכל יום.

COPD

המינון המקביל לטיפול ב- COPD הוא שאיפה אחת (92 מ"ג של פלוטיקאוזן פורואט
ו- 22 מ"ג של וילאנטרול) פעם ביום באותו הזמן בכל יום.
החזק הגבולה יותר של רלבר אליפטה (184 מ"ג פלוטיקאוזן פורואט ו- 22 מ"ג
וילאנטרול) אינם מתאימים לטיפול ב- COPD.
רלבר אליפטה מיועדת לשימוש בשאייפה דרך הפה.

אין לעבור על המנה המומלצת

השתמש בRELIEF ALIPTA באותו הזמן בכל יום מכיוון שהוא עיליה למשך 24 שעות חשוב ביותר שתשתמש בתרופה זו בכל יום, כדי שהונחית על ידי הרופא. זה יעזר להשאיר אותך ללא תסמים במשך כל היום והלילה.

אין לשמש בRELIEF ALIPTA כדי להקל על התקף פתאומי של קוצר נשימה או צפופים. אם אתה חווית התקף מסווג זה, עליך לשמש בשאך המועד להקלת מהירה (כגון סאלבוטאמול). אם אתה מרגיש שאתה סובל מקוצר נשימה או מצפופים לעיתים קרובות יותר מאשר מרגיל, או אם אתה משתמש בשאך להקלת מהירה יותר מאשר בדרך כלל, פנה לרופא.

כיצד לשמש בRELIEF ALIPTA
ראה "הוראות שימוש שלב אחר שלב" לאחר סעיף 6 בעلون זה למידע מלא. RELIEF ALIPTA מיועדת לשימוש בשאיפה דרך הפה. אין צורך להכין את משאך הרלבר ALIPTA בשום דרך מיוחדת, גם לא בפעם הראשונה שאתה משתמש בו.

אם התסמים שלך לא משתפרים
אם התסמים שלך (קוצר נשימה, צפופים, שיעול) לא משתפרים או מחמירים, או אם אתה משתמש בשאך המועד להקלת מהירה לעיתים קרובות יותר:
← פנה לרופא בהקדם האפשרי.

אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר
אם נטלה בטעות מינון גבוהה יותר של RELIEF ALIPTA מכפי שהנחה אותה הרופא, פנה לרופא או לרוקח. אם ניתן, הראה להם את המשאך, את האריזה או עلون זה. ניתן שתרגיש שליבך פועם מהר יותר מאשר מרגיל, שאתה מרגיש לא יציב או שיש לך כאב ראש.
אם נטלה יותר מכפי שהונחית במשך זמן רב, חשוב במיוחד שתפנה לרופא או לרוקח לקבלת ייעוץ. זאת מכיוון שמנות גדלות יותר של RELIEF ALIPTA עלולה להפחית את כמות ההורמוניים הסטרואידים המיוצרים באופן טבעי בגוף.
אם נטלה מנת יתר או אם בטעות נטלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים ורבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול את התרופה
אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, אל תשאך ממנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכח. קח את המנה הבאה בזמן הרגיל.
אם אתה נעשה קצר נשימה או מתחילה לצפוף או מפתח תסמים אחרים של התקף אסתמה, השתמש בשאך שלך המועד להקלת מהירה (כגון סאלבוטאמול), לאחר מכן פנה לקבלת ייעוץ רפואי.

אל תפסיק להשתמש בRELIEF ALIYAH ללא ייעוץ יש להתמיד בטיפול כפי שהוא מומלץ על ידי הרופא. התגובה תהיה עיליה רק כל עוד אתה משתמש בה. אל תפסיק את הטיפול גם אם אתה מרגיש טוב יותר אלא אם הרופא הורה לך על כך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהנרכ נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנרכ זקוק להם. אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בRELIEF ALIYAH עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מכך מרהן.

תగובות אלרגיות

תגובות אלרגיות הן נדירות (עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים). אם אתה חווה אחד מההתקנים הבאים לאחר נטילת RELIEF ALIYAH הפסיק לחת תרופה זו וספר לרופא באופן מיידי:

- פריחה בעור (חרפת - גבושיםות מגדרות) או אדמומיות
- נפיחות, לפעים של הפנים או של הפה (אנגיואדמה)
- אתה עלול לצפצף מאוד, להשתעל או שייריו לך קשיי נשימה
- הרגשת חולשה או סחרחות באופן פתאומי (מה שיכול להביא להתרומות או לאובדן ההכרה)

קשיי נשימה מיד לאחר השימוש בRELIEF ALIYAH

קשיי נשימה מיד לאחר השימוש בRELIEF ALIYAH הם נדירים.

אם הנשימה או הצפופים שלך מחרמים מיד לאחר השימוש בתרופה זו, הפסיק להשתמש בה ופנה לקבלת סיוע רפואי מייד.

פנאומוניה - דלקת ריאות (זיהום של הריאות) (תופעת לוואי שכיחה, עלולה להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים)

ספר לרופא אם אתה חווה אחד מה הבאים בזמן השימוש בRELIEF ALIYAH - ייתכן שאתה תסמנים של זיהום בריאה:

- חום או צמרמורת
- ייצור מוגבר של ליחה, שינוי בצבע הליחה
- שיוך מוגבר או קשיי נשימה מוגברים

תופעות לוואי נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ- 1 מכל 10 אנשים:

- כאב ראש
- הצטננות

תופעות לוואי שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 10 אנשים:

- כתמים בולטים וכואבים בפה או בגרון שנגרמים מזיהום פטרייתית (קנדידיאזיס). שטיפת הפה שלך בימים מיד לאחר שימוש ברלבר אליפטה עשויה לסייע לעצור את התפתחות תופעת לוואי זו.

דלקת סمفונות (ברילונכיטיס)

- זיהום של הסינוסים באף או בגרון
- שפעת

כאב וגירוי בחלק האחורי של הפה והגרון

- דלקת של הסינוסים

- אף מוגדר, נוחל או סתום

- שיעול

הפרעות בקול

החלשות של העצמות, המובילה לשברים

- כאב בטן

- כאבגב

- חום גבוה

- כאבי פרקים

התכווצויות שריריים

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 100 אנשים:

- דופק לא סדייר
- ראייה מטושטשת
- עלייה ברמת הסוכר בدم (היפרגליקמיה)

תופעות לוואי נדירות

אליה עלולות להופיע ב- עד 1 מכל 1,000 אנשים:

- הלב פועם מהר יותר (טכיקרדיה)
- פעימות לב מורגשות (פלפיטציות)
- רעד
- חרדה

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי חמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעلون, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המוקון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה ל קישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידם וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעללה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך הת滂גה (exp. date) המופיע על גבי הארץ, המגשית והמשאף. תאריך הת滂גה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- יש לאחסן את המשאף בארץ המקורי כדי להגן מלחות ולהוציאו רק מיד לפני השימוש הראשוני. אין לפתח את המגשית עד לתחילת השימוש. ניתן להשתמש בשאף עד 6 שבועות ממועד פתיחת המגשית לראשונה אך לא יותר מאשר הת滂גה. בעת הוצאת המשאף מהמגשית, יש לכתוב על גבי התוויות האחוריות של המשאף והאריזה, במקום המועד לכך, את התאריך האחרון לשימוש המשאף.
- אין לאחסן מעל 25°C .
- אם אתה מאחסן את המשאף במקרר, הנח למשאף לחזור לטמפרטורת החדר לשמשך לפחות שעה לפני השימוש.
- אין להשליך תרופות לבזבז או לפסולת הביתיית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, magnesium stearate.

ראה גם סעיף 2 - "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרכופה".

- **כיצד נראה התרכופה ומה תוכן הארץיה:**

רלבר אליפטה היא אבקה המיועדת לשאייה. משאף האליפטה עצמה מורכב ממשאף פלסטיק אפור בהיר עם מכסה פיה בצלב תכלת וסופרמנה. הוא ארוז בмагשิต אלומיניום עם כיסוי אלומיניום הנitinן להסרה. המגשิต מכילה **שקייק סופח לחות** להפחחת הלחות בארץיה. ברגע שפתחת את הכסוי של המגשיט, זורק את השקייק סופח הלחות - אל תאכל או תשאף אותו. אין צורך לשמור את המשאף בмагשิต האלומיניום מהרגע שהוא נפתחה.

אריזות רלבר אליפטה כוללות משאף אחד המכיל 14 מננות (המספיקות ל-14 ימי טיפול) או 30 מננות (המספיקות ל-30 ימי טיפול).
יתכן שלא כל גדרי הארץיה משוקקים.

- **בעל הרישום: גלקסוסמיטקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.**

- **יצרן: גלקסו אופוריישנס UK בע"מ (גלקסו וולקם אופוריישנס), וור, אנגליה.**

- **מספר רישום התרכופות בפנקס התרכופות הממלכתי במשרד הבריאות:**

רלבר אליפטה 92/22 מק"ג: 151-45-33982


רלבר אליפטה 184/22 מק"ג: 151-46-33981

- **לשם הפשטות ולהקלת הקירהה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרכופה מיועדת לבני שני המינים.**

הוראות שימוש שלב אחר שלב מהו משאף האליפטה?

בפעם הראשונה שאתה משתמש ברלבר אליפטה אתה לא צריך לבדוק שהוא עובד כראוי, ואתה לא צריך להכין אותו לשימוש בשום דרך מיוחדת. פשוט עקוב אחר ההוראות שימוש שלב אחר שלב אלה.

אריזת משאף רלבר אליפטה שלר מכילה:



המשאף ארכז בмагשית. אל תפתח את המגשิต עד שתהייה מוכן להתחילה לשימוש בתרוופה שלך. כאשר אתה מוכן לשימוש במשאף, יש לקלף את כיסוי האלומיניום לאחר מכן בצד ימין לפתח את המגשיט. המגשיט כולל **שקיק סופח לחות**, להפחחת הלחות. זרוק שקיק זה - אין לפתח, לשאוף או לאכול אותו.



כשהת מוציא את המשאף מהמגשיט שלו, הוא יהיה במצב ה'סגור'. אל תפתח אותו עד שתהייה מוכן לשאוף מנה של תרוופה.

בפתיחה המגשיט יש לכתוב על גבי התווית האחורי של המשאף והאריזה, במקום המופיע לך, את התאריך האחרון לשימוש במשאף. התאריך האחרון לשימוש הוא 6 שבועות מהתאריך שבו פתחת את המגשיט לראשונה, אך לא יותר מאשר התגובה. לאחר תאריך זה, אין לשימוש יותר במשאף. ניתן להשאיר את המגשיט לאחר הפתיחה הראשונה. אם אתה מאחסן את המשאף במקרר, הניח למשאף לחזור לטמפרטורת החדר לפחות למשך שעה לפני השימוש.

הוראות השימוש במשאף המפורטים להלן יכולות לשמש עבור המשאף המכיל 30 מנוגות (המספיקות ל- 30 ימי טיפול) או 14 מנוגות (המספיקות ל- 14 ימי טיפול).

1. קרא מיד זה לפני שתתחליל

אם אתה פותח וסגור את המכסה מבלי לשאוף את התרוופה, אתה ת Abed את המנה.

- המנה האבודה תשמיר באופן בטוח בתוך המשאף, אך לא תהיה זמינה עוד.


בלתי אפשרי לחתך בטיעות מנה ועודפת או מנה כפולה בשאיפה אחת.



2. הcken מנה

המתן עם פתיחת המכסה עד שאתה מוכן לחת את המנה שלך. אל תנער את המשאף.

- החלק את המכסה כלפי מטה עד שתשמעו "קליק".



הרתופה שלך כעת מוכנה לשאיפה.

סופר המנה סופר לאחור ב- 1 לאישור.

- אם סופר המנה לא סופר לאחור כשאתה שומע את ה"קליק", המשאף לא ישחרר תרופה. חוזור לרוקח לקבלת ייעוץ.

3. שאף את התרוופה שלך


- בזמן שאתה אוחז את המשאף הרחק מפייך, נשופף החוצה עד כמה שאתה יכול.
 - אל תנסורף לתוכה המשאף.
- שים את הפיה בין שפטיר וסגור את שפטיר בחזקה סביב.
 - אל תחסום את פתח האויר באצבעותיך.



- קח שאיפה אחת ארוכה, עמוקה ואחדידה פנימה. עזרו נשימה זו לזמן ארוך ככל האפשר (לפחות 3-4 שניות).
- הוציא את המשאף מפייך.
- נשופף החוצה לאט ובעדינות.
- ייתכן שלא תוכל לחוש בטעם או להרגיש את התרוופה, אפילו כאשר אתה משתמש נכון במשאף.
- אם ברצונך לנוקות את הפיה, השתמש בטישו יבש, לפני שאתה סגור את המכסה.

4. סגור את המשאף ושטוף את פיך

- החלק את המכסה כלפי מעלה ככל שניתן, כדי לכסות את הפיה.



- **שטוֹפְ אֶת פִּיר בַּמִּים לְאַחֲרֵ שָׁהַתְמָשָׂת בְּמִשְׁאָפָּ, אֶל תְּבָלָע.**
זה יקטין את הסבירות לכך שתפתח כאב בפה או בגרון כתופעות לוואי.

נערך בספטמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינותו של קבוצת החברות של GSK.
© 2023 קבוצת החברות של GSK או הזכין שלה.

Relv PT v12D