

نشرة المستهلك وفقاً لأنظمة الصيادلة (المستحضرات) لعام 1986

يُسوق هذا الدواء تبعاً لوصفة طبيب فقط

رفالسال® 1 غرام انديما

رفالسال® 4 غرام انديما

المادة الفعالة:

تحتوي كل حقنة شرجية من رفالسال 1 غرام على: 1 غرام من ميسالازين (mesalazine) تحتوي كل حقنة شرجية من رفالسال 4 غرام على: 4 غرامات من ميسالازين (mesalazine). تدعى المادة الفعالة أيضاً ميسالامين (mesalamine) أو حمض 5 الأمينosalيسيليك (5-aminoosalicylic acid). معاينة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6. وانظر أيضاً "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في البند 2.

اقرأ النشرة بامكانك حتى نهايتها قبل استخدامك للدواء.
تضمن هذه النشرة معلومات ملخصة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فراجع الطبيب أو الصيدلي.
وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطه للأخرين. قد يضرهم الدواء حتى إذا بدا لك أنّ مرضهم مشابه.

1. لأي غرض خصص هذا الدواء؟

الدواء مخصص لعلاج التهاب القولون التقرحي (ulcerative colitis) ومرض كرون والوقاية من هاتين الحالتين.
الفصيلة العلاجية: دواء مضاد للالتهاب من فئة الساليسيلات.

2. قبل استخدام هذا الدواء منع استخدام هذا الدواء:

- إذا كنت حساساً (كانت لديك أرجية) للمادة الفعالة، لحمض الساليسيليك، للساليسيلات مثل حمض الأسيتيل ساليسيليك (الأسبيرين)، أو لأي واحد من المركبات الأخرى التي يحتوي عليها المستحضر (المعاينة قائمة بالمركبات الأخرى، انظر البند 6).
- إذا كنت تعاني من خلل خطير في وظيفة الكبد أو الكليتين.

تحذيرات خاصة تتعلق باستخدام الدواء:

قبل البدء بالعلاج بالدواء (وخلاله)، أخبر الطبيب إذا:

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من مشاكل في الرئة، وبخاصة إذا كنت تعاني من الربو (القصبي).
- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من التحسّس تجاه مادة تسمى سولفاسالازين (sulphasalazine) وهي مادة مرتبطة بالمادة الفعالة ميسالازين.
- في هذه الحالة من الضروري أن تخضع للمراقبة الطبية عن كثب. (إذا نشأت أعراض حادة لعدم التحمل، على سبيل المثال: أوجاع البطن أو التشنجات في البطن، الحمى، الصداع الخطير، الطفح الجلدي - فيتعين إيقاف العلاج حالاً).
- كنت تعاني أو قد عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد.
- كنت تعاني أو قد عانيت في الماضي من مشاكل في الكليتين.
- إذا نشأ لديك في الماضي الطفح الجلدي الخطير أو نقشر الجلد، النفطات و/أو التقرّحات في الفم في أعقاب استخدام الأدوية المحتوية على ميسالازين (المادة الفعالة في رفالسال).

من شأن المادة الفعالة (ميسالازين) أن تغير لون البول إلى الأحمر-بني عند التماس مع مادة التبييض هيبوكلوريت الصوديوم، مثلاً عند التماس مع مياه المرحاض. ذلك بسبب حدوث تفاعل كيميائي لا يؤذى متألق العلاج.

التحذيرات الأخرى:

- خلال العلاج بالدواء، قد يقرّر الطبيب إخضاعك للمتابعة الطبية عن كثب (انظر "الفحوص والمتابعة").
- عند استخدام الدواء قد تتشكل حصى الكليتين. قد تشمل الأعراض آلاماً في جنبي البطن ودمًا في البول. يجب الموااظبة على شرب ما يكفي من السوائل خلال العلاج بالدواء.
- قد تم الإبلاغ عن نشوء ردود الفعل الجلدية الخطيرة، بما فيها متلازمة Drug Reaction with Eosinophilia and Systemic (DRESS)، وهي متلازمة التفاعل الدوائي المصحوب بكثرة الحمضات والأعراض الجهازية، ومتلازمة ستيفنس-جونسون (SJS) وتتشّر الأنسجة المتموّنة البشرية التسمّي (Toxic Epidermal Necrolysis)، المرتبطة بالعلاج بميسالازين. توّقف عن استخدام الدواء وراجع الطبيب حالاً إذا لاحظت ردود الفعل الجلدية الخطيرة هذه (لقراءة وصف مفصل للأعراض، انظر البند 4، "الأعراض الجانبية").

الأطفال والمراهقون: لا تتوفر خبرة واسعة فيما يخص علاج الأطفال الدواء لدى الأطفال والمراهقين ممن تتراوح أعمارهم ما بين 6 و18 سنة تبعاً لتعليمات الطبيب، الذي سيحدّد العلاج استناداً إلى حالتهم وزنهم.

الفحوص والمتابعة: قبل البدء بالعلاج وخلاله قد تضطر إلى إجراء فحوص البول، الدم وفحوص لوظائف الكبد والكلويتين.

التفاعلات الدوائية: إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية المصرفية بدون وصفة طبيب والإضافات الغذائية، فأخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك. ويجب على وجه التحديد إخبار الطبيب أو الصيدلي إذا كنت تتناول الأدوية التالية (ويجدر الذكر أن القائمة الواردة فيما يلي تشير إلى المواد الفعالة في الأدوية. وفي حال كنت غير متأكداً مما إذا كنت تستخدِم أحد هذه الأدوية فالرجاء استشارة الطبيب أو الصيدلي):

- أدوية معينة تعمل على منع تخثر الدم (مثل وارفارين).
- أزيثوبرين، 6-مر كابتوبورين، تيوغوانين (الأدوية المستخدمة لعلاج اضطرابات الجهاز المناعي).

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً، نظلين أنك حامل، تخططين للحمل، أو ترضعين طفلاً، فيجب عليك استشارة الطبيب قبل استخدام الدواء.

- **الحمل:** لا يتوفّر ما يكفي من المعلومات عن استخدام رفاسال لدى النساء الحوامل. يمكن استخدام رفاسال خلال فترة الحمل فقط بقرار من الطبيب وتبعاً لإرشاداته.

- **الإرضاع:** لا يتوفّر ما يكفي من المعلومات عن استخدام رفاسال لدى النساء المرضعات. ينتقل الدواء عبر حليب الأم. قد تنشأ ردود فعل فرط الحساسية مثل الإسهال لدى الطفل الرضيع. لهذا السبب يمكن استخدام رفاسال فقط بقرار من الطبيب وتبعاً لإرشاداته. إذا سمح لك الطبيب بالإرضاع ونشأ إسهال لدى طفلك فتوقف عن الإرضاع.

قيادة السيارة واستخدام الماكينات: من غير المتوقع أن يؤثّر استخدام الدواء في القدرة على قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

- تحتوي الحقنة الشرجية على بنزوات الصوديوم (60 ملг في القارورة)، التي قد تسبّب تهيجاً موضعيّاً.
- تحتوي الحقنة الشرجية على ميتابيسيلفيت البوتاسيوم (281 ملг في القارورة)، التي قد تسبّب في حالات نادرة ردود فعل الحساسية المفرطة والتشنج القصبي.
- تحتوي الحقنة الشرجية على البوتاسيوم (حوالي 200 ملг في القارورة). يجب الانتباه إلى حالة المرضى المصابين بنقص الوظائف الكلوية أو المرضى الذين يتقدّدون بنظام غذائي لتحديد استهلاك البوتاسيوم.
- تحتوي الحقنة الشرجية على الصوديوم (حوالي 27 ملг في القارورة). تشكّل هذه الكمية ما يقارب 1.4% من الاستهلاك اليومي الأقصى الموصى به للبالغين، وهو غرامين.

3. كيف تستخدم هذا الدواء؟

يُتوجّب الاستخدام دائمًا وفق إرشادات الطبيب. وعليك استشارة الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكون متأكداً من الجرعة الدوائية ومن كيفية العلاج بالدواء.

الجرعة المتبعة عادة هي: الجرعة الدوائية وطريقة العلاج ومدتها يحدّدها الطبيب فقط. سيقوم الطبيب بملاءمة الجرعة الدوائية لك شخصياً استناداً إلى حالتك واستجابتك للعلاج وستجرى لهذا الغرض الفحوص الدورية وستخضع للمتابعة الطبية الدورية.

يجب استخدام الحقنة الشرجية قبل الخلود إلى النوم إلا إذا أمر الطبيب بخلاف ذلك.

يجب استخدام هذا الدواء في الأوقات المنتظمة التي حدّدها الطبيب المعالج
ممنوع تجاوز الجرعة الموصى بها.

انتبه:

ممنوع البلع! هذا الدواء مخصوص للاستخدام عبر الشرج.
يجب خصّه جيداً قبل الاستخدام.

طريقة الاستخدام: انظر تعليمات الاستخدام والرسوم التوضيحية في البند 7.

إذا تناولت خطأً جرعة دوائية أكبر:

- إذا استخدمت بالخطأً جرعة أكبر فراجع طبيبك كي يعطيك المشورة حول ما يتعين عليك فعله.
- إذا قام طفل أو شخص ما ببلع الدواء خطأً، فيجب التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وإحضار علبة الدواء.

إذا نسيت استخدام الدواء: إذا نسيت استخدام الحقنة الشرجية في الوقت المحدد لذلك، فاستمرر بالعلاج بالجرعة الدوائية المحددة. لا يجوز استخدام جرعة أكبر عوضاً عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصيات الطبيب. كي تستفيد من الدواء قدر المستطاع، يتعين عليك تناوله بانتظام خلال الفترات التي تعاني فيها من الالتهاب وأيضاً كعلاج واقٍ خلال فترات الهدأة.

إذا توقفت عن استخدام الدواء: من غير المُحبذ التوقف عن استخدام الدواء بشكل فجائي.

حتى إذا تحسنت حالتك الصحية، فلا يجوز إيقاف العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

لا يجوز استخدام أو تناول الأدوية في **الظلم!** تتحقق من محتوى الملصق والجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء.

ضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

وإذا كانت لديك أسئلة إضافية حول استخدام الدواء، فاستشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

مثل أي دواء، قد يؤدي استخدام رفاسال على هيئة الحقنة الشرجية إلى نشوء أعراض جانبية عند بعض المستخدمين. لا تقلق عند قراءة قائمة الأعراض الجانبية وذلك لأنك قد لا تعاني من أي منها.

أوقف العلاج وراجع الطبيب حالاً في الحالات الآتية:

- ردود الفعل الأرجعية العامة: قد تشمل أعراض رد الفعل الأرجعي ما يلي: الحمى، الطفح الجلدي، آلام المفاصل وأو صعوبات التنفس. متلازمة الذبحة الحمامية أو الالتهاب العام في المعي الغليظ (الذي يسبب الإسهال الخظير وأو أوجاع البطن الخطيرة). ردود الفعل هذه نادرة جداً.

الشعور العام السيء (تدور صحتك العامة)، خصوصاً الحالة المصحوبة بالحمى وأو الآلام في الفم وأو الحلق. في أحيان نادرة جداً قد تدل هذه الأعراض على انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (ندرة المحببات)، الحالة التي قد تزيد من عرضتك للإصابة بالتلويث الخطير. وقد تتأثر أنواع أخرى من خلايا الدم (مثل الصفيحات الدموية أو كريات الدم الحمراء، الحالة التي قد تسبب فقر الدم اللاتنسجي أو قلة الصفيحات الدموية) الأمر الذي قد يتسبب في أعراض مثل النزيف المجهول السبب، البقع البنفسجية أو البقع تحت الجلد وفقر الدم (الشعور بالتعب، الضعف والمظاهر الشاحب، تحديداً في الشفتين والأظافر). بالإمكان إجراء فحص للدم للتحقق مما إذا نتجت هذه الأعراض من تأثير الدواء على دمك. ردود الفعل هذه نادرة جداً.

- ردود الفعل الجلدية الخطيرة، مثل: البقع الصاربة إلى الحمرة، غير المرتفعة، المستديرة أو بقع توجد نقطة وسط كل واحدة منها، أحياناً كثيرة توجد أيضاً نفطات وسط كل واحدة منها، تفترس الجلد، التقرّرات في الفم، في الأنف، في العينين، الطفح الجلدي المنتشر، الحمى الشديدة وتتضخم الغدد الليمفافية. قد تسبّب ردود الفعل الجلدية الخطيرة هذه أعراض الحمى والإإنفلوانزا. انظر أيضاً "التحذيرات الأخرى" في البند 2. وتحث هذه الأعراض لدى عدد غير معروف من متألق العلاج (بوتيرة غير معروفة).
- آلام الصدر، ضيق التنفس، أو تورّم الأطراف، مما قد يدلّ على ردود فعل فرط الحساسية في القلب (بما في ذلك التهاب عضلة القلب أو غشاء القلب). ردود الفعل هذه نادرة.
- مشاكل في الأداء الكلوي (قد تحدث في أحيان نادرة جداً)، مثل تغيير لون البول أو تغيير كثافة البول التي يتم إنتاجها وتورّم الأطراف أو الألم الجانبي في منطقة الخصر (المتبّع عن حصى الكلى)، الحالة التي تحدث لدى عدد غير معروف من متألق العلاج (بوتيرة غير معروفة).

الأعراض الجانبية الأخرى:

الأعراض الجانبية الشائعة (الأعراض التي تظهر لدى 10-1 مستخدمين من أصل 100):

- الطفح الجلدي، الحكة

الأعراض الجانبية النادرة (الأعراض التي تظهر لدى 1-10 مستخدمين من أصل 10000 مستخدم):

- أوجاع البطن، الإسهال، الغازات (انتفاخ البطن)، الغثيان، التقيؤ، والإمساك.
- الصداع والدوار.

• الحساسية للضوء، مما يعني زيادة حساسية الجلد للشمس وللأشعة فوق البنفسجية (UV).

الأعراض الجانبية النادرة جداً (الأعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من أصل 10000 مستخدم):

- التهاب البنكرياس، الحالة التي قد تتمثل في ألم البطن الشديد.

رد الفعل الأرجعي وأو الالتهابي في الرئتين، والذي قد ينعكس في أعراض عدة ومنها ضيق التنفس، السعال، الأريز خلال التنفس، وظهور ظل في الرئتين عند تصويرهما بالأشعة السينية.

• الآلام العضلية وأو آلام المفاصل.

• اختلال وظيفة الكبد وأو تدفق الصفراء، مما قد يسبب أوجاع البطن وأو اليرقان (الحالة التي قد تتمثل في اصفرار الجلد وبياض العين).

مشكل في وظائف الكبد (بما فيها التهاب الكبد وارتفاع مستويات إنزيمات الكبد).

تساقط الشعر والصلع.

عدم الإحساس والشعور بالوخزات في اليدين والساقيين (اعتلال الأعصاب المحيطي).

انخفاض مستوى إنتاج الحيوانات المنوية القابل للعكس.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية، أو إذا كنت تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، فيجب عليك استشارة الطبيب.

بإمكان إبلاغ وزارة الصحة عن أعراض جانبية بالضغط على الرابط "الإبلاغ عن أعراض جانبية عقب العلاج الدوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يوجه إلى الاستمارة المتصلاة للإبلاغ عن الأعراض الجانبية، أو عن طريق الدخول إلى الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيف يجب تخزين الدواء؟

- امن التسمم! هذا الدواء، وأي دواء آخر، يجب الاحتفاظ به في مكان مغلق بعيداً عن مرأى ومتناول أيدي الأطفال و/أو الأطفال الرضع، وهذا ستنعنه التسمم. لا تسبب التقليق بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- يُمنع استخدام الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الوارد على العلبة. ويشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من الشهر ذاته.
- ظروف التخزين: يجب تخزين الدواء بدرجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة إلى المادة الفعالة على الآتي:

Potassium metabisulfite, potassium acetate, xanthan gum, sodium benzoate, disodium edetate, carbomer 934P, purified water.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة؟




معلق لونه بيج/بني فاتح في قنينة قابلة لل Heraeus.

تحتوي كل علبة على 7 حقن شرجية تحتوي كل واحدة منها على 60 غراماً.

7. تعليمات استخدام الحقنة الشرجية:

يمكن الحصول على أفضل نتائج عند استخدام الحقنة الشرجية بعد عملية تفريغ الأمعاء مباشرة.

- (1) تحضير المستحضر للاستخدام:
 - أ. يجب خصم القنينة جيداً لضمان تجفاف السائل.
 - ب. يجب نزع الغطاء الواقي عن المطابق والإمساك بعنق القنينة لمنع التسرب (الرسم التوضيحي 1).
- (2) الوضعية الصحيحة للجسم:
 - أ. يمكن الحصول على أفضل نتائج عند الرفود على الجانب الأيسر من الجسم بحيث تكون الرجل اليسرى ممدودة مستقيمة والرجل اليمنى متثنياً إلى الأمام حفاظاً على التوازن (الرسم التوضيحي 2a).
 - ب. الخيار الثاني هو وضعية "الركبتين - الصدر" (الرسم التوضيحي 2b).
- (3) إعطاء الحقنة الشرجية:
 - أ. نظف وجفف منطقة المستقيم (الشرج) جيداً.
 - ب. يجب إدخال المطابق بلطف، بعد أن تم تزيينه، في الشرج (المستقيم) باتجاه السرة.
 - ت. يجب إمساك القنينة جيداً وإمالة نهايتها قليلاً بحيث يتوجه طرف المطابق نحو الظهر ثم عصر القنينة ببطء لإدخال السائل (الرسم التوضيحي 3). الضغط الثابت من اليد سيطلق معظم السائل.
- بعد الاستخدام، يجب التخلص من القنينة المستخدمة.
- ث. الآن يجب البقاء بهذه الوضعية لمدة 30 دقيقة على الأقل كي يتوزع الدواء بشكل متكامل في جميع أنحاء المعي.
- إذا أمكن الأمر، يجب استخدام الحقنة الشرجية قبل الخلود إلى النوم بحيث يبقى السائل في المعي طيلة ساعات الليل.



صاحب التسجيل: مختبرات رفام.ض، ص.ب. 405، أورشليم القدس 9100301.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة:

رفال 1 غرام انيما: 1203926001

رفال 4 غرام انيما: 0295825321

من باب تيسير القراءة وتسهيلها، تم صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر، لكن الدواء مخصص لكلا الجنسين.
تم تحرير النشرة في يوليو/تموز 2023 تبعاً لإرشادات وزارة الصحة.

056009-ا