

پوري-نتول أقراص 50 ملغ

كل قرص يحتوي على ميركتوبورين 50 mg (Mercaptopurine) 50 ملغ (ميركتوبورين 50 ملغ) المواد غير الفعالة وموادات الحساسية في المستحضر: أظرف الفقرة 2 [معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء] والفقرة 6 في النشرة [معلومات إضافية].

إنفرا الشترة بإيمان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء، تحمي هذه الشترة على معلومات موجودة عن الدواء، إذا توفر لديك أسلطة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

وتصف هذا الدواء لعلاج مرضك، لا تعطه للأخرين، فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن مرضهم مشابه.

١. لأنّه غرض مخصوص الدواء؟

استعمل پوري-نتول لعلاج أنواع مختلفة من ابيضاض الدم (leukemia).

الفصيلة العلاجية: أدوية سامة للخلايا المثبتة لجهاز المناعة، فراثن البورين.

٢. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء:

- إذا كنت حساساً (الرجيجي) لل المادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر الفقرة 6).
- إذا كنت مرضعة.
- لا يوجد تلقى لقاح ضد الحمى الصفراء عند تناولك لـ پوري-نتول لأن ذلك قد يكون ميتاً.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

• تلقيت مoxa لثاقها أو إذا كنت مقدماً على تلقي لقاح، إذا تلقيت لقاح للحمى الصفراء.

• كنت تتناول پوري-نتول، لأنه لا يجوز تلقي لقاح حي (مثل: لقاح الإنفلونزا، للحصبة، لقاح BCG وإلى آخره) حتى يؤخذ الطبيب أنّه آمن لك، وذلك لأنّ

لقالات عينة قد تؤدي لتلوث إذا تلقيتها أثناء العلاج بـ پوري-نتول.

• لديك مشاكل في الكلى أو الكبد، لأنه يتوجب على طبيب التأكد من سلامته وأدائها الوظيفية.

• كنت في حالة ينبع فيها جسمك كمية أقل مما ينبغي من الإنزيم المسمى TPMT (thiopurine methyltransferase) ملائمة المقدار الدوائي.

• كنت أنت تحظى بخطيبين لإنجاب طفل، هذا التحذير ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء، قد يلقي بوري-نتولضرر بالمناطق أو بالبوصات لديك (انظر إلى فقرة "الحمل، الإرضاخ والخصوبة" في النشرة).

• لديك ساسية (الرجيجي) دواء يسمى إيموران (ازثيوبورين) (يستعمل أيضاً لعلاج السرطان).

• مرضت أو لم تعرض بجدري الماء، الہیس النطاقي أو اتهاب الكبد الفيروسي من نوع (التهاب الكبد B - مرض كبدي ناجم عن فيروس).

• لديك إضطراب جيني يسمى متازمة ليش-نيهان (Lesch-Nyhan Syndrome). إنها تلتقي علاجاً لتبثيط جهاز المناعة، قد يزيد بوري-نتول من الخطورة لديك لـ:

• اورام، بما في ذلك سرطان الجلد، لذلك، تجنب خلال تناول الدواء التعرض المطول لضوء الشمس، ارتدي ثياباً واقية واستعمل كريم وقاية مع عامل وقاية عالي.

• اضطرابات تكاثر خلايا الدم البيضاء (lymphoproliferative disorders)، عندما يتمثل العلاج عدد من الأدوية المثبتة لجهاز المناعة (بما في ذلك ثيوبيورينات)، قد تؤدي هذه الحالة إلى الوفاة.

• دمج عدة أدوية لتثبيط جهاز المناعة التي تعطي سوية، يزيد من الخطورة لإضطرابات في الجهاز المقاومي عقب تلوث فيروسي [إضطرابات تكاثر لمفية المتربطة بفيروس إبتيكتين-بار (EBV)].

قد يزيد تناول بوري-نتول من الخطورة لديك لـ:

• تطور حالة خطيرة تسمى متازنة تثبيط البلازم (Syndrome (Syndrome)، (تفعيل مفرط لخلايا الدم البيضاء المرتبطة بعمليات الاتهاب)، حيث يحدث عادة لدى الأشخاص الذين يعانون من أنواع معينة من الاتهاب المفاصل.

• بعض المتعالجين لديهم مرض التهابي معمى وتلقوا بوري-نتول تطور لديهم نوع نادر وعدياني من السرطان المسمى لمفومة الخلايا التائية الكبدية الطحالية (Hepatosplenic T-cell Lymphoma) (انظر الفقرة 4 "الاعراض الجانبية").

إن استعمال بوري-نتول لعلاج مرض التهابي معمى (IBD) هو إستطباب غير مسلح.

ثلاثون

عندما تكون متعالجاً بـ پوري-نتول، فإن الخطورة لتلوثات فيروسية، فطرية وبكتيرية، أكبر طبيباً قبل بدء العلاج، انظر أيضاً الفقرة 4 "الاعراض الجانبية".

إن اتهاب الكبد الفيروسي من نوع B (انظر الفقرة 6) هو مرض كبدي ناجم عن فيروس.

الأطفال والمهنفون

لوحظ أحياناً قمقة لفسخة السكر في الدم (تعرق أكثر من المعتاد، غثيان، دوار، ارتجاع، وما شابه) لدى الأطفال، خاصة أطفال دون عمر 6 سنوات أو ذوي وزن مخفيض.

تحدث مع طبيب طفلك إذا حدث هذا الأمر.

فوائد دم

قد يؤثر العلاج بـ پوري-نتول على نخاع العظم لديك، وهذا يعني أنه من المحتمل أن يكون في دمك عدد أقل من خلايا الدم البيضاء، المصفihat الدموية وخلايا الدم الحمراء (أقل شيوعاً)، في بداية العلاج سوجه الطبيب إلى إجراء مخصوص بهن خلايا الدم الحمراء العلاج على الأقل خصص أنسوسي، وهذا أمر لا ينفع بهذه الخلايا في دمك، إذا توفرت عن وظائف الكبد.

ـ پوري-نتول تأثير سالم على الكبد لديك، لذلك، سوق يوجه الطبيب إلى إفحوصات أنسوسيعة لبيان وظائف الكبد خلال العلاج بـ پوري-نتول، إذا وجد لديك مرض كبدي أو إذا كنت تتناول أيديرة أخرى التي يمكن أن تؤثر على الكبد لديك، سوسوف ترتفع وتيرة الفحوصات، إنذا كنت تناول حوجد إسفار في بياض البنين أو في البطل (بركان)، يجب تلقي الطبيب فوراً بذلك، وذلك لأنّه من المحتمل بأن تكون هناك حاجة لإيقاف فوري للعلاج بـ پوري-نتول.

ـ بلاغرا [مرض ناجم عن نقص حاد في النيسين (حمض النيكوتينيك) في خلايا الجسم

ـ تحدث عن بيكينج حلاً، إذا كنت تعاني من أسهال، طفح موضعي صياغي (التهاب الجلد - dermatitis)، ضعف الذاكرة، في القدرة على إستخلاص النتائج أو في كفاءات التفكير الأخرى (dementia)، لأنّ هذه الأعراض يمكن أن تشير إلى نقص في فيتامين B3 (نقص في حمض النيكوتينيك / بلاغر)، من المرجح أن يصرف لك طبيب إضافات من الفيتامينات (نياسين / نيكوتيناميد) المساعدة في علاج هذه الحالة.

ـ النساء والضوء فوق البنفسجي (UV)

ـ خلال فترة تناول پوري-نتول، فإنك حساساً أكثر للشمس والضوء فوق البنفسجي (UV). يزد المتأذك من ذلك تحد من تعرضه لنفسه والشم والتضوء فوق البنفسجي (UV)، إرتد واقية واستعمل كريم وقاية ذو عامل وقاية مرتفع.

ـ إذا لم تكن متأنكاً فيما إذا كان المذكور أعلاه ينطبق عليك، توجه إلى الطبيب أو الصيدلي قبل تناول پوري-نتول.

ـ إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً أيديرة أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وأضافات غذائية، أخير الطبيب أو الصيدلي بذلك، خاصة إذا كنت تتناول:

ـ ريزابيرين (العلاج للتغيرات الفيروسية)،

ـ أيديرة أخرى سامة للخلايا (علاج كيميائي لعلاج السرطان)،

ـ الپوبيرون، ثيوپورين، أو فيبيوكستانت (العلاج مضادات الوراثة)،

ـ أولسانازرين أو ميسالازرين (العلاج مرض كرون ومشكلة في الامعاء تسمى الاتهاب القولوني)،

ـ سولفالاسازرين (العلاج المفاصل الروماتويدي أو التهاب القولون التقرحي)،

ـ ميثوتريكسات [العلاج المفاصل الروماتويدي أو التهاب المفاصل الروماتويدي أو الصدفية (psoriasis) الشديدة].

ـ إينتاكسيما (العلاج داء كرون والتهاب القولون التقرحي)، الاتهاب المفاصل الروماتويدي، التهاب القفار الرئيسي أو الصدفية (psoriasis) الشديدة،

ـ وارفارين أو أستينوكارول (acenocoumarol) - مضادات تخثر (تبييض الدم).

ـ أدوية مضادة للإللتحالات مثل فيتينوتين، كاربامازيبين، من الجائز أن يتطلب الأمر مرقابة مستويات الأدوية المضادة للإللتحالات في الدم وملاءمة مقارها الدوائية إذا دعت الحاجة.

ـ استعمال القاحات خلال فترة تناول پوري-نتول

ـ إذا كنت مقدماً على تلقي لقاح، استشر الطبيب أو الممرضة أولاً، لا يجوز أن تلتقي لقاح حي عندما تتناول پوري-نتول (مثل: بوليو، الحصبة، التكاف و الحصبة الألمانية) حتى يؤكد الطبيب أن هذا من لك، لأن لقاحات معينة قد تؤدي لتلوث إذا تلقيتها أثناء العلاج بـ پوري-نتول.

ـ استعمل وسيلة من محل موثوقة لتجنب حدوث حمل إذا كنت تتناول أنت أو زوجتك بوري-نتول، توجب على الرجال وعلى النساء على الأقل بعد إنهاء العلاج، إذا كنت حالياً حامل، فعلديك التحدث مع طبيبك قبل تناول پوري-نتول، يتوجب على المرأة الحامل أو الإمرأة التي تخطط للحمل أو المرضعة عدم ملassement المستحضر بوري-نتول.

ـ لا يجوز الإرضاخ خلال فترة استعمال پوري-نتول، إستشيري طبيب الصيدلي الخاص بك أو أقربية الاحساس به.

ـ السيادة وإستعمال الماكينات

ـ من مرحلة المراهقة أن يؤثر پوري-نتول على القدرة لديك على السيادة أو إستعمال الماكينات، لكن لم يتم إجراء دراسات لتاكيد ذلك.

ـ معلومات هامة من بعض مركبات الدواء

ـ تحذيري أعراض پوري-نتول على لاكتوز، إذا قال لك الطبيب بذلك حساس لسكريات مينية، توجه إلى الطبيب قبل استعمال الدواء.

ـ **(3) كيفية إستعمال الدواء؟**

ـ يجب أن يعطي پوري-نتول لك فقط بأمر طبيب أخصائي لعلاج أمراض الدم.

ـ يجب إستعمال المستحضر داماً وفقاً لتعليمات الطبيب، عليه التحقق مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

- سخونة الدوائية وطريقة العلاج تحدى من قبل الطبيب فقط. سيتم تحديد الجرعة الدوائية بشكل فوري واعتماداً على العلاجات الأخرى التي تُعطى للمريض. من المهم المرحص على تناول الدواء في أوقات متنتظمة.
 - يجب تناول الدواء ساعة على الأقل قبل أو 3 ساعات بعد الأكل أو شرب الحليب.
 - خط الشطر - يجب بلع الدواء بكمته مع كوب من الماء.
 - سحق أو مضغ الأدوار.
 - المستحضر سام للخلايا - يجب غسل اليدين حالاً إذا لمست أحد أو المعالج الخاص بك أقراص مكسورة.
 - المحتوى المخالط - خال فنرة العلاج ببوري-تولو سوف يجري الطبيب فحوصات بد روتينية. وهذا لفحص تعداد الخلايا في دمك ووظائف الكبد. من المحتدل أن يقوم الطبيب بإجراء فحوصات دم وبوبي أخرى لمتابعة نسبة حمض البيروك (حمض البول) الذي يمكن أن يرتفع أثناء العلاج ببوري-تولو. قد يغير الطبيب الجرعة الدوائية خلال العلاج أنقذ المحتوى المخالط.
 - لدى المرضى البالغين - من الجائز خفض الجرعة الدوائية وفقاً لنتائج وظائف الكلى والكبد.
 - لدى المرضى مع مشاكل في الكلى أو الكبد - من الجائز خفض الجرعة الدوائية.
 - إذا كان لديك نقص في إنديميت TPMT - لا يجوز تناول الجرعة الدوائية الموصى بها.
 - إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر - إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة قد تشعر بغثيان، تقياً أو يحصل لديك أسهال. إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطة أو إذا بلع طفل أو شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معاً.
 - إذا نسيت تناول الدواء - إذا نسيت تناول هذا الدواء في الوقت المحدد، أبلغ الطبيب المعالج لا يجوز تناول جرعة دوائية ماضعة للتعميق عن الجرعة الدوائية المنشية.
 - إذا توقفت عن تناول الدواء - يجب الدعاومة على العلاج كماً وأوصي به من قبل الطبيب. حتى لو طرأ تحسن على حالتك المحسنة، لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء دون استشارة الطبيب.
 - لا يجوز تناول أدوية في العقمة! - يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية التي يجب تناول فيها دواء. ضع الظارات الطبية إذا كنت بحاجة لها.
 - إذا كانت لديك أسلطة إضافية حول إستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.
- (4) الأعراض الجانبية**
- كما يك دوا، قد سبب إستعمال بوري-تولو أعراض جانبية عند بعض المستعملين.
 - لا تنتهي من تناول قامة الأعراض الجانبية. من المحتدل أن تعي آيا منها.
 - ظهرت إحدى الأعراض التالية:
 - رد فعل تحسسي - العلامات قد تشمل:
 - طفح جلدي
 - سخونة مرتفعة
 - آلام في المفاصل
 - انتفاخ الوجه
 - أي علامات سخونة أو تلوث (آلم في الحنجرة، آلم في الفم أو مشاكل في المسالك البولية).
 - أي كدمة أو نزف غير متوقعين، لأن ذلك يمكن أن يدل على قلة إنتاج خلايا دم من نوع معين.
 - إذا شعرت سوءاً بشكل مفاجئ (حيث ولو كانت حرارة جسمك سليمة) ولديك آلم في بطين وغثيان، لأن ذلك قد يكون علامة لإلتهاب البنكرياس.
 - إصفرار بياض العينين أو الحبل (دقان).
 - عقيمات في الجلد (حمامي عقدة -) غير معروفة.
 - يستمر الطبيب إذا ظهرت لديك إحدى الأعراض الجانبية التالية، التي قد تحدث عند إستعمال المستحضر:
 - أعراض جانبية شائعة جداً - تظهر لدى أكثر من مستعمل واحد من عشرة
 - أعراض جانبية شائعة (common) - تظهر لدى 10-100 مستعملين من بين 100
 - تضرر الكبد - من الجائز أن يظهر في فحوص الدم
 - انتفاخ في عده خلايا الدم الحمراء الأمر الذي قد يسبب لك الإرهاق، الضعف أو صعوبة في التنفس (سمى فقر الدم)
 - فتقان الشويبة للطعام (stomatitis)
 - إلتهاب في المعدة (stomachitis)
 - انتفاخ في البنكرياس (Pancreatitis) لدى متعالجين لديهم مرض معوي التهابي
 - أعراض جانبية غير شائعة (uncommon) - تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 1,000
 - آلام في المفاصل
 - لفخ جلدي
- إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:
- Lactose monohydrate, maize starch, modified maize starch, magnesium stearate, stearic acid.
- كيف يبدو الدواء وما هو محتواه العبوة:
- أقراص مستديرة ومحببة بلون أصفر فاتح، مع خط (حيث لا يستخدم اللطير) بجانب واحد، حيث معلم PT فوق الخط ومن تمنه معلم 50 ولا توجد علامة في الجانب الثاني، في قبضة زجاجية التي تحتوي على 25 قرصاً.
- أصحاب الإنتباذه وعغنهه: وكالات باداجيس إسرائيل، م.ض، شارع راكيفيت، 1، شوهم.
- إسم المنتج وعوانه: أسين فارما تريدينج، م.ض، بيـلـنـا، إـيـرـلـانـدـ.
- تم إعادتها إلى نيسان 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 3344.22532.
- للتبييض وتسهل القراءة، صيغت هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للكبار.
- أعراض جانبية نادرة (rare) - تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000.
- أعراض جانبية نادرة جداً (very rare) - تظهر لدى أقل من مستعمل واحد من بين 10,000.
- أعراض جانبية إضافية لدى الأطفال
- بلغ عن انتفاخ سكر في الدم (leukemia) عن ذلك سرطان الدم، الملف والجلد وما شابه (لدي عدد من الأطفال الذين يتناولون بوري-تولو). إن شهود هذا العرض غير معروف، لكن غالبية الأطفال كانوا تחת عمر 6 سنوات وذوي وزن متذر.
- إذا ظهر عرض جانبى، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبى لم يذكر في المنشورة، عليك إستشارة الطبيب.
- التباعية عن أعراض جانبية:
- يمكن تتبعه عن أعراض جانبية عابنة لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود في الصفحة الرئيسية الموقع ووزارة الصحة، أو عن طريق تصفح الرابط:
- <https://sideeffects.health.gov.il>
- بالإضافة، يمكن تبليغ شركة باداجيس بواسطة العنوان التالي:
- Padagis.co.il
- (5) كيفية تخزين الدواء**
- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال زاوية الأطفال / أو الرضع و بذلك تمنع التسمم. لا سبب القىبي بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
 - لا يجب إستعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على عبوة الكرتون والملصق على القبضة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الآخر من نفس الشهر.
 - يجب تخزين دون 25 درجة مئوية، في مكان جاف. أغلاق القبضة بإحكام.
 - إذا طلب طبيب بالتوقف عن الدواء، فمن المهم إعادة جميع ما تبقى من الدواء إلى الصيدلي حتى يتمكن من التخلص منها بموجب تعليمات التخلص من المواد الخطرة. احتفظ بباقي الدواء لديك فقط بموجب تعليمات صريحة من الطبيب.
- (6) معلومات إضافية**
- إضافة إلى المادة الفعالة يحتوي الدواء أيضاً على:
 - Lactose monohydrate, maize starch, modified maize starch, magnesium stearate, stearic acid.
 - كيف يبدو الدواء وما هو محتواه العبوة:
 - أقراص مستديرة ومحببة بلون أصفر فاتح، مع خط (حيث لا يستخدم اللطير) بجانب واحد، حيث معلم PT فوق الخط ومن تمنه معلم 50 ولا توجد علامة في الجانب الثاني، في قبضة زجاجية التي تحتوي على 25 قرصاً.
 - أصحاب الإنتباذه وعغنهه: وكالات باداجيس إسرائيل، م.ض، شارع راكيفيت، 1، شوهم.
 - إسم المنتج وعوانه: أسين فارما تريدينج، م.ض، بيـلـنـا، إـيـرـلـانـدـ.
 - تم إعادتها إلى نيسان 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
 - رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 3344.22532.
 - للتبييض وتسهل القراءة، صيغت هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص للكبار.