

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (כתישורים התשמ"ו - 1986
התרופה משוקת על פי מרשם רופא בלבד

לותרים 250 לותרים 500 לותרים 1000 טבליות מצופות

החומר הפעיל וכמותו:

כל טבלייה של לותרים 250 מכילה לבטיראצטם 250 מ"ג (levetiracetam 250 mg).

כל טבלייה של לותרים 500 מכילה לבטיראצטם 500 מ"ג (levetiracetam 500 mg).

כל טבלייה של לותרים 1000 מכילה לבטיראצטם 1000 מ"ג (levetiracetam 1000 mg).

חומרים בלתי פעילים ואלרגיים: ראה פרק 6 "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם שתמש בתרופה.
עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. לא תעביר אותה לאחרים.
היא עלולה להזיק לילדים אם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

התרופה אינה מועדת לשימוש בתינוקות ובילדים מתחת לגיל 4 שנים.

1. למע מיעדת התרופה?

1. טיפול יחיד בסוגים שונים של אפילפסיה במבוגרים מעל גיל 16.

2. טיפול לילוח התרופות אנט-אפילפטיות אחרות ב:

• חולים במבוגרים ילדים מגיל 4, החולים בסוגים מסוימים של מחלת האפילפסיה.

• חולים במבוגרים ומתבגרים מגיל 12 החולים באפילפסיה מסוג Juvenile Myoclonic Epilepsy או מסוג Idiopathic Generalised Epilepsy.

קבוצה תרופיסטית: חומרים נוגדי עוויתות.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה הרגיש אלרגי (אלרגי) לליתוראצטם (levetiracetam) או לגזרות אחרות של פירולידונו (pyrrolidone) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).

אזהרות וחידות הנוגעות לשימוש בתרופה לפני הטיפול הלוותרים, ספר לרופא את:
• אתה סובל מלקיני בתפקוד הכליה. ייתכן שהרופא ישה את המינון של התרופה.
• הבחנת בהאטה בצמיחה או בהפתחות מינית לא צפויה של ילדך, יש לפנות לרופא המטפל.
• אתה חווה תסמינים של דיכאון/או מחשבות אובדניות. מספר מעוט של אנשים אשר טופלו בתרופות אנט-אפילפטיות כגון לוותרים חוו מחשבות הרסניות או אובדניות כלפי עצמם.
נטילת התרופת נגד עוויתות עלולה להגביר את הסיכון לפעילות או מחשבות אובדניות.
עלך ועל בני משפחתך לשים לב לשינויים במצב הרוח והדפוסי להתנהגות. יש לעקוב אחרי סימנים המעידים על סיכון להתאבדות כגון דיבורים או מחשבות על הרצון להזיק לעצמך, התכנסות בתוך עצמך והתרחקות ממשפחה ובחרים, דיכאון או החמרה בסימנים או אובדניות כלפי עצמם.
המות, הפקרה או מסירה של נכסים יקר ערך.
יש לך לא מלישה מבני משפחתך היסטוריה של קצב לב לא סדיר (על פי בדיקת ק"א) או אם יש לך מחלה או שאתה נוטל תרופות שיכולות לגרום לאי סדירות בקצב הלב או להפרעות במאזן מלח.

• אחת מתופעות הלוואי האבאות מחמירה או מגשכת למעלה ממספר ימים:
• מחשבות שאינן רגילות, תחושת רגזנות או תגובתיות תקיפה יותר מהרגיל, או אם אתה או בני משפחתך והסובבים אותך מבחינים בשינויים משמעותיים במצב הרוח או בהתנהגות.

• **החמרה באפילפסיה:** לעיתים נדירות, ייתכן שתחוו החמרה בהתקפים או עלייה בתדירותם, בעיקר במהלך החודש הראשון לאחר תחילת הטיפול או העלאת מינון. אם במהלך הטיפול חלה עלייה בתדירות ההתקפים (כגון עלייה במספרם) או בחומרתם, יש לפנות לרופא המטפל בהקדם האפשרי.
בבזר נדירה מאוד של אפילפסיה מגיל צעיר (אפילפסיה הקשורה למוטציות SCN8A) הוגרמת הפרסונים מסוגים רבים ופוגעת בכיורים, ייתכן שהפרסונים יימשכו או יחמירו במהלך הטיפול.

בהקרה של הופעת אחד או יותר תסמינים אלה או כל דפוס התנהגות מדאיג אחר - יש לפנות לרופא מיידי!

ילדים ומתבגרים
לוותרים אינה מיועדת כטיפול יחיד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 16.

אינטראקציות/תגובות בין תרופות:
אם אתה לוקח או לא לקחת את הלוותרים תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.
מביחוד אם אתה לוקח:
• מקרגול (תרופה להשללת). אין ליטול מקרגול במשך שעה לפני או שעה אחרי נטילת לוותרים מכיוון שהדבר עלול לפגום ביעילות התרופה.
• טמזולומיד. יש לבצע הערכת תפקודי כבד לפני התחלת טיפול משולב של טמזולומיד ולוותרים. אם החולט של טיפול משולב יש לבצע בדיקות תפקודי כבד שגרתיות במהלך הטיפול המשולב ולשקול הפסקת הטיפול המשולב במידת הצורך.

שימוש בתרופה ומזון

יש ליטול את הטבליות עם כמות מספקת של מים (כוס מים).

ניתן ליטול את התרופה עם או ללא מזון.

ניטול בתרופה וצריכת אלכוהול

אין מידע לגבי אינטראקציה של התרופה עם אלכוהול.

היריון והנקה

אם את בהריון, מניקה, חושבת שאת עשויה להיות בהריון או מתכננת להרות, עלייך להיוועץ ברופא לפני נטילת תרופה זו. ניתן להשתמש בלוותרים בהיריון, אין לארח הערכה קפדנית הרופא חושב שטיפול זה הכרחי. אין להפסיק את הטיפול מבלי להיוועץ ברופא.
אם ניתן לשלול לחלוטין את הסיכון לגרימת מומים מולדים בעובר.
לא מומלץ להיכן בדיקת הטיפול בלוותרים.

נהיגה ושימוש במכונית

לוותרים עלולה לפגוע ביכולתך לנהוג או להפעיל מכונית מסוכנת, מכיוון שאתה עלול להרגיש שינוי. תופעה זו פועימה בעיקר בתחילת הטיפול ולאחר העלאת מינון. אין לנהוג או להפעיל מכונית מסוכנות עד שתרגיש כשיר לבצע פעולות אלה.
באשר לילדים, יש להזהירים מרכיבה על אופניים או ממשחקים בקרבת הכביש ודומה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשירי תמיד בהתאם להוראות הרופא. עלך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.
המינון ואופן הטיפול ייקבעו על ידי הרופא לבדך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

צורת הנטילה

יש ליטול את הטבליות עם כמות מספקת של מים (כוס מים). יש לחלק את המינון היומי ל-2 מנות זהות ולקחת מנה בבוקר

ומנה בערב. יש להקיפד על נטילת התרופה בזמנים קבועים. לוותרים טבליות אינה מתאימה לשימוש בילדים מתחת לגיל 6, בגלל קשיי בליעה. לוותרים תמיסה בליבליה (100 מ"ג/מ"ל) היא צורת המתן המועדפת לילדים מתחת לגיל 6, לילדים ולמתבגרים (בגילאי 6-17) אשר שוקעים פחות מ-50 ק"ג וכאשר יש קושי תופעות לוואי משמעותיות טבליות.

כתישה/חצייה/ליפסה

אין ללעוס, הטבלייה מועדת לבלעיה. ניתן לחצות את הטבלייה. אין מידע לגבי כתישה/ריסוק של הטבלייה. טבלייה כתושה עלולה להשאיר טעם מר.

משך הטיפול

- לוותרים משמשת לטיפול כרוני. יש להתמיד בטיפול
- לוותרים כל עוד הרופא הנחה אותך להמשיך בטיפול.
- אין להפסיק את הטיפול ללא הנחיית הרופא כיוון שהפסקת הטיפול בצורה זו עלולה להגביר את ההתקפים.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד מן התרופה, פנה לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את ארזית התרופה איתך. תופעות הלוואי האפשריות במקרה של מינון יתר הן שינויות רע, עצבנות, ירידה בפרקט, דיכוי נשימה ותרדמת.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המיועד, אין ליטול מנה כפולה. פנה לרופא על מנת שינחה אותך מה לעשות. יש להתמיד בטיפולו כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה:

בהפסקת טיפול, יש להפסיק את נטילת לוותרים באופן הדרגתי על מנת למנוע עלייה בהתקפים.
הנהגות יחילי על הפסקת הטיפול בלוותרים, הוא ינחה אותך אין להפחית את השימוש באופן הדרגתי.

אין ליטול תרופות בחושיך בהזמן תונית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בלוותרים עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי, ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

יש לפנות מיד לרופא או לחדר המיון הקרוב אם אתה חווה:
• חולשה, תחושת סחרור או קושי לנשום. אלה עלולים להיות סימנים של תגובה אלרגית (אנפילקטית) חמורה.
• התנפחות הפנים, השפתיים, הלשון והגרונן (Quincke's oedema).

• תסמינים דמויי שפעת ופריחה על הפנים המלווה בפריחה מפושטת עם חום גבוה, זרמות גבוהות של אנזימי כבד של סוג אתי
דל לבנים (אזינוינפילים) בבדיקות הדם ובלוטות לימפה מגדולות (תסמונת Dress).

• ירידה בנפח הרקתי, עייפות, בחילה, הקאה, בלבול והתנפחות הרגליים, שקטות, יכופת הרגליים. אלה עלולים להיות סימנים לירידה פתאומית בתפקוד הכליתי.
• פריחה בעור אשר עלולה ליצור שלפוחיות ולהיראות כמו מטרות קטנות (נקודות כהות מקופות באזור בהיר יותר, המוקף בטבעת כהה) (erythema multiforme).
• פריחה ממושטת עם שלפוחיות והתקפלות של העור, מביחוד סביב הפה, האף, העיניים ואיברי המין (סינדרום טיטבס-ג'ונסון).

- פריחה חמורה יותר אשר גורמת להתקלפות של העור ביותר מ-30% משטח הגוף (toxic epidermal necrolysis).
- סימנים לשינויים נפשיים חמורים או אם משהו סביבך מבחין בסימנים של בלבול, שינויות, איבוד זיכרון (אמנזיה), פגיעה בזיכרון (שכחה), התנהגות לא רגילה או סימנים ניוירולוגיים אחרים הכוללים תנועות לא רצויות או בלתי נשלטות. אלה עלולים להיות תסמינים של אנצפולפתיה.

תופעות לוואי נדירות ביותר הן דלקת תאבן, גלובלו, שינויות, עייפות וסחרחורת.

תופעות לוואי כגון שינויות, עייפות וסחרחורת, עשויות להיות אלו בדרך כלל פחותות עם הזמן.

תופעות לוואי שיכולות מאוד (very common) - תופעות שמופיעות ביותר משמשתם אחד מעשרה:

- דלקת באף גלובלו.
- שינויות, כאב ראש.

תופעות לוואי שכוחות (common) - תופעות 10-14 משתמשים מתוך 100:

- חוסר תיאבון (אנוקסיה).
- דכאון, עיינות או תוקפנות, חרדה, דודי שינה, עצבנות או אי שקט.
- עוויתות, הפרעות בשיווי המשקל, סחרחורת, רדמת (לתיגרה) - מצב של חוסר אנרגיה וחוסר שזקן), רעד.
- ורטיגו (תחושת סחרור).
- שיעול.
- כאב בטן, שלשול, הפרעות בעיכול, הקאה, בחילה.
- פריחה.
- חולשה ועייפות.

תופעות לוואי שאינן מופיעות (uncommon) - תופעות שמופיעות ב-10-14 משתמשים מתוך 1,000,
• ירידה במספר הטסיות בדם, ירידה במספר כדוריות הדם הלבנות.
• ירידה או עלייה במשקל.

- ניסיון התאבדות ומחשבות אובדניות, הפרעה נפשית, התנהגות חריגה, זיונית, כעס, בלבול, התקף בהלה, חוסר יציבות נפשית או תנדוות במצב הרוח, חוסר מנוחה (אגיטיציה).
- אובדן זיכרון (אמנזיה), פגיעה בזיכרון (שכחה), פגיעה בקואורדינציה/אי שליטה בשרירים (אטקסיה), תחושת נימול (פרסרתזיה), חוסר ריחז.
- ראייה כפולה, טשטוש ראייה.
- תוצאות לא תקינות/עלייה בבדיקת תפקודי כבד.
- נשירת שיער, אקזמה, גרד בעור.
- כאבי שרירים, חולשת שרירים.
- גטייה לפעיות.

תופעות לוואי נדירות (rare) - תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000:

- ירידה במספר כדוריות הדם מכל הסוגים.
- תגובת אלרגית חמורת (DRESS, תגובה אנפילקטית [תגובה אלרגית חמורה], בצקת Quincke's oedema [נפיחות של הפנים, השפתיים, הלשון והגרונן]).
- ירידה בריכוז הנתרן בדם.
- התאבדות, הפרעות באישיות, הפרעות בחשיבה (חשיבה אסיית, חוסר יכולת להיחרכ).
- דלדיום.
- אנצפולפתיה (ראם טעף)"יש לפנות מיד לרופא או לחדר המיון הקרוב אם אתה חווה" לתיאור מפורט של התסמינים).
- החמרה בהתקפים או עלייה בתדירותם.
- התכווציות שרירים בלתי נשלטות המשפיעות על הראש, הגוף (טרטוס) והגפיים, קושי בשליטה על התנועותיו, תנועותיות יתר (היפרקניזיה).
- שינוי בקצב הלב (ק"א).
- דלקת בלבלב (נקראטיטיס).
- שקט כבדי, דלקת כבד (הפטטיסיס).
- ירידה פתאומית בתפקוד הכליתי.
- פריחה עורית (ארגמנה מולטיפורם) העלולה להתבטא בשלפוחיות הנראות כמו מטרר קטנה (נקודות כהות במרכז המוקפות באזור בהיר מהוקף בטבעת כהה), פריחה ממושטת המלווה בשלפוחיות וקילוף העור, בייחוד סביב הפה, האף, העיניים ואיברי המין (תסמונת טיטבס-ג'ונסון),

אז צורה חמורה יותר הגורמת לקילוף של מעלה מ-30% משטח העור (נמק אפידרמי ערעל).

- רדומילויזיס (פירוק רקמת שריר) ועלייה בקראטיין פוספוקינאז בדם, תופעה זו שכיחה יותר במטופלים יפנים.
- הראווה למטופלים שאינם יפנים.
- צלעיה או קושי בהליכה.
- שילוב של חום, נקושות שרירים, לחץ הדם וקצב לב לא יציבים, בלבול, ירידה ברמת הנכרה (סימנים אפשריים להפרעה המכונה תסמונת ניוירולפטית ממארת). תסמונת זו עשויה להתפתח בסבירות גבווה יותר בקרב מטופלים יפנים בהשוואה למטופלים שאינם יפנים.

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) - תופעות שמופיעות ב-עד-עם משתמש אחד מתוך 10,000:
• מחשבות או תחושות חזרות ובלתי נשלטות או דחף לבצע משוה שוב ושוב (הפרעה טורדנית כפייתית).

אם הופיעה תופעת לוואי, אין אחת מתופעות הלוואי המחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דווח על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או ע"י כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il/ ניתן לדווח גם לדוא"ר: safety@trima.co.il

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרעלה לתרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ לרישע יד ושנוח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות על ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס לזמן האחרון של אותו חודש.

אחסן במקום יבש, בטמפרטורה הנמוכה מ-C-25.
אחסן באריזה המקורית.

6. מידע נוסף:

נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:

Maize starch, povidone, hydroxyethylcellulose, titanium dioxide, colloidal silicone dioxide, magnesium stearate, polyethylene glycol.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

לוותרים 250: טבלייה מצופה, עגולה, קמורה משני צידיה, לבנה עם קו חצייה בצד אחד.

לוותרים 500: טבלייה מצופה, מוארכת, קמורה משני צידיה, לבנה עם קו חצייה בצד אחד.

לוותרים 1000: לבנה עם קו חצייה בצד אחד.

הטבליות ארזוזות במגשינות אלומיניום. כל אריזה מכילה 60 טבליות.

יצרן ובעל רישום וכותבות: הרמימה תוצרי רפואה ישראלים מעברות בע"מ, מעברות 4023000, ישראל

נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי משרד הבריאות:

לוותרים 250: 00.31935.143.75

לוותרים 500: 00.31936.143.76

לוותרים 1000: 00.31941.143.77

לשם הפיטות ולהקלת הקניאה עלו זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

P00001114	1023D	PIL-1023-06
-----------	-------	-------------