

הנדון:

**אנורו אליפטה 55/22 מק"ג, אבקה לשאייפה
Anoro Ellipta 55 /22 mcg, Inhalation powder
Umeclidinium (as bromide) 55 mcg, Vilanterol (as trifenatate) 22 mcg**

רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ה,

חברת גלקסוסמייטקלין ישראל בע"מ (GSK) מבקשת להודיע על עדכון העلون לצריך ולרופא של התכשיר:
" Anoro Ellipta 55/22 mcg ".

 **ההתוויה הרשותה לתקシリ בישראל:**

ANORO ELLIPTA is indicated as a maintenance bronchodilator treatment to relieve symptoms in adult patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

ANORO ELLIPTA is NOT indicated for the relief of acute bronchospasm or for the treatment of asthma.

בהתודעה זו מצוינים העדכוניים המהותיים בלבד.

עדכוניים מהותיים נעשו בסעיפים הבאים בעлон לצריך:

2. לפני שימוש בתרופה

...
ازהרחות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה
לפני הטיפולengan אליפטה, ספר לרופא אם:

- יש לך אסתמה (אל תשתמשengan אליפטה לטיפול באסתמה)
- יש לך בעיות לב או לחץ דם גבוה
- יש לך בעיות עיניים הנקראות גלאוקומה צרת-ջווית
- יש לך בלוטת ערמונית (פרוסטטה) מוגדלת, קושי במנון שתן או חסימה בשלפוחית השתן שלך
- אתה סובל מאפיילפסיה
- יש לך בעיות בבלוטת התריס (טירואיד)
- **יש לך רמת אשגן נמוכה בدم**
- יש לך סוכרת
- יש לך בעיות כבד חמורות
- ← בדוק עם הרופא **שלא** אם אתה סבור שאחד מ אלה מתיחס לך.

...
אם אתה **ЛОKH** או אם לך **אסתמה** לאחרונה, תרופות אחרות כולן תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרופך. אם אין לך בטוח מה התרופה שלך מכילה, שוחח עם הרופא **שלא** או לרופך. תרופות מסוימות עלולות להשפיע על אופן הפעולה של תרופה זו, או להעלות את הסבירות שהיא לך תופעות לוואי. אלה כוללות:

- תרופות הנקראות חוסמי בטא (כגון פרופרנולול), לטיפול **בלחץ דם גבוה** או **בעיות לב** אחרות
- קטוקונזול או איטראקונזול, לטיפול **בזיהומיים פטריטיים**
- קלאריתומיצין או טלייטומיצין, לטיפול **בזיהומיים חידקיים**
- ריטונאביר, לטיפול **בזיהום של HIV**
- תרופות שמפחיתות את כמות האשגן בדם שלך, כמו משתנים מסוימים או תרופות מסוימות המשמשות לטיפול באסתמה (כגון מטיל-קנסטין או סטרואידים)
- תרופות ארוכות טווח אחרות שדומות לטרופה זו ומשמשות לטיפול בעיות נשימה, כגון טיוטרופינים, אינדקטROL.
- אל תשתחמךengan אליפטה אם אתה כבר משתמש בתרופות אלו.

← **ספר לרופא **שלא** או לרופך** אם אתה לך **ЛОKH** כל אחת מ אלה.

אם אתה נועל אחד או יותר מן התרופות הללו, **יתכן** שהרופא ירצה לבצע **קפקט קפדי** אחר מבחן, **כיוון** **שהלו עולות להגברת תופעות הלוי שלangan אליפטה.**

4.2 Posology and method of administration

Posology

Adults

The recommended **and maximum** dose is one inhalation ~~of ANORO ELLIPTA 55/22 micrograms~~ once daily.

ANORO ELLIPTA should be administered at the same time of the day each day to maintain bronchodilation. ~~The maximum dose is one inhalation of ANORO ELLIPTA 55/22 micrograms once daily. If a dose is missed the next dose should be inhaled at the usual time the next day.~~

...

מקרה לעדכנים המסומנים:

מידע שהօיר – מסומן בקוו אדום חוצה XXX

מידע שהתווסף - מסומן בכתב כחול

תוספת החמרה - כתב כחול – מסומן בצהוב מפרק

קיימים עדכנים נוספים. למידע נוסף יש לעיין בעלון לרופא ובעלון לצריך המעודכנים.

העלון לרופא והעלון לצריך נשלחו לפרטום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/byDrug>

וניתן לקבלם מודפסים על-ידי פניה לחברת גלקסוסמייטקלין רח' בזל 25 פתח תקווה טלפון: 03-9297100.

בברכה,

עינת טל
רוקחת ממונה