

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו–1986 התרופה משוקת על פי מרמש רופא בלבד

אמוקסיקלב טבע 875 מ"ג טבליות מצופות

כל טבלייה מצופה מכילה:

אמוקסיצילין (כטריהידראט) 875 מ"ג

חומצה קלאולאנית (מכל (אשלגן) 125 מ"ג Amoxicillin (as trihydrate) 875 mg Clavulanic acid (as potassium salt) 125 mg

למידע על מרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם שתתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

אמוקסיקלב טבע משמשת במבוגרים ובילדים לטיפול בזיהומים הבאים:

- זיהומים באוזן התיכונה ובסינוסים
- זיהומים בדרכי הנשימה
- זיהומים בדרכי השתן
- זיהומים בעור וברקמות רכות לרבות זיהומים דנטליים
- זיהומים בעצמות ובמפרקים.

אמוקסיקלב טבע היא אנטיביוטיקה הפועלת על-ידי קטילת חיידקים הגורמים לזיהומים. היא מכילה שתי תרופות שונות הנקראות אמוקסיצילין וחומצה קלאולאנית. אמוקסיצילין שייכת לקבוצת תרופות הנקראת "פניצילינים" שלעיתים פעילותן יכולה להיפסק (הפוך לבלתי פעילות). הרכיב הפעיל האחר (חומצה קלאולאנית) מונע זאת מלקרות.

קבוצה תרפויטית

אמוקסיצילין: אנטיביוטיקה מקבוצת הפניצילינים.

חומצה קלאולאנית: מעכבי האנזים בטא-לקטמאז.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לאמוקסיצילין, לחומצה קלאולאנית, לפניצילין או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה סעיף 6 – "מידע נוסף").
- היתה לך אי פעם תגובה אלרגית חמורה לכל אנטיביוטיקה אחרת. זו יכולה לכלול פריחה בעור או נפיחות של הפנים או הגרון.
- היו לך אי פעם בעיות בכבד או צהבת (צהבה של העור) בעת נטילת אנטיביוטיקה.

אל תיקח אמוקסיקלב טבע אם אחד מאלה חל עליך. אלא אינך בטוח, דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אמוקסיקלב טבע.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אמוקסיקלב טבע אם:

- יש לך מחלת השניקה
- אתה מקבל טיפול עקב בעיות בכבד או בכליות
- אינך מטיל שתן בצורה תקינה.

אם אינך בטוח אם אחד מאלה חל עליך, דבר עם הרופא או הרוקח לפני נטילת אמוקסיקלב טבע.

במקרים מסוימים, ייתכן שהרופא יבדוק את סוג החיידק הגורם לזיהום שלך. בהתאם לתוצאות, ייתכן שיתן לך חוקק אחר או תרופה אחרת.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם

אמוקסיקלב טבע עלולה להחמיר מצבים קיימים מסוימים, או לגרום לתופעות לוואי חמורות. אלה כוללות תגובות אלרגיות, פרכוסים (עיוניות) ודלקת של המעי הגס. עליך לשים לב לתסמינים מסוימים בזמן שאתה לוקח אמוקסיקלב טבע, כדי להפחית את הסיכון לבעיות כלשהן. ראה **מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם'** בסעיף 4 – "תופעות לוואי".

בדיקות דם ושתן

אם אתה עובר בדיקות דם (כגון בדיקות המעריכות את מצב תאי הדם האדומים או בדיקות לתפקוד כבד) או בדיקות שתן (לבדיקת רמות גלוקוז), ידע את הרופא שאתה לוקח אמוקסיקלב טבע. זאת משום שאמוקסיקלב טבע יכולה להשפיע על התוצאות של בדיקות מסוגים אלה.

אינטראקציות/תגובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח, אוכל לקחת לאחרונה או אם ייתכן שתיקח תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם, תרופות צמחיות ותוספי תזונה, ספרו על כך לרופא או לרוקח.

- אם אתה לוקח אפורהניול (המשמשת לטיפול בשיגדון) עם אמוקסיקלב טבע, יש סבירות גדולה יותר לכך שתהיה לך תגובה אלרגית עורית.

- אם אתה לוקח פרובנציד (המשמשת לטיפול בשיגדון), ייתכן שהרופא יחליט להתאים את המינון של אמוקסיקלב טבע.

- אם תרופות מעכבות קרישת דם (כגון וארפרין או אצנוקומארול) נלקחות עם אמוקסיקלב טבע, ייתכן שהייה צורך בבדיקות דם נוספות.

- אמוקסיקלב טבע יכולה להשפיע על אופן פעילותה של מתורקסטא (תרופה המשמשת לטיפול בסרטן או במחלות שגרוניות).

- אמוקסיקלב טבע עלולה להשפיע על אופן פעילותה של מיקופנולאט מופטיל (תרופה המשמשת למניעת דחייה של איברים מושתלים).

שימוש בתרופה ומזון

יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם כוס מים עם הארוחה. ניתן לחצות את הטבליות לאורך הקו המסומן כדי להקל על הבליעה. יש לקחת את שני חלקי הטבלייה באותו הזמן.

היריון והנקה

אם את בהיריון או מניקה, חושבת שייתכן שאת בהיריון או מתכננת להרות, פני לרופא או לרוקח לקבלת ייעוץ לפני נטילת תרופה זו.

נהיגה ושימוש במכוונת

לאמוקסיקלב טבע לכולות להיות תופעות לוואי והתסמינים עלולים לגרום לך להיות לא כשיר לנהיגה.

אל תנהג או תפעיל מכוונת אלא אם אתה מרגיש טוב.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

תרופה זו מכילה פחות מ-1 מילימול (23 מ"ג) נתרן בטבלייה ולכן נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד שתתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.

מבוגרים וילדים השוקלים 40 ק"ג ומעלה

- המינון המקובל בדרך כלל הוא: טבלייה אחת פעמיים ביום.
- מינון גבוה יותר: טבלייה אחת שלוש פעמים ביום.

ילדים השוקלים פחות מ-40 ק"ג

בילדים בני שש ומטה, מומלץ לטפל בתרחיף דרך הפה. יש להתייעץ עם הרופא במקרה בו ניתנות טבליות לילדים השוקלים פחות מ-40 ק"ג. הטבליות אחרות, טבלייה אחת שלוש פעמים ביום. פחות מ-25 ק"ג.

לא קיימים תזונים קליניים עבור מטופלים מתחת לגיל חודשיים.

מטופלים עם בעיות כליות וכבד

אם יש לך בעיות בכליות ייתכן שהמנה תשתנה. ייתכן שחוקק אחר או תרופה אחרת יבחרו על-ידי הרופא.

אם יש לך בעיות בכבד ייתכן שתצטרך לבצע בדיקות דם תקופות יותר כדי לבדוק את תפקודי הכבד שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אין לקחת אמוקסיקלב טבע

- יש לבלוע את הטבליות בשלמותן עם כוס מים עם הארוחה.
- ניתן לחצות את הטבליות לאורך הקו המסומן כדי להקל על הבליעה. יש לקחת את שני חלקי הטבלייה באותו הזמן. אין מידע לגבי כתישה ולעיסה.

- יש לחלק את המנות באופן שווה במהלך היום, לכל הפחות בהפרש של 4 שעות. אל תיקח שתי מנות בשעה אחת.

- אין ליטול אמוקסיקלב טבע למשך יותר משבועיים, אם אתה עדיין מרגיש לא טוב, יש לפנות שוב לרופא.

אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר

אם לקחת בטעות יותר מדי אמוקסיקלב טבע, הסימנים עשויים לכלול אי נוחות בטון (בחילה, הקאה או שלשול) או פרכוסים. פנה לרופא בהקדם האפשרי. קח את אריזת התרופה כדי להראות לרופא.

אם בטעות בלע ילד מל התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול אמוקסיקלב טבע

- אם שכחת לקחת מנה, קח אותה ברגע שאתה מוכר.
- אל תיקח את המנה הבאה במקום מדי, אלא המתן כ-4 שעות לפני נטילת המנה הבאה. אין לקחת מנה כפולה על מנת לפצות על המנה שנשכחה.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אם אתה מספיק לקחת אמוקסיקלב טבע

המשך לקחת אמוקסיקלב טבע עד לסיום הטיפול, אפילו אם אתה מרגיש טוב יותר. כל אחת מהמנות חשובה עבורך על מנת לעזור להילחם בזיהום. אם חלק מהחיידקים שרדו, הם עלולים לגרום לזיהום חוזר.

אין ליטול תרופות בחושרן בודק התוית והמנה בכל פעם שאתה נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באמוקסיקלב טבע עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף מהן.

תופעות הלוואי בהמשך עשויות להתרחש עם תרופה זו.

מצבים שאתה צריך לשים לב אליהם:

תגובות אלרגיות:

- פריחה בעור
- דלקת של כלי דם (*ואסקוליטיס*) אשר עשויה להראות ככתמים אדומים או סגולים בולטים על העור, אך יכולה להשפיע על אזורים אחרים של הגוף
- זורים כאב פרקים, בלוטות נפוחות בצוואר, בבית השחי או במפשעה
- נפיחה, לפעמים של הפנים או הגרון (*אנגיואדמה*), הגורמת לקשיי נשימה
- התמוטטות

• כאבים בחזה הקשורים לתגובה אלרגית עשויים להיות תסמינים של אוטם שריר הלב המשופעל על-ידי אלרגיה (תסמונת קוניס – Kounis Syndrome).

פנה מיד לרופא אם אתה חווה אחד מתסמינים אלה. הפסק לקחת אמוקסיקלב טבע.

דלקת של המעי הגס

דלקת של המעי הגס, גורמת לשלשול מימי המלווה בדרך כלל בדם וריר, לכאב בטן ו/או לחום.

תסמונת אנטרוקוליטיס (דלקת במעי) הנגרמת על-ידי תרופות (DIES)

DIES (Drug-induced enterocolitis syndrome) דווחה בעיקר בילדים שקיבלו אמוקסיצילין/חומצה קלאולאנית. זהו סוג מסוים של תגובה אלרגית עם תסמין עיקרי של הקאות וחזרות ושונות (1-4 שעות לאחר מתן התרופה). תסמינים נוספים יכולים לכלול כאב בטן, עייפות (ישנוניות), שלשול ולחץ דם נמוך.

דלקת חריפה של הלבלב (Acute pancreatitis)

אם יש לך כאבים עזים ומתמשכים באזור הבטן זה יכול להיות סימן לדלקת לבלב חריפה.

פנה לרופא בהקדם האפשרי לקבלת ייעוץ אם אתה חווה תסמינים אלה.

תופעות לוואי לפי שכיחותן:

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אלה עשויות להופיע ביותר מ-1 מכל 10 משתמשים • שלשול (במבוגרים).

תופעות לוואי שכיחות

- אלה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 10 משתמשים
- פטרט (*קנדידה* – זיהום פטרייתי של הגרתיקי, הפה או קפלי העור)
- בחילה, בעיקר כאשר לוקחים מינון גבוה. אם הופיעה בחילה, קח אמוקסיקלב טבע עם הארוחה.
- הקאה
- שלשול (בילדים).

תופעות לוואי שאינן שכיחות

- אלה עשויות להופיע ב- עד 1 מכל 100 משתמשים
- פריחה בעור, גרד
- פריחה בולטת מגודת (*חרלת*)
- בעיות עיכול
- סחרחורת
- כאב ראש.

תופעות לוואי שאינן שכיחות העשויות להופיע בבדיקות הדם שלך:

- עלייה באנזימי כבד.

תופעות לוואי נדירות

- פריחה בעור, שעשויה לכלול שלפוחיות (שנראות כמו כתמים כהים במרכז המוקפים באזור חיזור, עם טבעת כהה מסביב לשוליים – *אדמת רב צורתית [erythema multiforme]*).
- אם אתה מבחין באחד מתסמינים אלה פנה לרופא בדחיפות.

תופעות לוואי נדירות העשויות להופיע בבדיקות דם:

- מספר נמוך של תאים המעורבים בקרישת הדם
- מספר נמוך של תאי דם לבנים.

תופעות לוואי ששכיחותן אינה ידועה (לא ניתן לדעת את השכיחות מתוך הנתונים הקיימים)

- תגובות אלרגיות (ראה לעיל)
- דלקת של המעי הגס (ראה לעיל)
- תסמונת אנטרוקוליטיס (דלקת במעי) הנגרמת על-ידי תרופות (DIES) (ראה לעיל)
- דלקת חריפה של הלבלב (acute pancreatitis) (ראה לעיל)
- דלקת של הקרום העוטף את המוח וחוט השדרה (*מנינגיטיס אספטית*)
- תגובות עוריות חמורות:

- פריחה מפושטת עם שלפוחיות ועור מתקלף. בעיקר סביב הפה, האף, העיניים ואיברי המין (*תסמונת סטיבנס-ג'ונסון*), ותופעה חמורה יותר, הגורמת לקילוף נרחב של העור (יותר מ-30% משטח הפנים של הגוף – *טוקסיק אפידרמל נקרוליזיס*)

- פריחה אדומה מפושטת בעור עם שלפוחיות קטנות המכילות מוגלה (*bullous exfoliative dermatitis*)

- פריחה אדומה קשקשית עם בליטות מתחת לעור ושלפוחיות (*exanthematous pustulosis*)

- תסמינים דמויי שפעת עם פריחה, חום, בלוטות נפוחות, ותוצאות בדיקות דם חריגות (כולל עלייה בכמות תאי הדם הלבנים [אהוינופיליה] ואנזימי הכבד) (תגובה לתרופה הכוללת אהוינופיליה ותסמינים מערכתיים *Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms, DRESS*)

- פריחה המאופיינת בשלפוחיות הממוקמות סביב גלד מרכזי או דמויית מחרוזת פנינים (מחלת IgA ליניארית).

פנה מיד לרופא אם אתה חווה אחד מתסמינים אלה.

- דלקת של הכבד (*הפטטיס*)
- צהבת, הנגרמת על-ידי עלייה של בילירובין בדם (חומר הנוצר בכבד) שלעולה לגרום להצהבת העור ולובן העין
- דלקת של צינורות הכליה
- זמן קרישת דם מוארך
- פעלתנות יתר (היפראקטיביות)
- פרכוסים (באגשים הלוקחים מנות גדולות של אמוקסיקלב טבע או שיש להם בעיות בכליות)
- לשון שחורה הנראית שעירה.

תופעות לוואי העשויות להופיע בבדיקות דם או שתן:

- ירידה חמורה במספר תאי דם לבנים
- מספר נמוך של תאי דם אדומים (*אנמיה המוליטית*)
- גבישים בשתן המובילים לפגיעה חמורה בכליות.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דייווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דייווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדייווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

https://sideeffects.health.gov.il

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.

• אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לשמור במקום יבש מתחת ל-25°C.

אין להשתמש אם הטבליות סדוקות או פגומות.

- אין להשליך תרופות בליבוז או לפסולת הביתית. התייעץ עם הרוקח כיצד לרוקח תרופות שאינן בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

מה מכילה אמוקסיקלב טבע:

נוסף על המרכיבים הפעילים התרופה מכילה גם:

ליבת הטבלייה:

Microcrystalline cellulose, sodium starch glycolate, colloidal silica anhydrous, magnesium stearate.

צפויי הטבלייה:

Hypromellose 5 cp (E464), titanium dioxide (E171), macrogol PEG-400, hypromellose 15 cp (E464).

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:

טבלייה מצופה מוארכת בצבע לבן עם קו חצייה בצד אחד. מוצע אחד של קו החצייה מוטבע 6' ובצידו השני של קו החצייה מוטבע 5'. בצידה השני של הטבלייה מוטבע "A". הטבליות ארוזות באריזת בליסטר בתוך אריזת קרטון. האריזה המשוקת מכילה 14 טבליות.

שם בעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ,

רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020.

שם היצרן וכתובתו:

אאורובינדו פארמה בע"מ, היידראבאד, הודו.

העלון נערך בנובמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 146.13.33189

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

teva