

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקשיירם) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

ריבסטיגמין דקסל 1.5, 3, 4.5, 6 מ"ג, כמוסות

כל כמוסה מכילה ריבסטיגמין (כהידרוגן טארטרט) (Rivastigmine as hydrogen tartrate) (1.5, 3, 4.5 או 6 מ"ג בהתאם).
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 6 " מידע נוסף".

קרא בעיון את העlion עד סופו בטרם תשתחש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמצית על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

טיפול בחולמים בדרגה קלה עדBINONIOT-חמורה של SHITIN (דמנציה) מסוג אלצהיימר הנקרא גם מחלת אלצהיימר.

טיפול בתסמיני SHITIN של מחלת אלצהיימר בדרגה קלה עדBINONIOT-חמורה.

טיפול בתסמיני SHITIN בדרגה קלה עדBINONIOT-חמורה הקשורים למחלת פרקיינסון.

ריבסטיגמין שייר לקבוצת חומרים בשם מעכבי COLESTEATRAZ. במטופלים עם SHITIN (דמנציה) הנובע ממחלה האלצהיימר או ממחלה הפרקיינסון, תאי עצב מסוימים במוח מתים, וגורמים לרמות נמוכות של הנירוטרנסmitter אצטילכולין (חוואר המאפשר לתאי עצב לתקשר זה עם זה). ריבסטיגמין פועל על ידי חסימת האנדזימים שמאפרקים אצטילכולין: אצטילכולין אסטראז ובוטירילכולין אסטראז. על ידי חסימת אנזימים אלה, **ריבסטיגמין דקסל** מאפשר לرمות האצטילכולין במוח לעלות, ומסייעת בהפחחת התסמינים של מחלת האלצהיימר וSHITIN המשויך למחלת הפרקיינסון.

ריבסטיגמין דקסל מיועדת לטיפול בחולמים מבוגרים עם SHITIN (דמנציה) של מחלת אלצהיימר בדרגה קלה עדBINONIOT-חמורה, מחלת מתקדמת (פוגרטיבית) של הפרעת מוח אשר מופיעה בהדרגה על הזיכרון, היכולת האינטלקטואלית וההתנהגות. הnymosot יכולות גם לשמש לטיפול בשיטין מבוגרים החולמים במחלה הפרקיינסון.

קבוצה טיפולית: מעכבי האנזים COLESTEATRAZ.

2. לפני השימוש בתרופה אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (ריבסטיגמין), לנגזרות קרbamato (carbamate) או לכל אחד מהמרכיבים הננספים אשר מכילה התרופה (ראיה סעיף 6).
 - הייתה לך בעת שימוש במדבקת ריבסטיגמין תגובה עורית אשר התפשטה מעבר לגודלה של מדבקת ריבסטיגמין, אם הייתה תגובה מקומית חזקה יותר (างן שלפוחיות, התגברות של דלקת בעור, נפיחות) ואם מצב זה לא השתרף תוך 48 שעות לאחר הסרת המדבקה.
- אם מצבים אלה רלוונטיים לך, יש לידע את הרופא ואין לקחת **ריבסטיגמין דקסל**.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול בריבסטיגמין דקסל, ספר לרופא אם:

- יש לך, או היה לך בעבר, מצב לבבי, כגון דופק לא סדיר או דופק איטי, הארכת מקטע QTc torsade de pointes, או שיש לך רמה נמוכה של אשלגן או מגנזיום בדם.
- יש לך, או היה לך בעבר כיב קיבה עלי.
- יש לך, או היה לך בעבר קשיים בהטלת שתן.

- יש לך, או היי לך בעבר פרוכסום.
 - יש לך, או הייתה לך בעבר אסתמה או מחלת נשימתית חמורה.
 - יש לך, או היה לך בעבר תפקוד לקוי של הכלויות.
 - יש לך, או היה לך בעבר תפקוד לקוי של הכבד.
 - אתה סובל מרעד.
 - משקל גופך נמוך.
 - יש לך תగובות של מערכת העיכול כגון בחילה, הקאה ושלשול. אתה עלול לסבול מהתיibusות (אי-בוד נזליים רב מדי), אם הקאה או השלשול מתמשכים.
- במקרים אלה, יתכן שהרופא יצטרך לעקוב אחריך באופן צמוד יותר במהלך הטיפול בתרופה.

אם לא נטلت **ריבסטיגמין דקסל** למשך יותר משלשה ימים, אל תתיקח את המנה הבאה עד אשר תתייעץ עם הרופא שלך.

ילדים וمتבגרים
השימוש ב**ריבסטיגמין דקסל** אינו רלוונטי לטיפול במחלת אלצהיימר באוכלוסייה ילדים.

תగובות בין תרופתיות
אם אתה לוקח, אם לך תרופה אחרת או אם אתה עשוי לקבל תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אין ליטול **ריבסטיגמין דקסל** בו זמנית עם תרופות בעלות השפעה דומה לריבסטיגמין דקסל. ריבסטיגמין עלול להפריע לתרופות אנטיכוילנרגיות (תרופות המשמשות להקלת עוויתות או התכווציות של הקיבה, לטיפול במחלת פרקינסון או למניעת מחלת הנסעה).

אין ליטול **ריבסטיגמין דקסל** יחד עם מטוקלופרמיד (תרופה המשמשת להקל או למנוע בחילות והקאות). נטילת שתי התרופות יחד עלולה לגרום לביעות, כגון גפ"ים נוקשות וידים רועדות.

אם אתה עומד לעבור ניתוח במהלך נטילת **ריבסטיגמין דקסל**, עליך לידע את הרופא לפני שאתה מקבל חומר הרדמה כלשהם מפני **שריבסטיגמין דקסל** יכולה להגביר את ההשפעות של מרפי שרירים מסוימים במהלך ההרדמה.

יש לנוקוט זהירות בנטילת **ריבסטיגמין דקסל** יחד עם חוסמי-בטא (תרופות כגון: אטנוול המשמשת לטיפול ביתר לחץ דם, תעוקת חזזה ומצבים לבביים אחרים). לקיחת שתי התרופות יחד עלולה לגרום לביעות כגון כאב קצב הלב (ברדי-קרדיה) שモבליה לעילפון או אי-בוד ההכרה.

יש לנוקוט זהירות בנטילת **ריבסטיגמין דקסל** יחד עם תרופות אחרות היכולות להשפיע על קצב הלב שלך או על המערכת החשמלית של הלב (הארכת מקטע QT).

שימוש בתרופה ומדוזן
יש ליטול **ריבסטיגמין דקסל** פעמיים ביום, פעם עם ארוחת הבוקר ופעם עם ארוחת הערב.

הירין, הנקה ופוריות
אם את בהירין או מניקה, חשוב שתאת בהירין או מתכנתת הירין, התיעצי עם הרופא או הרוקח לפני השימוש בתרופה זו.
אין מידע לגבי שימוש בתרופה בנשים בהירין. אם את בהירין, יש לשקול את היתורנות של **ריבסטיגמין דקסל** לעומת יתרונות האפשרויות על העובר. אין להשתמש ב**ריבסטיגמין דקסל** בזמן הירין אלא אם הוא שימוש הכרחי בוואדיות.
לא ידוע אם ריבסטיגמין מופרש בחלב אם, لكن אין להניך במהלך הטיפול ב**ריבסטיגמין דקסל**.

הרופא יאמר לך אם מחלותך מאפשרת לך לנוהג ברכב ולהשתמש במכונות באופן בטוח. **ריבסティגמין דקסל** עשויה לגרום לסתוךורת ולישניות, בעיקר בשלב התיפול או שימושים את המין. אם אתה מרגיש סחרר או ישנוי, אין לנוהג, להשתמש במכונות או לבצע כל פעולה המכנית ריכוז.

3. כיצד תשמש בתרופה?

יש לשמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למין ואופן הטיפול בתרופה.

כיצד להתחיל את הטיפול?

המין ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד.

- בדרך כלל הטיפול מתייחס במנת נמוכה.
- הרופא יגדיל בהדרגה את המנה שלך כתלות בתגובה שלך לטיפול.
- המנה הגדולה ביותר שניתן לך תהיה 6 מ"ג פעמיים ביום.

במהלך הטיפול הרופא יבודק באופן קבוע האם התרופה פועלת עבורה. הרופא גם יעקוב אחר משקל גופך במהלך השימוש שלך בתרופה זו.
אם לא נטלת **ריבסティגמין דקסל** לפחות יותר משלשה ימים, אל תיקח את המנה הבאה עד אשר תתייעץ עם הרופא שלך.

אין לעבור על המנה המומלצת.

נטילת תרופה זו

- ספר למטפל שלך שאתה נטל **ריבסティגמין דקסל**.
- כדי להפיך תועלת מהתרופה, קח את התרופה כל יום.

צורת הנטילה

- קח **ריבסティגמין דקסל** פעמיים ביום, בבוקר ובערב עם האוכל.
- אין ללעוס! יש לבלוע את התרופות בשלמותן עם שתייה.
- אל תפתח את התרופות ואל תכתוש אותן.

אם נטלת בטעות מין גבוה יותר

אם נטלת בטעות מין גבוה יותר מהדרושים של **ריבסティגמין דקסל**, עליך לדוח לרופא שלך. "יתכן כי יהיה צורך בהשגחה רפואית".
אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעלILD מין התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה אליו.
חלק מהאנשים שבטעות לךו יותר מדי **ריבסティגמין** חוו בחילה, הקאה, שלשול, לחץ דם גבוה והזיות. תיתכן גם האטה דופק ועילפון.

אם שכחת ליטול את התרופה

אם שכחת ליטול את המנה של **ריבסティגמין דקסל** בזמן המועד, קח את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה כדי לפצות על המנה שנשכחה.

יש להתميد בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שאתה נטל תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה **זקוק** להם.

אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקח.

כמו בכל תרופה, השימוש בריבוטיגמין דקסל עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת מהמשתמשים. אל תיבהל במקרה רשות תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

שכיחות תופעות הלואן עלולה להיות גבוהה יותר בזמן התחלת הטיפול או כאשר מעלים את מנת התרפיה. בדרך כלל תופעות הלואן תיעלמנה בהדרגה, שכן הגוף יסתגל לתרופה.

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שמופיעות ביוטר ממשמש אחד מעשרה):

- סחרוחות
- איבוד תיאבון
- בעיות בטן כמו בחילה או הקאה, שלשול

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- חרדה
- הזעה
- כאב ראש
- צרבת
- ירידת משקל
- כאב בטן
- תחושת אי שקט
- תחושת עייפות או חולשה
- הרגשה כלילית לא טוביה
- רעד או תחושת הבלבול
- ירידת תיאבון
- סיוטי לילה

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- דיכאון
- קשיי שינה
- עילפון או נפילה מקרית
- שינויים בתפקודו ה cerebral

תופעות לוואי נדירות (תופעות שמופיעות ב-10-1 משתמשים מתוך 10,000):

- כאבים בחזה
- פריחה, גירוד
- פרטוסים
- כיבים בקיבה או במעי

תופעות לוואי נדירות מאוד (תופעות שמופיעות בפחות ממשמש אחד מתוך 10,000):

- לחץ דם גבוה
- זיהום בדרכי השתן
- ראייה של דברים שאינם קיימים (הזריות)
- בעיות עם דופק הלב כגון דופק מהיר או איטי
- דימום במעיים - נראה כדם בצואה או כשמקיאים

- דלקת בלבלב - התסמים כוללים כאבים עזים בחולק העליון של הבطن, בדרך כלל מלאוים בבחילה או בהקאה
- החמרה בתסמים של מחלת פרקיינסון או התפתחות של תסמים דומים כמו נוקשות בשירים, קשיים ביצוע תנועות

תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה (תופעות שכיחותן טרם נקבעה):

- הקאות חמורות העשויות לגרום לקרע בוושט, צינור המחבר בין הפה לקיבה
- התיבשות (אי-בוד נזלים רב מדי)
- הפרעות בכבד (עור צחוב, הצהבה של לבן העיניים, שタン כהה באופן חריג או בחילה, הקאה, עייפות ואיבוד תיאבון לא מוסברים)
- תוקפנות, תחשות חוסר מנוחה
- פעימות לב לא איחודות

מטופלים עם שיטין (דמנציה) הקשור למחלת פרקיינסון:

במטופלים אלה חלק מתופעות הלואוי הן יותר שכיחות. יש להם תופעות לוואי מסוימות נוספות:

תופעות לוואי שכיחות מאוד (תופעות שכיחות ביותר ממשתמש אחד מעשרה):

- רעד
- עילפון
- נפילה מקרית

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שכיחות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- חרדה
- תחשות חוסר מנוחה
- פעימות לב איטיות
- קשיי שינה
- יותר מדי רוק והטיבשות
- תנועות איטיות באופן לא רגיל או תנועות שאתה לא יכול לשולט עליהם
- החמרה בתסמים של מחלת פרקיינסון או התפתחות של תסמים דומים כמו נוקשות בשירים, קושי ביצוע תנועות וחולשה בשירים

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שכיחות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- פעימות לב לא איחודות ושליטה ירודה בתנועות

תופעות לוואי נוספת עם ריבסטיגמין מדבקות שכיחות להופיע גם עם התרופות:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שכיחות ב-10-1 משתמשים מתוך 100):

- חום
- בלבול חמור
- אי שליטה במתן שתן (חוسر יכולת לאוצר שתן כיאות)

תופעות לוואי שאין שכיחות (תופעות שכיחות ב-10-1 משתמשים מתוך 1,000):

- היפראקטיביות (רמה גבוהה של פעילות, חוסר מנוחה)

- תופעות לוואי שכיחותן אינה ידועה** (תופעות לוואי שכיחותן טרם נקבעה):
- תגובה אלרגית במקום הבדיקה של המדבקה, כגון שלפוחיות או דלקת בעור

אם אתה מרגיש אחת מתופעות הלואין האלה, פנה לרופא שלך, יתכן שתצטרכ סיעור רפואי.

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואין חמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה לעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דוח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לתופע המקיים לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- **מנع הרעליה!** תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומ סגור מחוץ להישג ידים וטוווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל ידי כר תמנע הרעליה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- **תנאי אחסון:** אחסון מתחת ל- 25°C .
- אין להשליך תרופות לביב או לפח אשפה ביתי. שאל את הרוקח איך להשליך תרופות שאין בשימוש עוד. אמצעים אלו יסייעו להגן על הסביבה.

6. מידע נוספת

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

Microcrystalline cellulose, gelatin, hypromellose, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), purified water, printing ink.

ריבסטיגמין דקסל 3, 4.5, 6 מ"ג מכילות גם (E172)

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:

ריבסטיגמין דקסל 1.5 מ"ג: כמוסות ג'לטין קשות, בצבע צהוב, עם הדפס "RIVA" בצבע שחור על גוף הוכמוסה.

ריבסטיגמין דקסל 3 מ"ג: כמוסות ג'לטין קשות, בצבע כתום בהיר, עם הדפס "RIVA" בצבע שחור על גוף הוכמוסה.

ריבסטיגמין דקסל 4.5 מ"ג: כמוסות ג'לטין קשות, בצבע קרמל, עם הדפס "RIVA 4.5mg" בצבע שחור על גוף הוכמוסה.

ריבסטיגמין דקסל 6 מ"ג: כמוסות ג'לטין קשות, בצבע כתום בהיר/קרמל, עם הדפס "RIVA 6mg" בצבע שחור על גוף הוכמוסה.

הכמוסות מכילות אבקה בצבע לבן-קרם. גודלי אריזות מאושרים: 14, 28, 56, 84, 112 כמוסות. יתכן שלא כל גודלי האריזות משווים.

שם היצן וכתובתו: ג'נפארם ס.א., שדרת מרתהנוו ה'מ ה-18, פליני אטיקי, 15351, ירושלים. נערך ביולי 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

ריבסטיגמין דקסל 1.5 מ"ג: 152-77-33949-00

ריבסטיגמין דקסל 3 מ"ג: 152-78-33950-00

ריבסטיגמין דקסל 4.5 מ"ג: 152-79-33951-00

ריבסטיגמין דקסל 6 מ"ג: 152-80-33952-00

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

בעל רישום: דקסל בע"מ, רח' דקסל 1, אור עקיבא 3060000, ישראל