

עלון לצריך לפי תקנות הרווחחים (תק Shirim) התשמ"ו – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אתופן 500 טבליות	אתופן 400 טבליות	אתופן 300 כמוסות	אתופן 200 כמוסות
כל טבלייה מכילה: 500 מ"ג אטודולק (etodolac 500 mg)	כל טבלייה מכילה: 400 מ"ג אטודולק (etodolac 400 mg)	כל כמוסה מכילה: 300 מ"ג אטודולק (etodolac 300 mg)	כל כמוסה מכילה: 200 מ"ג אטודולק (etodolac 200 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה פרק 2 "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" ופרק 6 "מידע נוספת".

קיים בעין את העלון עד סוףו בטרם **תשמש בתרופה**. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

لتreatment בסימנים ותסמינים של דלקת מפרקים ניונית ודלקת מפרקים שיגרונית. לטיפול בכאבים.
קבוצה רפואיית: נוגדי דלקת שאינם סטרואידים (NSAIDs).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אטודולק) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (ראה פרק 6).
- אתה סובל **מאי-ספיקת לב חמורה**.
- אתה סובל מאולקוז (כיב עיכולי, נגע קטן או חור בקיבה או בתריסריון) או דימום בקיבה, או שאתה לרך שני אירועים או יותר של אולקוז, דימום או נקב בקיבה.
- היותה לך אי פעם **תגובה אלרגית או תגובה אסתטמטית** (צפצופים, גרד או פריחה בעור) לאחר נטילת אספירין, אתופן או תרופה אחרת מקבוצת נוגדי הדלקת הלא-סטרואידים.
- אתה סובל Mai-Sפיקת כבד או Mai-Sפיקת קלויות חמורות.
- **את בשליש האחרון של ההירין.**
- היה לך בעבר דימום בקיבה או בעמך כתוצאה מנטיילת תרופה נוגדת דלקת לא-סטרואידית.

ازהירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באטופן ספר לרופא אם:

- יש לך מחלת קלויות, לב, או כבד, או שאתה סובל מהפרעה בדם, במיוחד אם אתה נוטל גם תרופות משתנות. המינון צריך להיות הכי נמוך שאפשר ועליך לעבור בדיקות תקופתיות.
- אתה כבר תחת טיפול אחר-טוווח עם תרופה אחרת מאטופן, מכיוון שהרופא ירצה לבצע בדיקות סדירות,

- במיוחד אם אתה קשיש.
- אתה סובל מاصة נזילם (התנפחות הרגליים, הקרטולאים או כפות הרגליים).
- אתה סובל מלחץ דם גבוה או Mai-Spike לב.
- אתה סובל או סבלת בעבר מסותה עוללה להיות בסיכון למצבים אלו (למשל יש לך בעיות לב, היה לך בעבר שocz מוחי או שאתה חושב שאתה עלול להיות בסיכון לשיממה).
- אם יש לך לחץ דם גבוה, סוכרת, כולסטרול גבוה או שאתה מעשן).

תרופות כמו אטופן עלולות להעלות במעט את הסיכון להתקף לב או לשocz מוחי. הסיכון גבוה יותר במינונים גבוהים ובטיפול ממושך. אין לעבר על המינון או משך הטיפול המומלצים.

תופעות לוואי חמורות במערכת העיכול כמו דימום, כאב ונקב עלולות להופיע בכל זמן שהוא במהלך הטיפול עם או ללא תסמיני זהירותה במטופלים בתרופות מקובצת נוגדי דלקת לא סטרואידים. אם יש לך סימן כלשהו לדימום במערכת העיכול **יש להפסיק מיד** את השימוש באטופן.

אם אתה עובר בדיקת דם או בדיקת שתן, עדכן את הרופא שאתה נוטל אטופן מכיוון שתרופה זו יכולה להשפיע על התוצאות.

ילדים וمتבגרים אטופן אינו מומלץ לשימוש ילדים.

תగובות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם לך תרופה לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עליך לרופא או לרוקח. במיוחד אם אתה לוקח:

- תרופות אנטייתרומבטיות כגון אספירין (מניעת צימות של טסיות דם)
- ציקלוספורין או טקרולימים (המשמשים לאחר השתלות איברים)
- דיאזוקסין - לטיפול בעויות לב
- ליתיום - לטיפול במחלות נפש
- מתוטרקסאט - לטיפול במחלות כגון ספקת או דלקת מפרקים שיגורונית
- קורטיקוסטרואידים (כגון פרדניזולון)
- אנטיביוטיקה משפחחת הקווינולוניים כמו למשל ציפרופלאקoxicין
- תרופות לטיפול ביתר לחץ דם
- מייפריסטן (להפסקת הירין) במהלך 12 הימים האחרונים
- נוגדי דלקת לא סטרואידים אחרים כגון אספירין, איבופרופן, נפרוקסן, דיקלופנק
- נוגדי דיכאון משפחחת מעכבים ברירניים של ספיגה חוזרת של סרוטוניין (SSRI)
- תרופות משתנות
- זידובידין (טיפול ב- HIV)

שימוש בתרופה ומזון יש ליטול התרופה עם או אחרי הארוחה.

הירין והנקה

אם את בהירין, מניקה, חושבת שאתה בהירין או מנסה להיכנס להירין, פני לרופא או לרוקח לפני השימוש

בתרופה.

הירון

עליך להודיע לרופא אם יש לך קשיים בכניסה להירון. נוגדי דלקת לא סטרואידים עלולים להקשות על כניסה להירון.

אין לשימוש בתרופה אם את בשלושת החודשים האחרונים של ההירון מכיוון שזה עלול להזיק לעובר או לגרום לביעות בלבד.

התכשיר עלול לגרום לביעות בכליות ובלב של העובר. התכשיר עלול להשפיע על הנטיה של היולדת או של העובר לדם ולגרום לכך שהלידה תהיה מאוחרת יותר או ארוכה יותר מהצפוי.
אין ליטול אתופן במהלך ששת החודשים הראשונים של ההירון אלא אם זה ממש הכרחי וכך הרופא המליץ עלשות. אם את זקוקה לטיפול במהלך תקופה זו או כשת מנסה להיכנס להירון, יש ליטול את המינון הנמור ביותר לתקופה הקצרה ביותר האפשרית.
נטילת אתופן למשך יותר מסמך ימים החל מהשבוע ה-20 להירון יכולה לגרום לביעות בכליות בעובר שיכולות להוביל למיוט משפירות או היצרות של כלי דם (צינור עורקי) בלבד העובר. אם את זקוקה לטיפול במשך יותר מסמך ימים, ניתן שהרופא ימליץ על ניתוח נוספת.

הנקה

אין לשימוש באטופן במהלך הנקה. לא ידוע אם התרופה עוברת לחלב אם. לא מומלץ לשימוש במהלך הנקה אלא אם הרופא חושב שזה הכרחי.

נהיגה ושימוש במכונות

אתופן עלול לגרום לסחרחות, נמנום או הפרעות בראיה. אם אתה חש בתסמינים אלו אין לנוהג או להפעיל מכונות מסוכנות כאשר אתה נוטל אתופן.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

התרופה מכילה לקטוז. אם נאמר לך בעבר על-ידי רופא שיש לך אי-סבילות לSOCרים מסוימים, פנה לרופא לפני התחלת הטיפול בתרופה זו.

התרופה מכילה פחוט מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) במנה כך שלמעשה נחשבת נטולת נתרן.

3. כיצד לשמש בתרופה?

יש לשימוש בתכשיר תמייד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד. המינון המקובל בדרך כלל הוא:

טיפול בדלקת מפרקית: טיפול התחלתי של 800-1200 מ"ג ליום המחולקים ל-2-4 מנות ולאחר מכן טיפול אחזקי של 600-1200 מ"ג ליום המחולקים ל-2-4 מנות.

טיפול כאבים: טיפול התחלתי של 400 מ"ג ליום ולאחר מכן 400-200 מ"ג כל 8-6 שעות או 600 מ"ג פעמיים ביום ולאחר מכן 600 מ"ג פעמיים ביום, לפי הצורך.

אין לעובר על מינון כולל של 1200 מ"ג ליום!

אם אתה קשיש, הרופא יודא שאתה נוטל את המנה הנמנוכה ביוטר ולזמן הקצר ביותר, בגל הסיכון לתופעות לוואי חמורות.

אין לעובר על המנה המומלצת.

- יש לבלווע את התוֹרֶוףָה בשלמותה עם כוֹס מִים.
- אין ליעוֹס, לחוץ או לכתוש!

שימוש בילדים אתופן אינו מומלץ לשימוש בילדים.

אם נטלה בטיעות מינון גבורה יותר או אם בטיעות בלבד מלבד מינון ביתן חולים, והבא אריזת התוֹרֶוףָה איתה. התסמנינים של מנת יתר כוללים כאב ראש, בחילה והקאה, כאב בטן, דם בזואה או צואה שחורה דמוית זפת. במקרים נדירים שלשול, חסור התמצאות, עירור, תרדמת, נמנום, סחרורת, צלצולים באוזניים, התעלפות ופרכוים. במקרים של מנת יתר ממשוערת יתכן גם אי-ספיקת כלות ונזק לנבד.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן המועד, אין ליטולמנה כפולה. קח את המנה בזמן הרגיל והיוועץ ברופא.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוֹרֶוףָה והמנה **בכל פעע** שאתה נוטל תרופה. הרכיב משקפיים אם אתה זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתוֹרֶוףָה, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש באטופן עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואין. יתכן שלא תסבול מ一封 אחת מהן. תופעות הלואין החmorות ביותר הן תגבות אלרגיות, אי-ספיקת לב, שbez מוח, אי-ספיקת כלות, אי-ספיקת כבד, דלקת לבלב ודלקת אספטיית של קровם מוח. אם אתה סובל מ一封 התופעות המתוארות בהמשך, **הפסיק ליטול אתופן** ופנה מיד לרופא.

תסמינים של תגבות אלרגיות:

- צפיפות, קשיי נשימה או קוצר נשימה,
- נפיחות בפנים, בשפטים, בפה או בלשון,
- פריחה נרחבת, קילוף או שלפוחיות בעור, גרד מתמשך.

תסמינים של הפרעות לבב ובמחזר הדם:

- כאב בזכה, לחץدم גבוה, נפיחות בקרסולרים, דפיקות לב, מספר סוגים של אנמיה או הפרעות אחרות בדם, חבורות לא צפויות ודימום.

תסמינים של בעיות בהקיבנה ובمعنىים (מערכת העיכול):

- דם בזואה,
- צואה שחורה דמוית זפת,
- הקאת דם או חלקיקים כהים שנראים כמו גרגירי קפה.

תסמינים של אי ספיקת כלות:

- קושי או כאב במתן שתן, שינוי הצבע של השתן או השתנה בתדריות גבוהה יותר או נמוכה יותר מהרגיל.

תסמינים של אי-ספיקת כבד ודלקת לבב:

- צהבת (הצהבה של העיניים או העור), כאבי בטן, תוצאות חריגות של בדיקות תפקודי כבד.

- תסמינים של דלקת אספיטית של קרום המוח**
- מקרה חמור ונדר של דלקת אספיטית של קרום המוח עלול לקרות במטופלים עם מחלות אוטואימוניות אחרות כמו זאבת או מחלת רקמת חיבור מעורבת.
- התסמינים של דלקת אספיטית של קרום המוח הם:
- חום גבוה מאד, הקאות, כאבי ראש, פריחה בכתמים שאינם נעלמים בהפעלת לחץ על העור (ייתכן שלא יתפתחו), נזיפות בצוואר, רגשות לאור, נמנום ופרכוסים.

תופעות לוואי נוספות

- הפרעות תחושתיות כמו כאבי ראש, צלצולים או זמזום באוזניים, סחרחות, ראייה לא תקינה, היזות, עקצוץ, דקירות ותחושים בעירה בעור (סיכות ומחתים), ורטיגו (תחושא שכל העצם סביבה זרים או מסתובבים).
 - בעיות במערכת העיכול כמו כאבים בפה, כאבים בבחילות, הקאות, אי-נוחות בבטן, שלשול, עצירות, נפיחנות (газים), צרבת, קלקלול קיבת.
 - הפרעות בעור כמו נפיחות ברקמות, גרד בעור, פריחה, אדומות.
 - הפרעות כליליות כמו חום, נמנום, עייפות, חולשה, נדודי שינה, רעד, עצבנות, דיכאון, בלבול.
- אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואה חמירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא צינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח תופעות לוואי

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקיים לדוח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטוויה ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי קר תמנע הרעליה. אל תגרום להקה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

תנאי אחסון

- אטופן 400/300/200: יש לאחסן מתחת ל- -25°C .
- אטופן 500: יש לאחסן מתחת ל- -25°C . יש לאחסן במקום קרייר ויבש.
- אין להשליך תרופה לביב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:

אטופן 200, כמוסות:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, povidone, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide; Capsule shell contains gelatin, water, titanium dioxide, sodium lauryl sulphate, iron oxide red, iron oxide black, FD&C Red 3.

אטופן 300, כמוסות:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, povidone, magnesium stearate, colloidal silicon dioxide; Capsule shell contains gelatin, water, titanium dioxide, sodium lauryl sulphate,

iron oxide red.

אתופן 400, טבליות:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, povidone, sodium starch glycolate, magnesium stearate; Tablet coating contains hydroxypropyl methyl cellulose, titanium dioxide, PEG 400, iron oxide red, iron oxide yellow.

אתופן 500, טבליות:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, povidone, sodium starch glycolate, magnesium stearate; Tablet coating contains hydroxypropyl methyl cellulose, titanium dioxide, PEG 400, D&C Yellow #10 Aluminium Lake, FD&C Blue #1 Aluminium Lake and FD&C Red #40 Aluminium Lake.

כיצד נראית התרופה ומה תוכן האזינה:

אתופן 200, כמוסות:
כמוסות ג'לטיין בצבע ורוד כהה, עם הדרישה "ETO 200 MG" בשחור על גוף הcapsule והכיסוי, מילוי של אבקה בצבע לבן עד אופ-ו-ויט.
הכמוסות ארוזות בבליסטרים. כל אריזה מכילה 5, 20, 30 או 100 כמוסות.

אתופן 300, כמוסות:

כמוסות ג'לטיין בצבע ורוד בהיר, עם הדרישה "ETO 300 MG" בשחור על גוף הcapsule והכיסוי, מילוי של אבקה בצבע לבן עד אופ-ו-ויט.
הכמוסות ארוזות בבליסטרים. כל אריזה מכילה 6, 30 או 100 כמוסות.

אתופן 400, טבליות:
טבלייה מצופה בעלת צורת קפסולה, בצבע אפרסק. מצידה האחד מוטבע: "T88".
הטבליות ארוזות בבליסטרים. כל אריזה מכילה 10, 12, 30 או 100 טבליות.

אתופן 500, טבליות:
טבלייה מצופה בעלת צורה אליפטית, בצבע כחול. מצידה האחד מוטבע: "TARO", מצידה השני: "89".
הטבליות ארוזות בבליסטרים. כל אריזה מכילה 4, 20 או 30 טבליות.

"ת-can שללא כל גודלי האריזות משוווקים.

שם היוצרים ובעל הרישום וכ כתובתו:
תרו תעשייה רוקחית בע"מ, רח' הקיטור 14, מפרץ חיפה 2624761

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אתופן 200	10570.29074
אתופן 300	10571.29075
אתופן 400	10569.28990
אתופן 500	11492.29689

נערך בספטמבר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

**למידע נוסף על התכשיר ולעלונים מעודכנים בשפות עברית, ערבית ואנגלית סירקו את הקוד הבא:
For further information about the medicinal product and for updated patient leaflets in Hebrew, Arabic and English, please scan the code:**



אתו芬 500



אתו芬 400



אתו芬 300



אתו芬 200

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/105%2070%2029074%2000>

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/105%2071%2029075%2000>

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/105%2069%2028990%2000>

<https://israeldrugs.health.gov.il/#!/medDetails/114%2092%2029689%2000>

ניתן לפנות לבועל הרישום של התכשיר בבקשתו לקבל עליון מודפס לצריכן בשפה האנגלית בכתב הדואר האלקטרוני Info@taro.com או בטלפון מספר 1-800-464-664.

For a printed copy of the patient information leaflet in English, please contact the registration holder by email Info@taro.com or by phone 1-800-464-664.