

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدالمة (مستحضرات) - 1986

يسوّق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

ريفاستيجمين دِكسل

تحتوي كل كبسولة على ريفاستيجمين (على شكل هيدروجين تارترات)

(Rivastigmine as hydrogen tartrate)

3, 1.5, 4.5 و 6 ملغ على التوالي.
مواد غير الفعّالة وموزجات في الدواء – انظر بند 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بإمعان حتى نهايتها قبل أن تستعمل الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات مملّخصة عن الدواء. إذا كانت لديك أسئلة إضافية، توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي.

هذا الدواء وصفك لعلاج مرض آلزهايمر أيضاً مرض آلزهايمر. فهو قد يسبب الضرر لهم حتى إذا بدا لك أن مرضهم مماثل.

1. لأي غرض مُخصّص الدواء؟

لعلاج مرضى بدرجة بسيطة حتى متوسطة-وخيمة من الخرف (dementia) من نوع ألزهايمر المسمى أيضاً مرض ألزهايمر. لعلاج أعراض الخرف لمرض ألزهايمر بدرجة بسيطة حتى متوسطة-وخيمة.

لعلاج أعراض الخرف بدرجة بسيطة حتى متوسطة-وخيمة المتعلقة بمرض ألباركينسون.

ينتمي ريفاستيجمين إلى فصيلة مواد تسمى مثبطات كولين إستيراز. لدى مرضى الخرف (dementia) الناتج عن مرض ألزهايمر أو مرض باركينسون، تموت خلايا عصبية معينة في الدماغ، وتؤدي لانخفاض مستويات الناقل العصبي أستيثيل كولين (مادة تسمح بالاتصال بين الخلايا العصبية). ريفاستيجمين يعمل عن طريق حجب الإنزيمات التي تتفكك أستيثيل كولين:

أستيثيل كولين إستيراز وبيوتيريل كولين إستيراز. بواسطة حجب هذه الإنزيمات، **ريفاستيجمين** **ديكسل** يسمح بارتفاع نسب أستيثيل كولين في الدماغ، ويساعد على تقليل أعراض مرض ألزهايمر والخرف الذي يُنسب لمرض باركينسون.

ريفاستيجمين دكسل مخصص لعلاج مرضى كبار لديهم خرف (dementia) من مرض ألزأهايمر بدرجة بسيطة حتى متوسطة- وخيمة. مرض متقدم (متزايد) من اضطراب دماغي الذي يؤثّر بالتدرّج على الذاكرة، القدرة الذهنية وعلى السلوك. يمكن أن تستعمل الكبسولات أيضاً لمعالجة الخرف لدى كبار المصابين بمرض باركينسون.

الفصيلة العلاجية: مثبطات الإنزيم كولين إستيراز.

2. قبل استعمال الدواء

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (ألبرجي) للمادة الفعّالة (ريفاستيجمين)، لمشتقات الكاربامات (carbamate) أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (انظر بند 6).
- كان لديك رد فعل جلدي أثناء استعمال لصفة ريفاستيجمين الذي انتشر بما يتجاوز حجم لصفة ريفاستيجمين. إذا حصل لديك رد فعل موضعي أكثر شدة (مثل حويصلات، التهاب جلدي شديد) (انظر) وإذا لم تتحسن هذه الحالة خلال 48 ساعة بعد إزالة الليفة.
- إذا كانت تلك الحالات تنطبق عليك، يجب إعلام الطبيب ولا يجوز أخذ ريفاستيجمين دكسل.

تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء

قبل العلاج بريفاستيجمين دكسل، أخبر الطبيب إذا:

- يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي ، حالة قلبية، مثل نبض غير

منتظم أو نبض بطيء، إطالة مقطع QTc، سابقة عائلية لإطالة مقطع QTc، اضطراب في النظم من نوع تسرع القلب البطيني (torsade de pointes- ضغيرة التوتّوات)، أو لديك انخفاض في نسبة البوتاسيوم أو المغنيزيوم في الدم.

- يوجد لديك، أو كانت لديك في الماضي قرحة معدية نشطة.
- يوجد لديك، أو كانت لديك في الماضي صعوبات في التبول.
- يوجد لديك، أو كانت لديك في الماضي اختلاجات.
- يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي ربو أو مرض تنفسي شديد.
- يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي خلل في وظيفة الكلى.
- يوجد لديك، أو كان لديك في الماضي خلل في وظيفة الكبد.
- كنت تعاني من رجفان.
- وزن جسمك منخفض.

يوجد لديك ردود فعل للجهاز الهضمي مثل غثيان، تقيؤ وإسهال. قد تعاني من الجفاف (فقدان السوائل أكثر من اللازم)، في حال إستمرار التقيؤ أو الإسهال.

في هذه الحالات، فمن الجائز أن يحتاج الطبيب مراقبة وضعت بشكل ملائم أكثر خلال فترة العلاج بالدواء. إذا لم تتناول **ريفاستيجمين دكسل** لفترة أكثر من ثلاثة أيام، فلا تتناول الجرعة التالية حتى تقوم باستشارة طبيبك.

الأطفال والمراهقون

إن استعمال **ريفاستيجمين دكسل** ليس له صلة لمعالجة مرض ألزهايمر لدى فئه الأطفال.

التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تأخذ، إذا أخذت في الأونة الأخيرة أو إذا يحتمل أن تأخذ **أدوية أخرى** بما في ذلك أدوية بدون وصفة وإضافات تغذية، **أخبر الطبيب أو الصيدلي بذلك.**

لا يجوز تناول **ريفاستيجمين دكسل** بنفس الوقت مع أدوية ذات تأثير مشابه ل**ريفاستيجمين دكسل**.

ريفاستيجمين قد يعرقل تأثير الأدوية المضادة للفعل الكوليني (أدوية تستعمل للتخفيف من تشنجات أو تقلصات المعدة، لمعالجة داء باركينسون أو لمنع دوار السفر).

لا يجوز تناول **ريفاستيجمين دكسل** سوية مع ميتوكلوپراميد (دواء يستعمل للتقيف أو لمنع الغثيان والتقيؤ). إن استعمال الدوائين بالتزامن قد يسبب مشاكل، مثل أطراف متصلبة ويدين مرتجتفتين.

إذا كنت مقبلاً على إجراء عملية جراحية خلال فترة تناول **ريفاستيجمين دكسل**، عليك إعلام الطبيب قبل أن تتلقى أية مواد للتخدير وذلك لأن **ريفاستيجمين دكسل** قادر على أن يزيد من تأثيرات بعض مرخيات العضلات خلال التخدير.

يجب إتخاذ الحذر عند تناول **ريفاستيجمين دكسل** سوية مع حاجبات بيتا (أدوية مثل: أيتينولول الذي يستعمل لمعالجة ارتفاع ضغط الدم، النجحة الصدرية وحالات قلبية أخرى). إن تناول الدوائين سوية قد يسبب مشاكل مثل تباطؤ نبض القلب (تباطؤ القلب) التي تؤدي للأغماء أو فقدان الوعي.

يجب توخي الحذر عند تناول **ريفاستيجمين دكسل** سوية مع أدوية أخرى التي يمكن أن تؤثر على نظم قلبك أو على النظم الكهربائي للقلب (إطالة مقطع QT).

استعمال الدواء والطعام

يجب تناول **ريفاستيجمين دكسل** مرتين في اليوم، مرة مع وجبة الفطور ومرة مع وجبة العشاء.

الحمل، الإرضاع والخصوبة

إذا كنت حامل أو مرضعة، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، إستبيري الطبيب أو الصيدلي قبل استعمال هذا الدواء. لا توجد معلومات بخصوص استعمال الدواء لدى النساء الحوامل. إذا كنت حامل، يجب دراسة حسنات **ريفاستيجمين دكسل** مقابل التأثيرات المحتمل حدوثها للجنين. لا يجوز استعمال **ريفاستيجمين دكسل** خلال فترة الحمل إلا إذا كان الإستعمال ضرورياً بالتاكيد.

ليس معروفاً فيما إذا كان ريفاستيجمين يفوز في حليب الأم، لذلك لا يجوز الإرضاع خلال فترة العلاج ب**ريفاستيجمين دكسل**.

السياقة واستعمال الآلات

يبلغك الطبيب فيما إذا كان مرضك يسمح لك بقيادة المركبة واستعمال الآلات بشكل آمن. من شأن **ريفاستيجمين دكسل** أن يسبب دوار ونعاس، خاصة عند بداية العلاج أو عند رفع المقدار الدوائي. إذا كنت تشعر بدوار أو نعاس، فلا يجوز السياقة، إستعمال الآلات أو إجراء أي نشاط يتطلب التركيز.

3. كيفية استعمال الدواء؟

يجب إستعمال الدواء دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا بخصوص الجرعة وطريقة العلاج بالدواء.

كيف عليك البدء بالعلاج؟

الجرعة وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط.

- يتم عادة بدء العلاج بجرعة منخفضة.
- يقوم الطبيب برفع جرعتك بالتدريج كأمر متعلق بإستجابتك للعلاج.
- الجرعة الأعلى التي يمكن أخذها هي 6 ملغ مرتين في اليوم.

خلال فترة العلاج يقوم الطبيب بشكل دائم بفحص فيما إذا كان الدواء يعمل من أجلك. يقوم الطبيب أيضاً بمراقبة وزن جسمك خلال فترة إستعمالك لهذا الدواء.

إذا لم تتناول **ريفاستيجمين دكسل** لفترة أكثر من ثلاثة أيام، فلا تتناول المقدار الدوائي التالي حتى تستشير طبيبك.

لا يجوز تجاوز الجرعة الموصى بها.

تناول هذا الدواء

أخبر الشخص الذي يعتني بك بأنك تتناول **ريفاستيجمين دكسل**.

للحصول على الفائدة من الدواء، خذ الدواء كل يوم.

طريقة تناول

خذ **ريفاستيجمين دكسل** مرتين في اليوم، في الصباح وفي المساء مع الطعام.

لا يجوز المضغ! يجب بلع الكبسولات بشكلها الكامل مع مشروب.

- لا تقم بفتح الكبسولات ولا تقم بسحقها.

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى

إذا تناولت عن طريق الخطأ جرعة أعلى من المطلوب من **ريفاستيجمين دكسل**، عليك إبلاغ طبيبك. قد تكون هناك حاجة لمراقبة طبية.

إذا تناولت جرعة مفرطة أو إذا بلع وُلد من الدواء بالخطأ، توجه فوراً لفرقة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك. قسم من الأشخاص الذين تناولوا عن طريق الخطأ أكثر من اللازم من ريفاستيجمين شعروا بغثيان، تقيؤ، إسهال، ارتفاع ضغط الدم وهذيان. من الجائز أن يحدث أيضاً تباطؤ بالنبض وأغماء.

إذا نسيت تناول الدواء

إذا نسيت تناول جرعة **ريفاستيجمين دكسل** في الوقت المخصص، خذ الجرعة التالية في الوقت المعتاد. لا يجوز تناول جرعة مضاعفة لتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المتابعة مع الطبيب إذا طرا تحسن في وضعت قبل الطبيب. حتى إذا طرا تحسن في وضعت الصحي، لا يجوز إيقاف العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في الظلام! تحقق من الملتصق والجرعة في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع نظارات إذا كنت بحاجة للجنين. لا يجوز إستعمال **ريفاستيجمين دكسل** خلال فترة الحمل إلا إذا كان

الدواء، **إستشر الطبيب أو الصيدلي.**

4. الأعراض الجانبية

كما في كل دواء، قد يسبب استعمال **ريفاستيجمين دكسل** أعراض جانبية لدى جزء من المستخدمين. لا تفرّج من قراءة قائمة الأعراض الجانبية. قد لا تصاب بأية واحدة منها.

إن شيوخ الأعراض الجانبية قد يكون أكبر عند بدء العلاج أو عند رفع جرعة الدواء. عادة ما تزول الأعراض الجانبية بالتدرّج، لأن الجسم سيتعود على الدواء.

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة):

- دوار
- فقدان الشهية
- مشاكل في البطن مثل غثيان أو تقيؤ، إسهال

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 100):

قلق

تعرق

ألم رأس

حرقان

تناقص الوزن

ألم في البطن

الشعور بعدم الهدوء

الشعور بارهاق أو ضعف

شعور عام غير جيد

إرتجاج أو الشعور بارتباك

انخفاض في الشهية

كوابيس ليلية

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 1,000):

إكتئاب

صعوبات في النوم

إغماء أو سقوط عوفي

تغيرات في وظائف الكبد

أعراض جانبية نادرة (أعراض تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 10,000):

ألم في الصدر

طفح، حكة

إختلاجات

قرحات في المعدة أو في الأمعاء

أعراض جانبية نادرة جدًا (أعراض التي تظهر لدى أقل من مستخدم واحد من بين 10,000):

ضغط دم مرتفع

عدوى في المسالك البولية

روية أشياء غير موجودة (هلوسة)

مشاكل في نبض القلب مثل نبض سريع أو بطيء
نزف في الأمعاء - يبدو على شكل دم في البراز أو عند التقيؤ
التهاب البنكرياس - الأعراض تشمل الإم شديدة في القسم العلوي من البطن، تترافق عادة بغثيان أو تقيؤ
تفاقم أعراض مرض باركينسون أو تطور أعراض مشابهة مثل تصلب العضلات، صعوبة في تنفيذ الحركات

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعتها بعد):

- تقيؤات شديدة التي من شأنها أن تؤدي لتمزق في المريء، الأنيوب الواصل بين الفم والمعدة
- تحفّاف (فقدان سائل كثير جدًا)
- اضطرابات في الكبد (اصفرار الجلد، إصفرار بياض

العينين، بول داكن بشكل شاذ أو غثيان، تقيؤ، إرهاق وفقدان شهية غير مبرر)

- عدوانية، الشعور بعدم راحة
- عدم تناسق ضربات القلب

مرض مع خرف (dementia) المتعلق بمرض باركينسون:
قسم من الأمراض الجانبية لدى هؤلاء المرضى هي أكثر شيوعًا. وتظهر لديهم أعراض جانبية معينة إضافية:

أعراض جانبية شائعة جدًا (أعراض تظهر لدى أكثر من مستخدم واحد من بين عشرة):

- إرتجاج
- فقدان الإغماء
- سقوط عوفي

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 100):

قلق

الشعور بقلة راحة

تباطؤ ضربات القلب

صعوبات في النوم

زيادة اللعاب عن اللازم وتجفاف

حركات بطيئة بشكل غير عادي أو حركات التي لا تستطيع أن تسيطر عليها

تفاقم أعراض مرض باركينسون أو تطور أعراض مشابهة مثل تصلب العضلات، صعوبة في تنفيذ حركات وضعف العضلات

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 1,000):

أعراض جانبية إضافية التي بلغ عنها مع ريفاستيجمين لصفات والتي يمكن أن تظهر أيضاً مع الكبسولات:

أعراض جانبية شائعة (أعراض تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 100):

سخونة

إرتباك وخيم

عدم السيطرة على التبول (عدم القدرة على تخزين البول بالشكل الصحيح)

أعراض جانبية غير شائعة (أعراض تظهر لدى 10-11 مستخدمين من بين 1,000):

- فرط النشاط (زيادة مستوى النشاط، قلة راحة)

أعراض جانبية شيوعتها غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعتها بعد):

رد فعل تحسسي في موضع لصق اللصقة، مثل حويصلات أو التهاب في الجلد

إذا كنت تشعر بوحد من هذه الأعراض الجانبية، توجه إلى طبيبك. قد تحتاج لمساعدة طبية.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم أحد الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يُذكر في النشرة، عليك استشارة الطبيب.

يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "دعونا نعل توفעות لخواي عقوب تسيول الرفوفتي" الموجود في الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه إلى النموذج الانترنتي للتبليغ عن أعراض جانبية. أو عن طريق الدخول للرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أيدي ونظر الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (**تاريخ انتهاء الصلاحية**) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يرجع إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
- شروط التخزين:** خزن تحت ال 25 درجة مئوية.
- لا يجوز التخلص من الأدوية عن طريق مصرف المياه أو المنافيات المنزلية. إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد في الاستعمال. هذه الخطوات تُساهم في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضاً على:

Microcrystalline cellulose, gelatin, hypromellose, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, titanium dioxide (E171), yellow iron oxide (E172), purified water, printing ink.

ريفاستيجمين دكسل 3, 4.5, 6 ملغ يحتوي كذلك على **Red iron oxide (E172)**

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:

ريفاستيجمين دكسل 1.5 ملغ: كبسولات جيلاتين صلبة، بلون أصفر، مع الختم "RIVA 1.5mg" بلون أسود على جسم الكبسولة.

ريفاستيجمين دكسل 3 ملغ: كبسولات جيلاتين صلبة، بلون برتقالي فاتح، مع الختم "RIVA 3mg" بلون أسود على جسم الكبسولة.

ريفاستيجمين دكسل 4.5 ملغ: كبسولات جيلاتين صلبة، بلون كرامل، مع الختم "RIVA 4.5mg" بلون أسود على جسم الكبسولة.

ريفاستيجمين دكسل 6 ملغ: كبسولات جيلاتين صلبة، بلون برتقالي فاتح/كرامل، مع الختم "RIVA 6mg" بلون أسود على جسم الكبسولة.

تحتوي الكبسولات على مسحوق بلون أبيض -كريم. أحجام عبوات مصدق عليها: 28, 14, 56, 84, 112 كبسولة. قد لا تكون جميع أحجام العبوة مشروقة.

إسم المنتج وعنوانه: جينيفارم إس.إي، جادة مروتونس الكيلومتر آل- 18، بايلني أنيكس، 15351، اليونان. تم تحريرها في تموز 2023 وفقاً لتعليمات وزارة الصحة. رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

ريفاستيجمين دكسل 1.5 ملغ: 00-33949-77-00-152

ريفاستيجمين دكسل 3 ملغ: 00-33950-78-152

ريفاستيجمين دكسل 4.5 ملغ: 00-33951-79-152

ريفاستيجمين دكسل 6 ملغ: 00-33952-80-152

للتبسيط وتسهيل القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكّر. على الرغم من ذلك، الدواء مُخصّص لكلا الجنسين.

Rivastigmine Dexcel Caps PIL PB1123-05

صاحب التسجيل: دكسل م.ض .

شارع دكسل 1، أور عقيفاً 3066000، إسرائيل