

ملغ) في القنينة، لهذا يعتبر بشكل أساسي "خاليا من الصوديوم".

3. كيف تستعمل الدواء؟

عليك استعمال المستحضر دائمًا حسب تعليمات الطبيب.
عليك أن تفحص مع الطبيب أو الصيدلي إذا لم تكن متأكداً فيما يتعلق بالجرعة وبطريقة العلاج بالمستحضر.

إذا مكثت في المستشفى لأي سبب كان، عليك دائمًا إبلاغ الطبيب أو الممرضة بأنك تستعمل الدواء. يمكنك أيضاً أن تضع سواراً أو قلادة عنق (بطاقةتعريف طبية) لكي يعرف الطاقم الطبي أنك تتلقى علاجاً بدواء ستيروديدي وذلك في حال تعرضك لحادث أو فقدان الوعي.

الجرعة وطريقة العلاج يحددهما الطبيب فقط. تتم ملائمة الجرعة الموصى بها وفق الحالة الطبية، المكان، وطريقة الإعطاء.

يقرر الطبيب موقع الحقن، كمية الدواء التي تحصل عليها، وعدد الحقنات التي تحتاجها وذلك وفق الحالة التي تتلقى علاجاً من أجلها ووفق مستوى خطورتها أيضاً. يحقن الطبيب لك الجرعة الأكثر انخفاضاً لفترة العلاج الأقل حتى تنخفض الأعراض بشكل أفضل.

البالغون

سيخبرك الطبيب أو الممرضة بعدد الحقنات التي تحتاجها لعلاج حالتك ومتى تحصل عليها.

الجرعات الموصى بها:

المفاصل:

تعتمد الجرعة الاعتيادية من الحقنات داخل المفصل على حجم المفصل.
للمفاصل الكبيرة (مثل الركبة، الكاحل، والكتف) قد تكون هناك حاجة إلى جرعة مقدارها 20-80 ملغ (0.5-2 مل)، للمفاصل متوسطة الحجم (مثل الكوع أو المعصم) جرعة مقدارها

10-40 ملغ (0.25-1 مل)، وللمفاصل الصغيرة (مثل مفاصل أصابع كف اليد أو راحة القدم)، جرعة مقدارها 4-10 ملغ (0.1-0.25 مل). قد تُعطى الحقنات في المفاصل مرة في الأسبوع طوال بضعة أسابيع، وذلك اعتماداً على سرعة استجابتك للعلاج.

التهاب الجراب (bursitis)، التهاب الوتر (tendinitis) والتهاب اللقيمة (epicondylitis):

الجرعة الاعتيادية هي 30-40 ملغ (0.75-1 مل). في معظم الحالات ليس هناك حاجة إلى إجراء حقنات إضافية لالتهاب الجراب (bursitis)،

- العضلات، العظام، والمفاصل**

 - كسور أو علاج في العظام.
 - ضمور العضل.
 - نفکاك العضلات سبب خلل في تدفق الدم، الذي يسبب الماء في الفخذ.
 - الم في المفاصل.
 - مترق أو اثار العضلات الذي يسبب الماء وألتوه.
 - تضخم العضلات أو تنتجها في العضل.
 - تورم أو الم في المفاصل سبب عدوى.
 - ضعف العضلات.
 - تضخم العضل.
 - شاشة العظام (عظام قابلة للكسر سهلة).

اضطرابات في الجهاز العصبي والمزاج

قد تؤدي الستربوروديات بما في ذلك ديبو-مدروول مع ليدوكتين إلى مشاكل نفسية خطيرة. هذه المشاكل شائعة لدى البالغين والأطفال، وقد تؤثر على 5 أشخاص من بين 100 شخص يستعملون أدوية مثل ديبو-مدروول مع ليدوكتين.

 - شعور بالاكتئاب، بما في ذلك أفكار انتحارية.
 - شعور بالانهيار (هوس) أو تقلبات مزاجية.
 - شعور بالقلق، مشكل في النوم، مفعومة في التفكير أو حالة من الارتباط.
 - فقدان الذاكرة.
 - شعور، رغبة أو سعاده غير حقيقة. أفكار غريبة ومحفزة تغدو طرفة عينك أو تشعرك بالوحدة.

قد تشمل الأعراض الجانية الأخرى في الجهاز العصبي على نوافذ (اختلالات)، فقدان الذاكرة (amnesia)، اضطرابات ذهنية (تباين نفسية)، رجفان، دوخة وسذاجة، تعاس، مفعومة في التفكير أو في النقص.

 - بالرورة، حمى أو خدر، طفل أو فقدان الوعي.
 - الم في الظهر أو ضعف (تنبحة ودم شحري فوق الجافية، هذا الإضطرار نادر، تكون فيه كمية غير عادية من الدهنيات على غلاف المعدود الفقير أو خارجه).

الجلد

 - حب الشباب.
 - كدمات.
 - خرجا، لا سيما في موقع الحقن.
 - ترقق الجلد، علامات توتر الجلد.
 - بعض جالية شاحنة أو دائمة أكثر، أو بعض مرتفعة ذات لون غير عادي.
 - زيادة شعر الجسم والوجه (فرط الشعر).
 - طفح، حارر الجلد، حكة، وشرى.
 - تعزق مفترط.

إذا ظهر أحد الأعراض الجانية، إذا تذكر في الشارة، عليك استشارة الطبيب من الممكن تبليغ وزارة الصحة بأعراض دائمة من خلال خطوط الرابط "التبليغ عن أعراض جانية تنبيه لعلاج دوائي" موجود على الصفحة الرئيسية في موقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) والذي يحوك إلى استشاري إنترنتي التبليغ عن الأعراض الجانية، او دخول الرابط <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيف يُخَرِّن الدواء؟

 - يُعيّن الشخص المسمى بـ "جهاز حفظ هذا الدواء، وكل دواء آخر، في مكان مغلق بعيدًا عن متناول أشخاص ومحال روية الأولاد والأطفال، وهذا تجنب التسمم. لا يجوز التسipp بالاتفاق مع دون تعليمات صريحة من الطبيب.
 - لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية (exp. date) الظاهر على المعلبة. يُعيّن تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الآخر من ذات الشهر.
 - يجب التخزين درجة حرارة تحت 25°C. يُعيّن التجميد.

6. معلومات إضافية

إضافة إلى المركب الفعال، يحتوي الدواء أيضًا على:

lacrogol 3350, benzyl alcohol (E1519), sodium chloride, myristyl-gamma-picolinium chloride, sodium hydroxide, hydrochloric acid, water for injection. كذلك، يحتوي كل 1 مل على 8.7 مل من الكحول البنزيلي وكابر الصوديوم (انظر الفصل 2).

كيف يُبَدِّي الدواء وما تَحْوي المبْوَدة:

فتبيه زجاجية متكوني على 50 مل متعلق لونه أبيض في عبوة كرتون.

صاحب التسجيل وعنوانه: فايزر بي إيه إس مناعة الأدوية إسرائيل، شارع شعارت 97-98، هرتسليا بيترج 46725.

رقم تسجيل الدواء في سجل الأدوية الرسمي في وزارة الصحة 045-23829-23829.

لتلبية قراءة هذه الشرة وتسهيلاً ورد النصوص بصيغة المذكورة. فالمواد معد للاجئين.

تم تحديثها في تاريخ 07/2023 وفق تعليمات وزارة الصحة.

OR-Dep-Med-Lid-PIL-1223

إذا ظهر أحد هذه الأعراض الجانية التالية أو إذا عانيت من أعراض غير عادلة ولم تذكر في الشارة، توجه إلى الطبيب فورا.

قد تحدث أعراض الجانية التالية بوتيرة غير معروفة (أعراض لم تحدد وتيرة انتشارها بعد):

الطب والأوعية الدموية

 - ضغط مد متقطع، تشنج الأعراض على صداع أو شعور عام سيء.
 - وتيرة نظم قلب بطانية (bradycardia).
 - مشكلات في عمل القلب (arrhythmia)، تشتمل الأعراض على تورم الكاحلين، مفعومة في النفس وضربات قلب (خفقان، الشعور بضربات القلب) أو ضربات قلب غير منتظمة، نبض غير منتظم أو سريع جداً أو بطيء، وسكنة قلبية.
 - ضغط مد متضخم، قد تشتمل الأعراض على دوخة، إغماء، إحساس بالدوار، تقطّع الرؤية، نبض سريع أو غير منتظم (ضربات قلب شديدة، خفقان).
 - ارتفاع ضغط الدم (ارتفاع ضغط الدم البوليسيوم) (leukocytosis).
 - زيادة تغيرات.
 - ارتفاع الحرارة، وأحرار الجلد (torzed, Flushing).

تواءل السائل والملامح في الجسم

 - تورم وضغط مد مرتفع نتيجة ارتفاع مستويات الماء والألم في الجسم.
 - تضادات وتنشجات نتيجة فقدان البوتاسيوم في الجسم. في حالات نادرة قد يؤدي هذا إلى قصور عمل القلب الاحتقاني (عندما لا ينفصل القلب كما ينبغي).

الجيوب الهضمي

 - قرحة.
 - تضيوات.
 - غثيان.
 - فتق في المريء (انزاج أثناء الابتلاع).
 - مشكلات في الهضم.
 - إسهال.
 - انفاس المعدة.
 - الم في البطن.
 - حالات تجشّو.

الأذنين

 - شعور بالدوار أو الدوخة (vertigo).

العيون

 - ارتفاع الضغط في العين، الذي يسبب الماء في العينين وصداعاً.
 - اكتار اكت (متربط بالاضطراب الروي).
 - تورم العصب البصري وقد يسبب اضطرابات في الروي.
 - زيادة الضغط داخل العين مع حدوث ضرر محتمل في عصب الروي (متربط بالاضطراب الروي).
 - ارتفاع الضغط الشاقق في مقمة العين (القرنية) أو الجزء الأبيض من العين (باص العين).
 - تفاق حالات عدوى فيروسية أو فطرية في العين.
 - بروز مقلة العين نحو الخارج (بروز العين).
 - عمى، ضبابية الروي، أو روبيا مزدوجة.
 - ضبابية الروي أو تشتت الروي (تنبيه مرض في الشبكية والمتيمبية [choroid]).

اضطرابات في المرارة والكبد

 - يمكن أن يسبّب بيريتيزولون ضرراً في الكبد. تم الإبلاغ عن حالات التهاب الكبد (hepatitis) وارتفاع إنزيمات الكبد.
 - شفاء الجروح غير جيد.
 - عصبية.
 - شعور بالتنفس أو شعور سيء.
 - ردد فعل تحسسي، مثل تفعيل الدواء أو تفعيل دواء مع صفير وصعوبة إثناء التنفس أو دوخة. هذا العرض الجاني نادر، ولكنه قد يكون خطيراً.
 - التهاب البنكرياس (pancreatitis)**، وهو في البطن قد ينتشر إلى المريء، وقد يكون مصحوباً بتقيؤات، صدمة، وفقدان الوعي.
 - الدلاع فرحاً أو تزيف من الفرحة، تشتمل أعراض هاذن الحالات على المظاهر في البطن قد يتدلى إلى الظهر وقد يكون متربطاً بزيادة في المستقيم، دوره شهري غير منتظمة أو غياب الدورة الشهرية لدى النساء.
 - زيادة الشهارة وارتفاع الوزن.
 - تكساس الدهنيات في الأنسجة في أماكن غير عادية أو تدكّس دهنيات شبيهة بالرمل.
 - قد يؤدي العلاج المتواصل إلى اخفاض مستويات بعض البروتينات، التي قد تسبّب اخفاض ضغط الدم والدوخة. قد يُعيّن هذا التأثير طوال أشهر.
 - قد ترتفع كمية الأنزيمات (ALP, AST, ALT) بسبب تنشيطها في مرحلة مبكرة قد تنتهي إلى ذلك، انت مرتعض لارتفاع أكبر لنطوير عدوى خطيرة في البطن.
 - التهاب القافق، التهاب (تهيج) الصفاق، التشنج الدقيق الذي يعطي الجدار الداخلي على لبها بعد التخلص من الدواء من الجسم بشكل طبيعى. الأعراض هي لم شديد في البطن، وحساسية في البطن، قد يُفَاقِم الالم عند ملامسة البطن أو أثناء تحريك الجسم.
 - اصمام رئوي (ختة دموية في الرئة، تشتمل الأعراض على الم حاد وмагاري في الصدر، ضيق في التنفس وسعال دموي).
 - ارتفاع الضغط داخل الحلق لدى الأطفال (ورم دماغي كاذب)، تشتمل الأعراض على صداع مصحوب بتنقيبات، قلة الطاقة، ونعاس. يظهر هذا العرض الجنيني قبل الالتحاق بالعالم.
 - التهاب الأعراض على ترم، الم، حمار، وحساسية في الأوردة.

قد تكون هناك حاجة إلى مقاتلات متكررة لعلاج الحالات المتواصلة.

المسنون

يكون العلاج غالباً شبيهاً بالعلاج لدى البالغين، ولكن قد يُرغَب الطبيب في رؤيته في أحجان قريبة أكثر وفحص كيف يؤثر الدواء فيه.

الأطفال

تصنف الطبيب الجرعة الدوائية الأكثر انخفاضاً التي تكون ناجحة لإنك.

يمنع تجاوز الجرعة الموصى بها.

إذا كنت تعتقد أنك حصلت على حقن أكثر مما كان يتعين عليك، توجه إلى الطبيب فورا.

إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.

يجب الدعاوى على العلاج وفق توصيات الطبيب.

حتى إذا طرأ حصن على هناك المصحة، لا يجوز لك التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

التوقف عن/خفض جرعة ديبو-مدروول مع ليدوكتين

سيقرر الطبيب متى يجب إيقاف العلاج.

يجب التوقف عن العلاج ببطء إذا:

 - تليق أكثر من 6 مل (0.15 مل) ديبو-مدروول مع ليدوكتين لأكثر من ثلاثة أيام.
 - تليق جرعة مرتفعة من ديبو-مدروول مع ليدوكتين، أكثر من 32 مل (0.8 مل) في اليوم، حتى إذا تم إعطاؤها لمدة ثلاثة أسابيع فقط أو أقل.
 - كنت قد حصلت على علاج يشتمل على أعراض أخرى أو حقن كانت لديك مشكل في الغدد الكظرية (قصور عمل قشرة الغدة الكظرية) قبل بدء العلاج.
 - كان لديك مشكل في الغدد الكظرية (قصور عمل قشرة الغدة الكظرية) قبل بدء العلاج.

يجب التوقف عن العلاج تدريجياً منع حدوث أعراض المقطم.

قد تنتهي هذه الأعراض على جلد حاد، مما تزغرق وفقدان الوعي، والمصل، وكاء، الصاق العينين، تزغرق، وفقدان الوعي.

توجه إلى الطبيب فوراً إذا ظهرت أعراض مجدداً أو تفاقمت عند فرض جرعة الدواء.

يمكن تناول الأدوية في الظل! تتحقق من الملصق على عبوة الدواء ومن الجرعة الموصى بها في كل مرة تتناول فيها دواء. وضع النظارات الطبية إذا كنت بحاجة إليها.

إذا كنت لديك أسلمة أخرى بالنسبة إلى استعمال الدواء، استشير الطبيب، الصيدلي أو الممرضة.

4. الأعراض الجانية

جميع الأدوية، يمكن أن يسبّب استعمال ديبو-مدروول مع ليدوكتين أعراضًا جانبية لدى بعض المستخدمين. لتفتح عن فراء قائمة الأعراض الجانبية.

فن المحتفل الأعراض التي تزغرق من أي منها.

وصف كل الطبيب الدواء لعلاج حالتك، التي قد تتفاقم إذا لم تُعالج كما ينبغي.

هذاك بعض الحالات الطبية التي لا يجوز فيها إيقاف الأدوية مثل ديبو-مدروول مع ليدوكتين (ستربوروديات) بشكل مفاجئ. إذا عانيت من عرض واحد أو أكثر من الأعراض التالية عليك التوجه إلى الطبيب فوراً.

يقرر الطبيب فيما إذا كان يمكنك تناوله العلاج ديبو-مدروول مع ليدوكتين.

ردد فعل تحسسي، مثل تفعيل الدواء أو تفعيل دواء مع صفير وصعوبة إثناء التنفس أو دوخة. هذا العرض الجاني نادر، ولكنه قد يكون خطيراً.

التهاب البنكرياس (pancreatitis)، وهو في البطن قد ينتشر إلى المريء، وقد يكون مصحوباً بتقيؤات، صدمة، وفقدان الوعي.

الدلاع فرحاً أو تزيف من الفرحة، تشتمل أعراض هاذن الحالات على المظاهر في البطن قد يتدلى إلى الظهر وقد يكون متربطاً بزيادة في المستقيم، دوره شهري غير منتظمة أو غياب الدورة الشهرية لدى النساء.

زيادة الشهارة وارتفاع الوزن.

تكساس الدهنيات في الأنسجة في أماكن غير عادية أو تدكّس دهنيات شبيهة بالرمل.

قد يؤدي العلاج المتواصل إلى اخفاض مستويات بعض البروتينات، التي قد تسبّب اخفاض ضغط الدم والدوخة. قد يُعيّن هذا التأثير طوال أشهر.

تشتمل الأعراض على حفظ حمارة حمارة وعسر تنفس، وقد يُعيّن العمال في الصدر عرضين لإذابة عدوى البطن التي تظهر في المرضى، بالإضافة إلى ذلك، انت مرتعض لارتفاع أكبر لنطوير عدوى خطيرة في البطن.

التهاب القافق، التهاب (تهيج) الصفاق، التشنج الدقيق الذي يعطي الجدار الداخلي على لبها بعد التخلص من الدواء من الجسم بشكل طبيعى.

الاعراض هي لم شديد في البطن، وحساسية في البطن، قد يُفَاقِم الالم عند ملامسة البطن أو أثناء تحريك الجسم.

اصمام رئوي (ختة دموية في الرئة، تشتمل الأعراض على الم حاد وмагاري في الصدر، ضيق في التنفس وسعال دموي).

ارتفاع الضغط داخل الحلق لدى الأطفال (ورم دماغي كاذب)، تشتمل الأعراض على صداع مصحوب بتنقيبات، قلة الطاقة، ونعاس. يظهر هذا العرض الجنيني قبل الالتحاق بالعالم.

التهاب الأعراض على ترم، الم، حمار، وحساسية في الأوردة.

تصنف الطبيب الجرعة الدوائية الأكثر انخفاضاً التي تكون ناجحة لإنك.

يُنْهَى عن طرق الخطا، جرعة أعلى.

إذا كنت تعتقد أنك حصلت على حقن أكثر مما كان يتعين عليك، توجه إلى الطبيب فورا.

إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.

يجب الدعاوى على العلاج وفق توصيات الطبيب.

حتى إذا طرأ حصن على هناك المصحة، لا يجوز لك التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

الالتهاب غمد الوتر (tenosynovitis)، والتهاب اللقمة (epicondylitis).

يكون العلاج غالباً شبيهاً بالعلاج لدى البالغين، ولكن قد يُرغَب الطبيب في رؤيته في أحجان قريبة أكثر وفحص كيف يؤثر الدواء فيه.

الاطفال

تصنف الطبيب الجرعة الدوائية الأكثر انخفاضاً التي تكون ناجحة لإنك.

يُنْهَى عن طرق الخطا، جرعة أعلى.

إذا كنت تعتقد أنك حصلت على حقن أكثر مما كان يتعين عليك، توجه إلى الطبيب فورا.

إذا ابتلع طفل من الدواء عن طريق الخطأ، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ التابعة للمستشفى مصطحبًا معك عبوة الدواء.

يجب الدعاوى على العلاج وفق توصيات الطبيب.

حتى إذا طرأ حصن على هناك المصحة، لا يجوز لك التوقف عن العلاج بالدواء من دون استشارة الطبيب.

التوقف عن/خفض جرعة ديبو-مدروول مع ليدوكتين

سيقرر الطبيب متى يجب إيقاف العلاج.

يجب التوقف عن العلاج ببطء إذا:

 - تليق أكثر من 6 مل (0.15 مل) ديبو-مدروول مع ليدوكتين لأكثر من ثلاثة أيام.
 - تليق جرعة مرتفعة من ديبو-مدروول مع ليدوكتين، أكثر من 32 مل (0.8 مل) في اليوم، حتى إذا تم إعطاؤها لمدة ثلاثة أسابيع فقط أو أقل.
 - كنت قد حصلت على علاج يشتمل على أعراض أخرى أو حقن كانت لديك مشكل في الغدد الكظرية (قصور عمل قشرة الغدة الكظرية) قبل بدء العلاج.
 - كان لديك مشكل في الغدد الكظرية (قصور عمل قشرة الغدة الكظرية) قبل بدء العلاج.