

## نورثير™ 100 ملغم أقراص

أقراص مطلية وكميتها:  
يحتوي كل قرص على:  
**Ritonavir 100 mg**  
**ريتونافير 100 ملغم**

انظر "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" في الفقرة 2.  
لقائمة المركبات غير الفعالة الكاملة الرجاء مراجعة الفقرة 6 "معلومات إضافية" في هذه النشرة.  
اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.  
وُصف هذا الدواء لعلاج مرضك/أجلك، لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك من مرضهم مشابه لمرضك/حالتهم الطبية مشابهة لحالتك. يستعمل نورثير لدىأطفال من عمر سنتين وما فوق، لدى مراهقين وكبار الذين أصيبوا بـHIV، القيروس المسبب للإيدز. لا يوصى بإستعمال نورثير لدىأطفال بعمر سنتين وما دون ذلك.

### 1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يحتوي نورثير على المادة الفعالة ريتونافير.  
ينتمي نورثير إلى فصيلة مثبطات البروتياز المستعملة للسيطرة على تلوث HIV.  
يُعطى الدواء نورثير لوحده أو بمشاركة أدوية أخرى مضادة لـHIV (أدوية مضادة للقيروسات الرجعية) من أجل السيطرة على تلوث HIV. سوف ينقاش معك الطبيب حول مزيج الأدوية الأصح بالنسبة لك.  
الفصيلة العلاجية: من مثبطات البروتياز.

### 2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الergicي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (لقائمة المركبات غير الفعالة أنتظراً الفقرة 6 "معلومات إضافية").
- يوجد لديك مرض كبدي شديد.
- كنت تتناول حالياً واحداً من بين الأدوية التالية:
  - أستيميزول أو ترفينادين (أدوية التي تستعمل عادة لعلاج أمراض الرئويّة من الجائز أن تتوفر هذه الأدوية بدون وصفة طبية).
  - أميدارون، بيرينديل، درونيدارون، إنكائينيد، فيليكائينيد، بروپافينون، كيندين (أدوية تستعمل لتنظيم نظم القلب).
  - إرغونوثين، ميتيل إرغونوثين (أدوية لعلاج الشقيقة).
  - يمكن حدوثها بعد الولادة أو الإجهاض).
  - ميدازولام فموي (يؤخذ عن طريق الفم)، فلورازيبام، إستازولام، كلورازيبات، ديزازيبام وتريازولام (أدوية للحث على النوم و/أو لتخفيف القلق).
  - بيموزيد، كلوزاپين (أدوية لعلاج الشذوذ).
  - كويتيابين (دواء لعلاج إفرازات الشخصية، إضطراب ثنائي القطب وإضطراب إكت ABI).  
- رانولازين (دواء لعلاج ألم مزمن في الصدر [ذبحة صدرية]).
  - بروپوكسيفين، بيتيدين (أدوية لتخفيف الألم).
  - سيزاپيريد (دواء للتخفيف من مشاكل معينة في المعدة).
  - ريفابوتين (دواء لمنع/علاج تلوثات معينة).
  - فوريكونازول (دواء لعلاج التلوثات الفطرية).
  - لوڤاستاتين، سيمفاستاتين، لوميتاپيد (أدوية لخفض الكوليسترول في الدم).
  - نيزاتينيب (دواء لعلاج سرطان الثدي).
  - ألفوزوسين (دواء لعلاج تضخم غدة البروستات).
  - حمض الفوسفديك (دواء لعلاج التلوثات الجرثومية).
  - سيلدينافيل، عند معاناته من مرض رئوي يسمى فرط ضغط الدم الرئوي - pulmonary arterial hypertension الذي يسبب صعوبة التنفس. بإمكان المتعالجون الذين لا يعانون من فرط ضغط الدم الرئوي، تناول سيلدينافيل لعلاج العجز الجنسي (impotence) تحت مراقبة طبية (انظر الفقرة 2) إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك".
  - أفالانافيل أو فاردينافيل (أدوية لعلاج العجز الجنسي).
  - كولشيسين (دواء لعلاج النقرس)، إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى وأو الكبد (انظر الفقرة 2) إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية. العرن في الأدوية النباتية التي تتابع بدون وصفة طبية.

\* قد يقرر طبيبك بأنه يمكنك تناول ريفابوتين و/أو فوريكونازول مع نورثير بمقدار دوائي منخفض (booster) لكن لا يجوز تناول مقدار دوائي كامل من نورثير سوية مع هذين الدوائيين.

إذا كنت تتناول واحداً من الأدوية التي ذكرت آنفًا، إسأل الطبيب عن تبديله لدواء آخر أثناء تناول نورثير.

الرجاء قراءة قائمة الأدوية في فقرة 2 إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك" بالنسبة لتناول نورثير مع أدوية أخرى تتطلب الإنتباه الخاص.

### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

يستشر طبيبك قبل تناول نورثير.

معلومات هامة:

- إذا كنت تتناول نورثير بمشاركة أدوية أخرى مضادة للقيروسات الرجعية، من المهم أيضًا أن تقرأ بشكل جيد النشرات للمستهلك المرققة مع هذه الأدوية. من الجائز وجود معلومات إضافية بتلك النشرات بالنسبة للحالات التي يجب فيها الإمتناع عن تناول نورثير. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول نورثير (ريتونافير) أو حول أدوية إضافية وصفت لك، راجع الطبيب أو الصيدلي.
- نورثير لا يشفي من تلوث HIV أو الإيدز.
- لا يزال الأشخاص الذين يتناولون نورثير بإمكانهم تطوير تلوثات أو أمراض أخرى مرتبطة بتلوث HIV أو الإيدز. لذلك من المهم أن تخضع لمراقبة الطبيب المعالج أثناء تناول نورثير.

### قبل العلاج بـ نورثير، إحكام للطبيب إذا:

كنت تعاني أو عانيت في الماضي من:

- إلتهاب الكبد B أو C و كانت ت تعالج بمضاركة أدوية مضادة للقيروسات الرجعية، نظرًا لأنك معرض لخطرة أكبر لتطور رد فعل خطير لا بل يشكل خطرًا على الحياة جراء التأثير على الكبد. من الجائز أن يحتاج الأمر إجراء فحوص دم روتينية للتأكد من سلامه الأداء الوظيفي للكبد.
- الناغور، نظرًا لأنه يبلغ عن زيادة في الأنفحة لدى مرضى الناغور الذين يتناولون أدوية من هذا النوع (مثبطات البروتياز). سبب حدوث ذلك هو أمر غير معروف. من الجائز أن يحتاج الأمر تناول دواء إضافي الذي يساعد على تخفير الدم (Factor VIII) (أنظر أيضًا في الفقرة 2) لا يجوز إستعمال الدواء على أية أنفحة.
- مشاكل في إنتصاب القضيب التناسلي قد تؤدي إلى إنخفاض ضغط الدم وإلى إنتصاب مطول للقضيب التناسلي.
- السكري، نظرًا لأنه يبلغ عن حالات لتفاقم أو تطور السكري لدى مرضى معينين الذين يتناولون مثبطات البروتياز.
- مرض الكلري، لأنه من الجائز أن يضرط الطبيب فحص الجرعات الدوائية للأدوية الإضافية التي تتناولها (مثل مثبطات البروتياز).

خلال فترة العلاج بالدواء، إحكام للطبيب إذا كنت تشعر:

• إسهال أو تقيؤ لا يتحسن (مطوية)، لأن هذا الأمر من شأنه أن يضعف من نجاعة الأدوية التي تتناولها.

• غثيان، تقيؤات أو آلام في البطن، لأنها قد تدل على التهاب البنكرياس (pancreatitis). بعض المرضى الذين يتناولون نورثير يمكن أن تتطور مشاكل شديدة في البنكرياس لديهم. يجب إبلاغ الطبيب بأسرع ما يمكن إذا إنطبق عليك هذا الأمر.

• أعراض لتلوث - بلغ الطبيب في الحال، لدى بعض المرضى الذين يعانون من تلوث HIV متقدم (إيدز) والذين يبدأون علاجاً مضاداً لـHIV، يمكن أن تتطور لديهم أمراض لتلوثات مختلفة كما هو مفصل أدناه.

يكونوا على علم بإصابتهم بها. يمكن تعليل ذلك بأن إستجابة جهاز مناعة الجسم تتحسن وتتساعد لتناول أحد الأدوية لتلوث الدم الشرياني.

قد تتطور إضطرابات مناعية ذاتية بعد أشهر عديدة من بدء العلاج. من أجل تلقي العلاج المطلوب، يجب إبلاغ الطبيب على الفور إذا كنت تلاحظ أعراض لتلوث أو أمراض أخرى بما في ذلك هورمونية.

الإيدز، قد تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة نسيج سليم في الجسم (حيث تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة نسيج سليم في الجسم) بعد بدء تناول أحد الأدوية لعلاج تلوث الدم الشرياني.

قد تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة نسيج سليم في الجسم (حيث تحدث عندما يهاجم جهاز المناعة نسيج سليم في الجسم) بعد بدء تناول أحد الأدوية لعلاج تلوث الدم الشرياني.

• دوار، الشعور بإغماء، إغماء أو عدم إنتظام نظم القلب.

قد يقتبس بعض المرضى الذين يتناولون نورثير من تغيرات في فحص التخطيط الكهربائي للقلب (ECG) (تغير في النشاط الكهربائي في القلب) - بلغ الطبيب إذا كانت لديك مشاكل في القلب أو مشاكل في نظم القلب (مشكلة في التوصيل).

• إذا وجدت لديك أية مشكلة طبية أخرى، إسأل طبيبك بأسرع ما يمكن.

الأطفال والمرأهقون: لا يوصى بإستعمال نورثير لدى أطفال بعمر سنتين وما دون ذلك.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية: إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت، أو إذا تناولت نورثير أو تناولت نورثير لدواء للعمر الجنسي.

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت نورثير قد يرفع من نسبة هذا الدواء في الدم. لا يجوز تناول نورثير مع كولشيسين (دواء للنقرس)، إلا إذا وجدت لديك مشاكل في الكلى وأو الكبد (انظر الفقرة 2) إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أو دوائية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك".

الرجاء قراءة قراءة قائمة الأدوية في فقرة 2 إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أو دوائية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك" بالنسبة لتناول نورثير.

\* قد يقرر طبيبك بأنه يمكنك تناول ريفابوتين و/أو فوريكونازول مع نورثير سوية مع هذين الدوائيين.

إذا كنت تتناول واحداً من الأدوية التي ذكرت آنفًا، إسأل طبيبك عن تبديله لدواء آخر أثناء تناول نورثير.

الرجاء قراءة قراءة قائمة الأدوية في فقرة 2 إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخرًا، أو دوائية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك" بالنسبة لتناول نورثير.

• مضادات حيوية (مثل: إريتروميسين، كلاريتروميسين):

• أدوية لعلاج السرطان (مثل: أيماسيكلين، إفانتينيب، سيريتينيب، قينيتيلاستين):

• أدوية لعلاج تلخمير (مثل: دابيجاتران، إيتاراكونازول، إيدوكسابان، ريفاروكسابان، ثوراپاكسار، وارفارين):

• أدوية مضادة للإكتئاب (مثل: أميريتينيب، ديزيريتينيب، فلوكوكسيتين، إيميريتين، نيفازودون، نورتربيتيلين، پاروكسيتين، سيرترالين، ترازودون):

• أدوية لعلاج الفطريات (مثل: كيتوكونازول، راتيغافير، زيدوفودين):

• أدوية مضادة لللقيوسات (مثل: بيداكويلين، ديلامانيد):

• دواء مضاد لللقيوسات لعلاج تلوث الدم (HCV) لدى الكبار (مثل: چليکاپريثير، پيرينتايسير):

• أدوية لعلاج القلق، بوسبيرون: أدوية لعلاج الرعب، تيوفيللين، سالميتيرول:

• أدوية لعلاج المخاطر، دواء لعلاج نوع معين لإلتهاب الرئتين والملاриا:

• بوبينورفرين، دواء للتوقف عن التدخين:

• أدوية لعلاج الصرع (مثل: كاربامازيبين، ديثالپروپوكس، لاموتريجين، فينيتيلين):

• أدوية لعلاج مشاكل القلب (مثل: ديزوپرياميد، ديليتيناميد، نيفيدبين):

• مثبطات الكالسيوم (مثل: سيكلوسوسبيرون، تاكروليموس، إيقافوليموس):

• ليقوتيلوكسيدين (علاج أمراض الغدة الدرقية):

• مورفين وأدوية شبيهة بالمورفين لتسكين الآلام القوية (مثل: ميتادون، فنتانيل):

• أدوية للحث على النوم (مثل: ألبازولام، زولپيديم) وميدازولام الذي يعطي مهدئه (مثل: هالوپيريدول، ريسپيريدون، تيوريدازين):

• كولشيسين، دواء لعلاج النقرس (gout). هناك أدوية لا يمكن تناولها أبداً مع نورثير. أنظر أعلاه قائمة الأدوية في

الفقرة 2 "لا يجوز إستعمال الدواء إذا".  
إستعمال الدواء والطعام:  
يجب تناول أقراص نورثير سوية مع الطعام.

الحمل، الإرضاع والخصوبة:  
إذا كنت حاملاً، تعتقدين بأنك حامل أو تخططين للحمل، من المهم جداً أن تستشيري الطبيب المعالج حول ذلك قبل تناول هذا الدواء. هناك معلومات بإسهاب حول إستعمال ريتونافير (ritonavir)، المادة الفعالة في نورثير خلال فترة الحمل. بشكل عام، النساء الحوامل تلقين ريتونافير بعد الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل بمقدار دوائي منخفض (booster) بعد أدوية أخرى من فصيلة مثبطات البروتيناز. لم يظهر أن نورثير سوية مع أدوية أخرى من فصيلة مثبطات البروتيناز. لم يظهر أن نورثير قد زاد من إحتمالية تطور عيوب خلقية بالمقارنة لعامة السكان. من غير الموصى به للإرضاع لدى النساء الحاملات لفيروس HIV وذلك لأن الفيروس قد ينتقل إلى الرضيع عبر حليب الأم. إذا كنت مرضعة، أو تخططين للإرضاع، فليك إستشارة الطبيب المعالج بأسرع ما يمكن.

السيادة وإستعمال الماكنتات:  
من شأن نورثير أن يسبب الدوار. إذا كنت تشعر بأن الدواء يؤثر عليك بهذا الشكل، يجب الإمتناع عن السيادة وإستعمال الماكنتات.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:  
يحتوي نورثير على صوديوم. يحتوي هذا الدواء على أقل من 1 ميليمول (23 ملг) صوديوم في كل قرص، ولذلك يعتبر حالياً من الصوديوم!

**3. كيفية إستعمال الدواء؟**  
يجب دائماً إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر. الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.  
**طريقة التناول**

يجب بلع الأقراص بشكلها الكامل. لا يجوز المضغ، الكسر أو السحق.

يجب تناول الدواء مع الطعام.  
يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.  
يجب تناول نورثير كل يوم وذلك للسيطرة على مرضك، دون أن يكون هناك صلة بتحسن شعورك العام. إذا منعك عرض جانبي من تناول نورثير حسب إرشادات الطبيب، فعليك إبلاغ الطبيب عن ذلك على الفور. في الفترات التي تعاني فيها من إسهالات من الجهاز أن يقرر الطبيب الذي يعالجك أن هناك حاجة إلى إجراء مرأفة ومتابة إضافية.  
احتفل دائمًا بكمية كافية من نورثير لكي لا ينفك عنك الدواء. في الرحلات أو عند المبيت في المستشفى، تأكّد من أن بحوزتك كمية كافية من نورثير إلى أن تتمكن من إقتناء الدواء مجدداً.  
إذا تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر  
إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة، فمن الجائز أن تعاني من خدر، الشعور بوخز أو الشعور ب وخز.

إذا تناولت جرعة دوائية مفرطة أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.  
إذا نسيت تناول أقراص نورثير  
يجب تناول جرعة حال تذكرك.

إذا تذكرت قريباً لموعده تناول الجرعة الدوائية القادمة، فتناول الجرعة الدوائية القادمة فقط في الوقت الإعتيادي واستشر الطبيب. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتغويض عن الجرعة الدوائية المنصية.

إذا توقفت عن تناول نورثير  
لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية. إن الفرصة الأفضل لإعاقة مقاومة الفيروس للأدوية، هي تناول نورثير بحسب توصية الطبيب.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلحة إضافية بما يتعلق بإستعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.  
**4. الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، إن إستعمال نورثير قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تذهب من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن لا تعاني أي منها.

من الجائز أن تحدث زيادة في الوزن وبنسب الجلوكوز والشحوم في الدم خلال فترة علاج HIV. هذا الأمر متعلق بشكل جزئي بتحسين صحتك ونمط حياتك، وبالنسبة لإرتقاء نسب الشحوم في الدم، يتطرق الأمر أحياناً بالأدوية ذاتها المستعملة لعلاج HIV. يفحص طبيك هذه التغيرات.

كذلك، فإن الأعراض الجانبية لـ نورثير، عندما يعطي سوية مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات الرجعية، تتعلق بالأدوية الأخرى. لذا من المهم أن تقرأ بتعمق فقرة الأعراض الجانبية في نشرات الأدوية الأخرى.

أعراض جانبية شائعة (common) - أعراض تظهر لدى 10-100% من المستعملين  
• ردود فعل تحسسية تشمل طفح جلدي (من الجائز حدوث إحمرار، بروز وحكة)، إنتفاخ شديد للجلد ولأنسجة أخرى

• أرق  
• قلق  
• ارتفاع الكوليسترول  
• ارتفاع التريجيلايسيريدات (Gout)  
• نزف في المعدة  
• إلتهاب الكبد وإصفرار الجلد أو إصفرار العينين  
• زيادة التبول  
• تناقص الأداء الوظيفي الكلوي  
• إلتهاب الكلوي  
• إنخفاض نسب الصفيحات الدموية  
• عطش (تجفاف)  
• أذى في المفاصل والظهر  
• فقدان الشهية للطعام  
• تقرحات في الفم  
• آلام عضلية، حساسية أو ضعف العضلات  
• سخونة  
• فقدان الوزن  
• تغيرات في نتائج فحوص الدم (مثل تغير في تعداد الدم وكميات الدم)  
• ارتباك  
• صعوبة الإنتباه  
• إغماء  
• تشوش الرؤية  
• إنتفاخ اليدين وراحتي القدمين  
• ضغط دم منخفض والشعور بإغماء عند الإنقال لوضعية الوقوف  
• الشعور ببرودة في اليدين وراحتي القدمين  
• حب الشباب

أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10% من المستعملين  
• نوبة قلبية  
• السكري  
• فشل كلوي  
أعراض جانبية نادرة (rare) - أعراض تظهر لدى 1-10% من المستعملين  
• رد فعل تحسسي خطير (صدمة إستهدافية)  
• نسب مرتفعة للسكر في الدم

أعراض جانبية شيوخها غير معروفة - أعراض شيوخها لم يحدد بعد:  
• حصى في الكلى  
• إلتهاب المفاصل والظهر  
• فقدان الشهية للطعام  
• تقرحات في الفم  
• آلام عضلية، حساسية أو ضعف العضلات  
• سخونة  
• فقدان الوزن  
• تغيرات في نتائج فحوص الدم (مثل تغير في تعداد الدم وكميات الدم)  
• ارتباك  
• صعوبة الإنتباه  
• إغماء  
• تشوش الرؤية  
• إنتفاخ اليدين وراحتي القدمين  
• ضغط دم منخفض والشعور بإغماء عند الإنقال لوضعية الوقوف  
• الشعور ببرودة في اليدين وراحتي القدمين  
• حب الشباب

التبليغ عن أعراض جانبية  
بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة il. www.health.gov.il الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للت bliغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

**5. كيفية تخزين الدواء؟**  
تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسوس. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

لا يجوز إستعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر القنينة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

يجب التخزين بدرجة حرارة دون 30 درجة مئوية.  
يجب حفظ أقراص نورثير بعلبتها الأصلية لحمايتها من الرطوبة.  
لا يجوز إستعمال الدواء إذا لاحظت تغير اللون.

**6. معلومات إضافية**  
يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على:  
نواء القرص:

Copovidone (K value 28), Anhydrous Calcium Hydrogen Phosphate, Sorbitan Laurate, Colloidal Anhydrous Silica, Sodium Stearyl Fumarate.

طلاء القرص:  
Hypromellose 2910(6 mPa·s), Titanium Dioxide, Macrogols Type 400, Hydroxypropyl Cellulose, Hypromellose 2910(15 mPa·s), Talc, Macrogols Type 3350, Colloidal Anhydrous Silica, Polysorbate 80.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:  
قرص بيضوي لونه أبيض حتى كريمياً مطبوع عليه في جانب واحد الرمز "NK".

حجم العلبة:  
- قنية تحتوي على 30 قرصاً  
- قنية تحتوي على 60 قرصاً  
\* من الجائز أن لا تسوق كافة أحجام العلب.

صاحب الإمكانيات وعنوانه: أبيقي بيوفارما م.ض، شارع هشاراش 4، هود هشارون، إسرائيل.  
إسم المنتج وعنوانه: أبيقي دويتشلاند جي.إم.بي.إيتش آند كي.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 148-06-33504  
من أجل سهولة وسهولة القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر.  
على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

تم إعدادها في أيلول 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

NOR APL SEP 23 CL P3