



File Name				Canidryl-PIL-HEB-D17-F			
Product		Canidryl 20, 50, 100 mg		Job No.		23000737	
Language		Hebrew		Artwork		Patient Leaflet	
Document History							
Ver.	Date	Change description				By	
7-Jan-24 11:04		Last save					
<i>Our Expertise. Your Success.</i>							

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי
התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה
קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי
Canidryl 20 mg Tablets for Dogs Veterinary

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי
Canidryl 100 mg Tablets for Dogs Veterinary

2. חומר פעיל

כל טבלייה לשימוש פומי בטעם בשר צלוי מכילה:
קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 20 mg
קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי מכיל קרפרופן Carprofen 100 mg
חומרים בלתי פעילים ואלרגניים: ראה פרק 13 "מידע נוסף".

3. למה מיועדת התרופה

התרופה מיועדת לכלבים, להפחתת דלקת וכאב הנגרמים כתוצאה מבעיות שריר-שלד וכתוצאה ממחלת מפרקים ניוונית (Degenerative Joint Disease).
טיפול בכאב אחרי ניתוח כהמשך לשיכוך כאבים שניתן בהזרקה.
קבוצה תרפויטית: נוגדי דלקות שאינם סטרואידלים (NSAIDs).

4. התוויות נגד

אין לתת את התרופה במקרה של רגישות יתר למרכיב הפעיל או לאחד מהחומרים הלא פעילים.
אין לתת את התרופה לחתולים. שימוש בטעות בחתולים יכול לגרום להם להיכנס למצב מסכן חיים.
אין לעבור על המינון המומלץ.
אין לתת את התרופה לכלבים עם מחלות לב, כבד או כליות כאשר קיימת אפשרות להופעת דימומים או כיבים במערכת העיכול, או אם קיימת עדות ללקות בהרכב הדם.
אין לתת את התרופה לגורים מתחת לגיל 4 חודשים.
אין להשתמש בכלבות הרות או מניקות.

5. תופעות לוואי

דווחו תופעות בלתי רצויות הקשורות ל-NSAIDs, כמו הקאות, צואה רכה/שלשול, דם סמוי בצואה, אובדן תיאבון ותשישות. תופעות לוואי אלו מופיעות בדרך כלל בשבוע הראשון לטיפול וברוב המקרים חולפות ונעלמות עם הפסקת הטיפול. אולם במקרים נדירים מאוד הן עלולות להיות חמורות או קטלניות.
אם תופעות לוואי מתרחשות, יש להפסיק שימוש בתרופה ולפנות ליעוץ וטרינרי.

כמו בתרופות אחרות מקבוצת ה-NSAIDs, קיים סיכון להתפתחות של תופעות לוואי נדירות של הכליות או אידיויסינקרטיית של הכבד.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

6. חיות מטרה

כלבים

7. מינון ואופן המתן

מינון מומלץ:

2 עד 4 מ"ג קרפרופן לק"ג משקל גוף ליום.
מינון התחלתי של 4 מ"ג קרפרופן לק"ג ליום, פעם ביום או מחולק לשתי מנות שוות.
בהתאם לתגובה הקלינית, ניתן להקטין את המינון לאחר 7 ימים ל-2 מ"ג קרפרופן לק"ג משקל גוף ליום כמנה בודדת.

קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ניתן לחצות את הטבליות לחצאים.
קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: ניתן לחלק את הטבליות לרבעים או לחצאים.

8. אופן השימוש בתכשיר

משך מתן התרופה תלוי בתגובה לטיפול.
למתן דרך הפה בלבד.

אין לעבור את המינון המומלץ.

9. זמן המתנה

לא רלוונטי

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בחיית המטרה
מתן התרופה לכלבים מבוגרים עשוי להיות כרוך בסיכונים נוספים. אם לא ניתן להימנע משימוש בתרופה, ייתכן שכלבים אלו יזדקקו למינון נמוך יותר ומעקב רפואי קפדני.
יש להימנע מלתת את התרופה לכלבים הסובלים מהתייבשות, היפולמיה או לחץ דם נמוך מכיוון שקיים סיכון אפשרי של רעילות מוגברת לכליות.
תרופות מקבוצת ה-NSAIDs עשויות לגרום לעיכוב של פאגוציטוזת. לכן לצורך טיפול במצבים דלקתיים הקשורים לזיהום חיידקי יש להוסיף גם טיפול אנטיביוטיקטי. מתאים.
הטבילות הלעיסות מכילות חומרי טעם. על מנת להימנע מנטילת התרופה בשוגג על ידי בעל החיים, יש לשמור את הטבילות הרחק מטווח השגה של בעלי חיים.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
במקרה של בליעת טבלייה בשוגג על ידי אדם, יש לפנות לקבלת יעוץ רפואי ולהראות לרופא את עלון התרופה. יש לרחוץ ידיים אחרי מגע עם התרופה.
- היריון והנקה של בעל החיים המטופל
מחקרים בחיות מעבדה (עכברושים וארנבים) הראו עדות כי לתרופה רעילות לעובר במינון הקרוב למינון תרופוטי.
בטיחות התכשיר לא הוכחה בעת היריון או הנקה.
אין להשתמש בכלבות הרות או מניקות.
אין להשתמש בכלבות בתקופת הייחום.
- תגובות עם תרופות אחרות וסוגים אחרים של אינטראקציות
קרפרופן נקשרת בחוזקה לחלבוני הפלסמה ומתחרה עם תרופות אחרות הנקשרות גם הן בחוזקה לחלבוני הפלסמה, שיכולות להגביר את האפקט הרעיל בהתאמה. אין להשתמש בקנידרייל יחד עם או במרווח של פחות מ-24 שעות מתרופות אחרות מקבוצת NSAIDs. אין להשתמש בקנידרייל יחד עם גלוקוקורטיקואידים.
יש להימנע ממתן יחד עם תרופות נוספות שיש להן פוטנציאל נפרוטוקסי (רעילות לכליות).
אין לתת קנידרייל יחד עם נוגדי קרישה.
- מינון יתר
לא נצפו סימני רעילות כאשר כלבים קיבלו תרופה זו במינון של עד 6 מ"ג/ק"ג פעמיים ביום למשך 8 ימים (פי 3 מהמינון המרבי המומלץ, שהוא 4 מ"ג/ק"ג/יום) ו-6 מ"ג/ק"ג פעם ביום למשך 7 ימים נוספים (פי 1.5 מהמינון המירבי המומלץ, שהוא 4 מ"ג/ק"ג/יום).
לא קיימת תרופת נגד לטיפול במינון יתר של קרפרופן. יש לתת טיפול תומך כללי, כמו במקרים של מינון יתר של NSAIDs.
תופעות לוואי חמורות עלולות להתרחש בנטילת כמויות גדולות. אם אתה חושד שכלבך צרך כמות טבילות מעבר למינון המומלץ, צור קשר עם הווטרינר.

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. Date) המופיע על גבי התווית והקרטון. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- אין לאחסן מעל 25°C.
- יש לשמור במקום יבש בתוך האריזה המקורית.
- יש להגן מאור.
- קנידרייל 20 מ"ג טבילות לכלבים וטרינרי: יש להשליך מייד טבלייה חצויה שלא נעשה בה שימוש.
- קנידרייל 100 מ"ג טבילות לכלבים וטרינרי: יש להחזיר טבילות מחולקות לבליסטר ולהשתמש בהן בתוך 72 שעות.

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש

כל תכשיר וטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר וטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומרים הפעילים התרופה מכילה גם:

Lactose monohydrate, microcrystalline cellulose, colloidal silicon dioxide, magnesium stearate, grilled meat flavor.

- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: טבלייה עגולה בצבע לבן-שמנת, עם קצוות משופעים, עם סימון של קו חצייה בצד אחד.
קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: טבלייה עגולה בצבע לבן-שמנת, עם סימון קו חצייה בצורת צלב בצד אחד.
כל אריזה מכילה 100 טבליות במגשיות (בליסטרים).

בעל הרישום ויבואן:

איי.אל. מדי-מרקט בע"מ, רחוב הקטיף 3, פארק תעשיות עמק חפר, 3877701.

שם היצרן:

CHANELLE Pharmaceuticals Ltd., Loughrea, Co. Galway, Ireland.

נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

מס' רישום התכשיר בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות:

קנידריל 20 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: 160-20-35099

קנידריל 100 מ"ג טבליות לכלבים וטרינרי: 153-51-33972

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, ההנחיות מיועדות לבני שני המינים.