

עלון לצרכן לתכשיר וטרינרי

התרופה משווקת על פי מרשם רופא וטרינר בלבד
לשימוש בבעלי חיים בלבד

1. שם התרופה הווטרינרית, צורתה וחוזקה

אוקסיגל וטרינרי
אבקה להמסה במי השתייה

2. חומר פעיל וכמותו ביחידת מינון :

Oxytetracycline HCl 50%
לרשימת החומרים הבלתי פעילים בתכשיר- ראו בסעיף 13 "מידע נוסף"

3. למה מיועדת התרופה

לטיפול במחלות הנגרמות על ידי riketsia arlichia mycoplasma clamidia plasmodium
glineseum spirocheta וחיידקים אחרים הרגישים לטטראציקלינים בתרנגולי הודו.

לטיפול ומניעה של מחלות הנגרמות על ידי חיידקים גרם חיוביים וגרם שליליים
רגישים לאוקסיטטראציקלין בדגי קרפיון.

לטיפול במחלות הנגרמות על ידי מיקרואורגניזמים הרגישים לאוקסיטטראציקלין בתרנגולי
פטם.

קבוצה תרפויטית:

תכשיר אנטי-מיקרוביאלי מקבוצת הטטראציקלינים

4. התוויות נגד

אין להשתמש במקרים של רגישות יתר לחומר הפעיל או כל חומר אחר מקבוצת
הטטראציקלינים.

אין להשתמש במקרים של עמידות ידועה לטטראציקלינים.

בדגים- אין להשתמש יחד עם זרזי גדילה או עם אנטיביוטיקות אחרות.

5. תופעות לוואי

תופעות נדירות מאד (פחות מחיה אחת מתוך 10,000 חיות מטופלות)- הפרעות במערכת
העיכול, אלרגיה ורגישות לאור.

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על

תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות

(www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי,

או ע"י כניסה לקישור : [/https://sideeffects.health.gov.il](https://sideeffects.health.gov.il)

6. חיות מטרה:

תרנגולי פטם

תרנגולי הודו

דגי קרפיון

7. מינון:

תרנגולי פטם: 40-60 גרם לכל 100 ליטר מי שתייה במשך 3-5 ימים כמקור שתייה היחיד.
הכנה טרייה כל 12 שעות
תרנגולי הודו: 100 גרם לכל 100 ליטר מי שתייה במשך 3-5 ימים.
דגים: 150 גרם תכשיר לכל 1 טון משקל חי דגים ע"י ערבוב במזון למשך 10 ימים.

8. אופן השימוש בתכשיר

תרנגולי הודו ותרנגולות פיטום- להגשה על ידי המסה במי שתייה.
יש להמיס את האבקה בכמות קטנה של מי שתייה ורק לאחר מכן להוסיף מים עד לכמות הסופית.

לדגים יש לערבב במזון

9. זמן המתנה-

תרנגולי פטם: 7 ימים

תרנגולי הודו: 7 ימים

קרפיונים: 20 ימים בטמפרטורה: 20°C (400 ימי מעלה)

10. אזהרות

- אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה בטיפול בעופות השימוש בתכשיר צריך להתבסס על בדיקות רגישות של חיידקים המבודדים מהחיה. אם לא ניתן, הטיפול צריך להתבסס על מידע אפידמיולוגי אזורי על רגישות חיידקי המטרה. שימוש בתכשיר החורג מההוראות המפורטות בעלון עלול להגדיל שכיחות של חיידקים עמידים לאוקסיטטרציקלין ועלול להפחית את יעילות הטיפול בטטרציקלינים, בשל הפוטנציאל לעמידות צולבת.
יש להימנע משימוש ממושך או חוזר, מכיוון שעלול לגרום התפתחות והתפשטות העמידות לחיידקים. במיוחד בזנים *Salmonella spp* ו-*enterobacteria*, שרבים מהם כבר עמידים. מכיוון שאולי לא יושג מיגור של גורמי המחלה, יש צורך בטיפול תרופתי בשילוב עם שיטות טיפול טובות, למשל, היגיינה טובה, אוורור נאות, ללא צפיפות יתר של החיות.
עמידות נרחבת לאוקסיטטרציקלין זוהתה בדגימות שבודדו מעופות עבור הזנים *E. Coli*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter spp*, ו-*Enterococcus spp*. יש להשתמש בתכשיר רק במקומות שבהם תרבויות ובדיקות רגישות הוכיחו כי הוא עשוי להיות יעיל.
- אזהרות מיוחדות הנוגעות לבטיחות האדם המטפל בתכשיר
אנשים עם רגישות יתר ידועה לטטרציקלינים צריכים להימנע ממגע עם התכשיר. יש להימנע משאיפת אבק בעת הטיפול בתכשיר עד להמסה מלאה במים. השתמש באזור מאוורר היטב וללא רוח.
הימנע ממגע עם העור והעיניים.
לכן יש להשתמש בכפפות, מסיכת מגן ומשקפי מגן ו ללבוש ביגוד מגן בעת הטיפול עם תכשיר זה.
במקרה של מגע מקרי בעין או בעור, יש לשטוף את האזור הפגוע עם כמויות גדולות של מים נקיים. אם מתרחש גירוי, פנה מייד לרופא להתייעצות והראה לו את העלון.
נפיחות של הפנים, השפתיים או העיניים, או קשיי נשימה הם תסמינים חמורים יותר הדורשים טיפול רפואי דחוף.
שטפו ידיים ועור שהיה במגע עם התכשיר מיד לאחר הטיפול בתכשיר.
אין לעשן, לאכול או לשתות בזמן הטיפול בתכשיר.
- חוסר תאימות (incompatibility) בדגים, אין לתת את התכשיר יחד עם מוצרי סידן (קלציום), זרזי גדילה מסויימים, ואנטיביוטיקות בקטריציידליות

11. הוראות אחסון

- מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה.

- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (Exp. Date) המופיע על גבי האריזה.
- תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו החודש.
- תנאי אחסון : מתחת ל 25°C

12. הוראות בדבר השמדת התכשיר/שאריות התכשיר בתום השימוש
כל שארית של תכשיר ווטרינרי רפואי שלא השתמשו בו או כל חומר מיותר שהתקבל משימוש במוצר ווטרינרי רפואי יש להשמיד כפסולת רעילה, אין להשליך לביוב.

13. מידע נוסף

- נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם חומצה ציטרית (חומצת לימון)
- גודל האריזה : 250 גרם, 1 ק"ג, 5 ק"ג

יצרן ובעל הרישום: ביוואק בע"מ, רחוב האילן 30 ת איזור תעשייה צפוני, אור עקיבא, 3060000

מספר רישום התרופה בפנקס התכשירים הממלכתי במשרד הבריאות : 080-93-92200
נערך ב 10.2023 בהתאם להנחית משרד הבריאות