

## نشرة للمستهلك لمستحضر بيطري

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب بيطري فقط  
للاستعمال في الحيوانات فقط

1. اسم الدواء البيطري، شكله ومعياره  
أوكسيچال بيطري  
مسحوق للخلط في مياه الشرب

2. المادة الفعالة وكميتها في وحدة جرعة  
Oxytetracycline HCl %50  
لقائمة المواد غير الفعالة في المستحضر- أنظروا للبند 13 "معلومات إضافية"

3. لم أعد الدواء؟

لعلاج أمراض تحدث بسبب riketsia arlichia mycoplasma clamidia plasmodium  
glineseum spirocheta وجراثيم أخرى حساسة نحو تيتراسيكلينات في ديوك الحيش.

لعلاج ومنع أمراض تحدث بسبب جراثيم غرام ايجابية و غرام سلبية  
حساسة نحو أوسيتيتراسيكلين في سمك الكاربيون.

لعلاج أمراض تحدث بسبب كائنات مجهرية حساسة نحو أوكسيتيتراسيكلين في الدجاج المخصص للحم.

### الفصيلة العلاجية:

مستحضر مضاد للميكروبات من فئة التيتراسيكلينات

### 4. موانع الاستعمال

يمنع الاستعمال في حالات فرط تحسس للمادة الفعالة أو لأي مادة أخرى من مجموعة التيتراسيكلين.  
يمنع الاستعمال في حالات مقاومة معروفة نحو التيتراسيكلين.  
في السمك يمنع الاستعمال سوية مع مسرعات النمو أو مع مضادات حيوية أخرى.

### 5. الأعراض الجانبية

أعراض جانبية نادرة جدا (أقل من حيوان واحد من بين 10,000 حيوانات معالجة)- اضطرابات في جهاز  
الهضم، تحسس وحساسية للضوء.  
يمكن التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة من خلال الضغط على الرابط "التبليغ عن أعراض جانبية  
عقب علاج دوائي" الموجود في صفحة المنزل التابعة لوزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجه  
للمنموذج الانترنتي للتبليغ عن الأعراض الجانبية،  
أو من خلال دخول الرابط: <https://sideeffects.health.gov.il>

### 6. حيوانات الهدف:

دجاج مخصص للحم  
ديوك الحيش  
سمك الكاربيون

7. الجرعة:

دجاج مخصص للحم: 40-60 غرام لكل 100 لتر مياه شرب لمدة 3-5 أيام كمصدر وحيد للشرب. تحضير طازج كل 12 ساعة  
ديوك الحبش 100 غرام لكل 100 لتر مياه شرب لمدة 3-5 أيام  
سمك : 150 غرام مستحضر لكل 1 طن وزن سمك حي بواسطة الخلط بالطعام لمدة 10 أيام

#### 8. طريقة استعمال المستحضر

ديوك الحبش والدجاج المخصص للحم - يقدم من خلال الإذابة في مياه الشرب يجب إذابة المسحوق بكمية قليلة من مياه الشرب و فقط من بعد ذلك يجب اضافة الماء حتى الكمية النهائية.

للسمك يجب الخلط في الطعام

#### 9. فترة الانتظار-

دجاج مخصص للحم: 7 أيام

ديوك الحبش: 7 أيام

كاربيون: 20 يوم بدرجة حرارة: 20°C (400 أيام درجة )

#### 10. تحذيرات

- تحذيرات خاصة تتعلق باستعمال الدواء في علاج الطيور  
استعمال المستحضر يجب أن يعتمد على فحوصات حساسية عينات جراثيم تؤخذ من الحيوان. إذا لم يكن ذلك ممكناً، يجب أن يعتمد العلاج على معلومات مرضية بخصوص حساسية الجراثيم المستهدفة.  
استعمال المستحضر بشكل شاذ عن التعليمات المفصلة في النشرة قد يزيد من انتشار الجراثيم المقاومة للتيترواسيكلينات وقد يقلل من نجاعة العلاج بالتيترواسيكلينات، بسبب احتمال حدوث مقاومة متصالبة.  
يجب تجنب استعمال متواصل أو متكرر، لأن هذا قد يسبب تطور وانتشار مقاومة الجراثيم. خاصة في الأصناف *Salmonella spp.* و *enterobacteria*، والتي عددي منها أصبح مقاوماً.  
حيث أنه ربما لن يتم الحصول على ابيادة لمسببات المرض، فهناك حاجة لعلاج دوائي بالدمج مع طرق علاج جيدة، مثلاً، تحسين النظافة، تحسين التهوية، تقليل كثافة الحيوانات.  
تم تشخيص مقاومة متفشية نحو أوكسيتيترواسيكلين في عينات أخذت من طيور بخصوص الأصناف *E. Coli*, *Salmonella spp.*, *Campylobacter spp.* و *Enterococcus spp.* . يجب استعمال المستحضر فقط في أماكن أثبتت فيها مستنبتات وفحوصات حساسية أن المستحضر قد يكون مفيداً.

#### • تحذيرات خاصة تتعلق بسلامة الشخص الذي يستعمل المستحضر

- الأشخاص الذين لديهم فرط تحسس معروف نحو التيترواسيكلينات يجب أن يتجنبوا لمس المستحضر.  
يجب تجنب استنشاق المسحوق عند استعمال المستحضر حتى إذابة كاملة في الماء.  
يستعمل في منطقة جيدة التهوية ومن دون رياح.  
تجنب تماس مع الجلد والعينين.  
لذلك يجب استعمال قفازات، أقنعة واقية ونظارات واقية وارتداء ملابس واقية خلال استعمال هذا المستحضر.  
في حال ملامسة المستحضر للعين أو الجلد، يجب غسل المنطقة المصابة بكميات كبيرة من الماء النظيف. إذا حصل تهيج، توجه الى الطبيب للاستشارة وأره النشرة.  
انتفاخ الوجه، الشفتين أو العينين، أو صعوبات التنفس، هي علامات أخطر تتطلب علاج طبي طارئ.  
اغسلوا اليدين والجلد في حال ملامسة المستحضر فوراً بعد استعمال المستحضر.  
يمنع التدخين، الأكل أو الشرب خلال استعمال المستحضر.

#### • قلة الملائمة ( incompatibility )

- في السمك، يمنع اعطاء المستحضر سوية مع منتجات الكالسيوم، أنواع معينة من مسرعات النمو ومضادات حيوية ذات فعالية مبيدة للجراثيم.

#### 11. تعليمات التخزين

- امنع التسمم! هذا الدواء وأي دواء آخر يجب أن يحفظ في مكان مغلق بعيداً عن متناول الأطفال و/أو الرضع وبذلك تمنع التسمم.
- لا يجوز استعمال الدواء بعد تاريخ الصلاحية (Exp.) (Date) الذي يظهر على العبوة. تاريخ انتهاء الصلاحية يشير إلى اليوم الأخير من الشهر.
- ظروف التخزين : دون 25°C

**12. تعليمات بخصوص التخلص من المستحضر/بقايا المستحضر في نهاية الاستعمال**  
كل ما يتبقى من مستحضر بيطري أو أي نفايات ناجمة عن استعمال مستحضر بيطري يجب أن تتلف على أنها نفايات سامة، لا يجوز رميها في المجاري.

**13. معلومات إضافية**

- إضافة للمادة الفعالة يحتوي الدواء أيضًا على: حمض الليمون
- حجم العبوة: 250 غرام، 1 كغم، 5 كغم

**المنتج وصاحب التسجيل:** بيوفاك م.ض، شارع هنيان 30 المنطقة الصناعية الشمالية، أور عكيفا، 3060000

**رقم تسجيل الدواء في سجل المستحضرات الحكومي في وزارة الصحة: 080-93-92200**  
تم إعدادها في 10.2023 وفق تعليمات وزارة الصحة