

עלון לצריך לפי תקנות הרווקחים (תקנירים) התשמ"ז - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

ווקבריה טבליות

טבליות מצופות

כל טבליה מכילה:

קובוטגראביר (כנטרן) 30 מ"ג 30 mg (as sodium)

לרשימת החומרים הבלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר, ראה סעיף 2 – "מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 – "מידע נוסף".

קרא בעיון את העلون עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרווקח.
תרופה זו נרשמה עבורה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי במצבם הרפואי דומה.

1. למה מיועדת התרופה?

ווקבריה טבליות מותווית בשילוב עם טבליות רילפיבירין לטיפול קצר טווח במוגרים נשאי נגיף הכספי החיסוני האנושי-1-VIH המדוכאים וירולוגית ($50 \text{ copies/ml} < \text{RNA-1-VIH}$) על מטר טיפול אנטירטוריואלי קבוע, ללא עדות בעבר או בהווה לעמידות וירולוגית או כישלון וירולוגי קודם עם תקנירים מקבוצות NNRTI ו-NOI, עברו:
• טיפול התחלתי פומי להערכת הסובלות לווקבריה ורילפיבירין לפני תחילת הטיפול בזריקות ארוכות טווח של קאבטגראור ושל רילפיבירין.
• טיפול פומי למוגרים במקהה בו לא ניתן לקבל את הזריקות של קאבטגראור ושל רילפיבירין במנעדן.

קבוצה רפואיית:

ווקבריה מכילה את החומר הפעיל קבוטגראביר. קבוטגראביר שייך לקבוצת תרופות אנטירטוריואליות הנקראט מעכבי אינטגראז (/ β /).

ווקבריה טבליות אינה מרפא זיהום של VIH; היא שומרת שרמת הנגיף בגוף תהיה נמוכה. כתוצאה לכך, היא עוזרת לשמר על כמות תא ה-CD4+ בدمך. תא CD4+ הם סוג של תא דם לבנים חשובים בסיווע לגוף להילחם בזיהום.

הרופא ימליץ לך לקחת טבליות ווקבריה לפני מתן זריקות ווקבריה בפעם הראשונה. אם נרשמה לך זריקה ווקבריה, אך אין לך לקבל את הזריקה, הרופא יכול גם להמליץ לך לקחת טבליות ווקבריה במקום, עד שתוכל לקבל את הזריקה שוב.

טబליות ווקבריה ניתנות תמיד בשילוב עם תרופה אנטירטרויראלית נוספת, בשם טబליות רילפיבירין (virilop) לטיפול בזיהום ה-VA. טబליות ווקבריה ורילפיבירין יחליפו את התרופות האנטירטרויראליות שאתה לוקח. עיין בעלון לצריך של רילפיבירין למידע על תרופה זו.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (קבוטגראביר) או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה (כמפורט בסעיף 6).
- אתה לוקח אחת מהתרופות הבאות, משומ שאליה יכולות להשפיע על פעילות ווקבריה:
 - קרבנזפין, אוקסקרבצפין, פניטואין ופנובארביטאל (תרופות לטיפול באפילפסיה ומונעת התקפים)
 - ריפאמיצין או ריפא芬טין (תרופות לטיפול בזיהומים חידקיים מסוימים כגון שחפת)

← ספר לרופא אם אתה חושב שאחד מהל חל עלייך.

اذירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה תגובה אלרגית

וקבריה מכילה את החומר הפעיל קבוטגראביר, שהוא מעכב האנזים אינטגראז. מעכבי אינטגראז, כולל קבוטגראביר, יכולים לגרום לתגובה אלרגית חמורה הדועה כתגובה רגשות יתר. אתה צריך לדעת על סימנים ותסמינים חשובים שיש לשים לב אליהם בזמן שאתה לוקח ווקבריה.

← קרא את המידע בסעיף 4 של עalon זה.

בעיות כבד כולן צבת מסוג B ו/או C

ספר לרופא אם יש לך או הי לך בעבר בעיות בכבד, כולן צבת מסוג B ו/או C. הרופא עשוי להעירך עד כמה חמורה מחלת הכבד שלך לפני שיחלית אם אתה יכול לקחת ווקבריה.

שים לב לתסמינים חשובים

חלק מהאנשים שלוקחים תרופות לזיhom של VA מפתחים בעיות אחרות, העולות להיות חמורות. אתה צריך לדעת על סימנים ותסמינים חשובים שיש לשים לב אליהם בזמן שאתה לוקח ווקבריה. אלה כוללים:

- תסמינים של ZIhomים
- תסמינים של נזק לכבד

← קרא את המידע בסעיף 4 של עalon זה ("תופעות לוואי").

אם אתה חווה תסמינים כלשהם של ZIhom או נזק לכבד:

← ספר לרופא מיד. אל תיקח תרופות אחרות נגד ZIhom ללא התיעצות עם הרופא.

ילדים ומתבגרים

תרופה זו אינה מיועדת לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

לא קיים מידע לגבי בטיחות ויעילות השימוש בתרופה זאת בילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18.

איןטראקטזיות/תגובהות בין תרופתיות

אם אתה לוקח או אם תקח לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

אסור **לקחת וקובריה** עם תרופות מסוימות אחרות (ראה "אין להשתמש בתרופה" מוקדם יותר בסעיף 2):

תרופות מסוימות יכולות להשפיע על פעילותה של וקובריה או להגדיל את הסיכון שהיו לך תופעות לוואי. וקובריה יכולה גם להשפיע על אופן הפעולה של תרופות אחרות.

ספר לרופא אם אתה נוטל אחת מהתרופות בראשימה הבאה:

• **תרופות המכונת נוגדי חומצה, לטיפול בקשי עיכול וצרבת.** נוגדי חומצה יכולים לעזור את ספיגת התרופה בטבילות וקובריה לגוף.

אל תיקח תרופות אלה במהלך שעתיים לפני שאתה לוקח וקובריה טబליות, או לפחות 4 שעות אחרי שלקחת אותה.

• **ריאבוטין** (טיפול בziehomim חידקיים מסוימים כגון שחתפת).

← **ספר לרופא או לרוקח אם אתה לוקח אחת מהתרופות האל.** הרופא עשוי להחליט שאתה זקוק לבדיקות נוספת.

הירין והנקה

אם אתה בהירין או מניקה, חשוב שתיתן שעת בהירין או אם אתה מתכונת להרות:
← **התיעצי עם הרופא לפני נטילת וקובריה.**

הירין

• **לא מומלץ ללקחת וקובריה במהלך ההירין.** במידה הצורך, הרופא ישකול את התועלת עבורך ואת הסיכון לתינוק בנטילת וקובריה בזמן ההירין. אם אתה מתכונת ההירין, **דברי עם הרופא לפני**.

• אם כניסה לתינוקן, אל תפיסקי ללקחת וקובריה מבלי להתיעץ עם הרופא.

הנקה

הנקה אינה מומלצת לנשים החיות עם HIV מכיוון שדיהום ה- HIV עלול לעבור אל התינוק בחלב אם. לא ידוע אם המרכיבים של וקובריה יכולים לעبور לחלב אם.

אם אתה מניקה, או חשובת להניקה, **עליך להתיעץ עם הרופא בהקדם האפשרי.**

נהיגה ושימוש במכונות

וקובריה עלולה לגרום לך לSchedulerות ולתופעות לוואי אחרות הגורמות לך להיות פחות ערני.
← **אין לנוהג או להפעיל מכונות אלא אם אתה בטוח שאתה לא מושפע.**

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה

אם נאמר לך על ידי הרופא שיש לך אי סבירות לסוכרים כלשהם, פנה לרופא לפני נטילת תרופה זו. תשאיר זה מכיל פחות מ- 1 מילימול נתרן (23 מ"ג) לטබליה, שכן ניתן לומר כי הוא למעשה מעשה נטול נתן.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

המינון ואופן הטיפול יקבעו על ידי הרופא בלבד. יש לקחת ווקבריה טבליות תמיד עם תרופה נוספת ל-70H (טבליות רילפיבירין). עליך לעקוב בקפידה גם אחר ההוראות עבור רילפיבירין. העלון לצריכן נמצא באזיזה של רילפיבירין.

המינון המקבול בדרך כלל הוא:

משטר המינון עבור ווקבריה טבליות המלאה בזריקות חודשיות:

שם התרופה	תקופת טיפול	תקופת טיפול	תקופת טיפול
	במהלך חודש 1 (לפחות 28 ימים)	במהלך חודש 2 לאחר חדש לキיחת טבליות	חודש 3 ואילך
ווקבריה	טבליה של 30 מ"ג פעם ביום	זריקה של 600 מ"ג	זריקה של 600 מ"ג כל חודש
רילפיבירין	טבליה של 25 מ"ג פעם ביום	זריקה של 900 מ"ג	זריקה של 900 מ"ג כל חודש

משטר המינון עבור ווקבריה טבליות המלאה בזריקות דו-חודשיות:

שם התרופה	תקופת טיפול	תקופת טיפול	תקופת טיפול
	במהלך חודש 1 (לפחות 28 ימים)	במהלך חודשים 2 ו- 3 לאחר חדש לキיחת טבליות	חודש 5 ואילך
ווקבריה	טבליה של 30 מ"ג פעם ביום	זריקה של 600 מ"ג	זריקה של 600 מ"ג כל חודש
רילפיבירין	טבליה של 25 מ"ג פעם ביום	זריקה של 900 מ"ג	זריקה של 900 מ"ג כל חודש

כאשר אתה מתחילה טיפול לראשונה עם ווקבריה, אתה והרופא שלך יכולים להחליט להתחיל את הטיפול בווקבריה טבליות או לחילופין, להתחיל את הטיפול ישירות עם ווקבריה זריקות:

אם תחליטו להתחיל את הטיפול עם טבליות, הרופא יגיד לך:

- לקחת טבליה אחת של ווקבריה 30 מ"ג וטבליה אחת של רילפיבירין 25 מ"ג, פעם ביום, **למשך חודש**.

- לאחר מכן, תקבל זריקות **כל חודש או כל חודשיים**.

החודש הראשון של הטיפול בטבליות ווקבריה ורילפיבירין נקרא תקופת ההתנסות. זה אפשרי לרופא שלך להעיר האם מתאים לך להמשיך עם ההזרקות.

כיצד יש לקחת את הטבליות
ווקבריה טבליות יש לבלווע עם מעט מים.

ניתן לקחת ווקבריה עם או ללא אוכל. עם זאת, אם אתה לוקח טבילה של ווקבריה בו זמנית עם הטבילה של רילפיברין, יש לקחת את שתי הטבליות עם ארוחה.
אין מידע לגבי כתישה/ח齐יה/לעיסה.

אם איןך יכול לקבל את זיריקת הווקבריה בלבד
אם איןך יכול לקבל את זיריקת הווקבריה שלך, הרופא עשוי להמליץ לך ללקחת טבליות ווקבריה במקום, עד שתוכל לקבל שוב את הזיריקה.

אין לעבור על המנה המומלצת

תרופה נגדות חומצה
נוגדי חומצה, לטיפול בקשיש עיכול וצרבת, יכולים למנוע מוקבריה טבליות להיסג לתוך הגוף שלך ולהפוך אותה לפחות ייעלה.

אל תיקח נוגד חומצה במהלך שעתים לפני שאתה לוקח ווקבריה טבליות, או לפחות 4 שעות אחרי שלקחת אותה. פנה לרופא ליעוץ נוסף לגבי נטילת תרופות המפחיתות רמות חומציות עם ווקבריה טבליות.

אם נטילת בטעות מינון גבוהה יותר
אם لكחת בטעות יותר מדי טבליות של ווקבריה, פנה לרופא או לרוקח **לקבלת יעוץ**. אם אפשרי הראה להם את אריזת ווקבריה טבליות.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מيون של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו
אם שמת לב שכחת ללקחת את המנה בתוך 12 שעות מהזמן שבו אתה לוקח בדרך כלל ווקבריה טבליות, קח את הטבילה שנשכח בהקדם האפשרי. אם שמת לב לאחר 12 שעות, דלג על המנה הזאת וקח את המנה הבאה בזמן הרגיל.
← **אל תיקח מנת כפולה** כדי לפצות על מנת שנשכחה.

אם הקאת תוך פחות מ-4 שעות לאחר נטילת ווקבריה טבליות, קח טבילה נוספת. אם הקאת לאחר יותר מ-4 שעות מנטילת ווקבריה טבליות, אין צורך ללקחת טבילה נוספת עד למנה הבאה. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה
אין להפסיק ללקחת ווקבריה טבליות ללא התיעצות עם הרופא
קח ווקבריה טבליות כל עוד הרופא ממליץ לך. אל תפסיק אלא אם הרופא ייעץ לך.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעם** שהן נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנר **זקוק** להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופת, היועץ ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בזקבריה טבליות עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשות תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אף אחת מהן.

תגובהות אלרגיות

זקבריה טבליות מכילה קבוצתגראביר, שהינו מעכב האנזים אינטגראז. מעכבי אינטגראז, כולל קבוצתגראביר, יכולים לגרום לתגובה אלרגית חמורה המכונה תגובה רגישות יתר. אם אתה חווית אחד מהתסמינים הבאים:

- תגובה עורית (פריחה, חרלה)
- טמפרטורה גבוהה (חום)
- חוסר אנרגיה (עיפות)
- נפיחות, לפעים של הפנים או הפה (אנג'יאדמה), הגורמת לקושי בנשימה
- כאבי שרירים או מפרקים.

← פנה מיד לרופא. הרופא עשוי להחליט לבצע בדיקות של הכלב, הכליות או הדם שלך, ועשוי להורות לך להפסיק לנקחת זקבריה.

תופעות לוואי שכיחות מאוד

אליה עלולות להופיע ב- יותר מ- **1 מכל 10** אנשים:

- כאב ראש
- חום.

תופעות לוואי שכיחות עד 1 מכל 10

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 10** אנשים:

- דיכאון
- חרדה
- חלומות חריגים
- נדודי שינה (אייסומניה)
- סחרחות
- בחילה
- הקאה
- כאב בטן
- גזים (נפיחות)
- שלשול
- פריחה
- כאבי שרירים
- חוסר אנרגיה (עיפות)
- חולשה (אסתניה)
- הרגשה כללית לא טוביה
- עלייה במשקל.

תופעות לוואי שאינן שכיחות

אליה עלולות להופיע ב- **עד 1 מכל 100** אנשים:

- ניסיון התאבדות ומחשבות אובדןיות (במיוחד באנשים שסבלו מDIC או בעיות נפשיות בעבר)
- תגובה אלרגית (رجשות יתר)
- תפוחת עורית (אורטיקאריה)
- נפיחות, לפעמים של הפנים או הפה (אנגיאדמה), הגורמת לקושי בנשימה
- תחושת ישננות
- נזק לכבד (הסימנים יכולים לכלול הצהבה של העור ולובן העיניים, אובדן תיאבון, גרד, רגישות בבטן, צואה בהירה או שתן כהה בצורה יוצאה דופן)
- שינויים בבדיקות דם למדדי כבד (עליה בטרנסאמינזות או עליה בבילירובין).

תופעות לוואי נוספות להופיע בבדיקות דם

- עליה בליפאוזות (חומר המיצר על ידי הלבלב)

תופעות לוואי אפשריות נוספות

גברים המתופלים בוקבריה ורילפיברין נגד נגיף ה- **VH** עלולים לפתח תופעות לוואי נוספות.

דלקת לבב (פנקראטיטיס)

אם אתה סובל מכאבים קשים בבטן, זה יכול להיגרם כתוצאה מדלקת של הלבלב (פנקראטיטיס).

← **ספר לרופא**, במיוחד אם הכאב מתפשט ומחמיר.

تسمינים של זיהום ודלקת

גברים עם זיהום מתקדם של **VH** (איידס) הינם בעלי מערכת חיסונית חלה, והם נוטים יותר לפתח זיהומים חמורים (**זיהומים אופורטוניסטיים**). לאחר התחלת הטיפול, המערכת החיסונית מתחזקת, והגוף מתחילה להילחם בזיהומים.

יכולים להתפתח תסמינים של זיהום ודלקת הנגרמים על ידי:

- זיהומים ישנים וחביבים שמתרחצים שוב כשהגוף נלחם בהם
- מערכת החיסון שתוקפת רקמת גוף בריאה (הפרעות אוטואימוניות).

התסמינים של הפרעות אוטואימוניות עלולים להתפתח חדשניים רבים לאחר שהתחלת ללקחת תרופה לטיפול בזיהום ה- **VH** שLR.

התסמינים עשויים לכלול:

- חולשת שרירים / או כאב שרירים

- כאב או נפיחות במפרקים

- חולשה המתחילה בכפות הידיים ובכפות הרגליים ומתקדמת מעלה כלפי מרכז הגוף.

- דפימות לב או רעד

- פעילות יתר (חסור מנוחה ותנועת מוגזמים)

אם אתה מפתח תסמינים כלשהם של זיהום ודלקת או אם אתה מבחין בכל אחד מהتسمינים לעיל:

← פנה מיד לרופא. אל תיקח תרופות אחרות נגד הדיזהום ללא ייעוץ מהרופא.

אם הופעה תופעת לווואי, אם אחת מתופעות הלווואי מחייבת או כאשר אתה סובל מתופעת לווואי
שלא צינה בעלוון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לווואי

ניתן לדוח על תופעות לווואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לווואי"
בקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה
לטופס המukan לדוח על תופעות לווואי, או ע"י כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעללה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמרם במקום סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים ו/או טיפולות ועל ידי כך תמנעו הרעללה. אל תגרום להתקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן מעל $C^{\circ} 30$.
- אין להשליך תרופות לביב או לפסולת הביתית. התיעץ עם הרוקח כיצד לזרוק תרופות שאין בשימוש. צעדים אלו יסייעו להגנה על הסביבה.

6. מידע נוספת

- נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:
Microcrystalline cellulose, lactose monohydrate, sodium starch glycolate (Type A),
hypromellose 2910, 3 mPa*s, magnesium stearate, titanium dioxide (E171),
macrogol 400 (E1521)
- כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:
טבליות מצופות וקבריה הן לבנות, אוביוליות, מצופות פilm ומוסמנות בקוד "SV CTV" בצד אחד.
הטבליות מסופקות בבקבוק המכיל 30 טבליות. הבקבוק סגור עם פקק קשה פתיחה לילדים.
- הוראות פתיחה: כדי להסיר את הפקק, יש להחוץ מטה ובו זמני לסובב שמאליה (נגד כיוון השעון).
- הוראות סגירה: יש להניח את הפקק על הקצה הפתוח של הבקבוק ולסובב לכיוון ימין (בכיוון השעון)
עד לסגירה מלאה.
- בעל הרישום: גלקסוסמיתקלין (ישראל) בע"מ, רח' בזל 25, פתח תקווה.
- יצור: VII הלט'קאר UK בע"מ, ברנטפורד, אנגליה.
- מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות: 169-36947
- לשם הפשטות ולהקלת הקיראה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

נערך בינואר 2024 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

סימני מסחר הינם בבעלות או בזכיינותו של קבוצת החברות של

© 2024 קבוצת החברות של ViiV Healthcare או הזכין שלה.

Voc Tab PT v5