

הנדון: ווקבריה טבליות מצופות Vocabria Film Coated Tablets

רופא/ה נכבד/ה
רוקח/ת נכבד/ה,

חברת גלקסוסומיתקלין ישראל בע"מ (GSK) מבקשת להודיע על עדכון העולונים לרופא ולצרכן של התכשיר **Vocabria Tablets** לשימוש לבכט, חל שינוי בסטנדרט המינון של התכשיר וכן שינויים נוספים בעולונים. בהודעה זו כלולים השינויים המהותיים בעולון לרופא ובעלון לצרכן. בעולונים ישנים שינויים נוספים.

מרכיב פעיל וחוזקן:

Cabotegravir (as sodium) – 30mg

התוויה הרשומה לתכשיר בישראל:

Vocabria tablets are indicated in combination with rilpivirine tablets for the short-term treatment of Human Immunodeficiency Virus type 1 (HIV-1) infection in adults who are virologically suppressed (HIV-1 RNA <50 copies/mL) on a stable antiretroviral regimen without present or past evidence of viral resistance to, and no prior virological failure with agents of the NNRTI and INI class for:

- oral lead-in to assess tolerability of Vocabria and rilpivirine prior to administration of long acting cabotegravir injection plus long acting rilpivirine injection.
- oral therapy for adults who will miss planned dosing with cabotegravir injection plus rilpivirine injection.

 **עדכנים מוחותיים נעשו בסעיפים הבאים בעולון לרופא :**

4.2 Posology and method of administration

Vocabria should be prescribed by physicians experienced in the management of HIV infection.

Vocabria tablets are indicated for the short-term treatment of HIV in combination with rilpivirine tablets, therefore, the prescribing information for rilpivirine tablets should be consulted for recommended dosing.

Prior to starting Vocabria, healthcare professionals should carefully select patients who agree to the required monthly injection schedule and counsel patients about the importance of adherence to scheduled dosing visits to help maintain viral suppression and reduce the risk of viral rebound and potential development of resistance with missed doses (see section 4.4).

The healthcare provider and patient may decide to use Vocabria tablets as an oral lead-in prior to the initiation of cabotegravir injection to assess tolerability to cabotegravir (see Table 1) or may proceed directly to cabotegravir injections (see cabotegravir injection Physician leaflet).

Posology

Adults

Oral lead-in

Prior to the initiation of cabotegravir injection When used for oral lead-in, Vocabria tablets together with rilpivirine tablets should be taken for approximately one month (at least 28 days) to assess tolerability to cabotegravir and rilpivirine (see section 4.4). One Vocabria 30 mg tablet should be taken with one rilpivirine 25 mg tablet, once daily.

...

 **עדכנים מוחותיים נעשו בסעיפים הבאים בעולון לצרכן :**

3. כיצד תשתמש בתרופה?

...

כאשר אתה מתחילה טיפול בראשונה עם ווקבריה, **אתה והרופא שלך יכולים להחליט להתחל את הטיפול בווקבריה טבליות או לחילופין, להתחיל את הטיפול ישירות עם ווקבריה זרייקות: אם תחליטו להתחיל את הטיפול עם טבליות, הרופא יגיד לך:**

- לחתת טבלייה אחת של ווקבריה 30 מ"ג וטבלייה אחת של רילפיבירין 25 מ"ג, פעם ביום, **למשך חדשן**.
- לאחר מכן, תקבל זרייקות **כל חדשן או כל חדשניים**.

החדשן הראשון של הטיפול בטבליות ווקבריה ורילפיבירין נקרא תקופת ההתנסות. זה מאפשר לרופא שלך להעיר האם מתאים לך להמשיך עם ההזריקות.

...

מקרה לעדכנים המסומנים :

מידע שהוור – מסומן בקוו אדום חוצה **XXX**

תוספת – כתוב **כחול**

תוספת החמרה – כתוב **כחול** – מסומן בצהוב מפרק

העלונים לרופא ולצרכן נשלחו לפרסום במאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות:

וניתן לקבלם מודפסים על-ידי פניה לחברת גלקסוסמייטקלין רח' בזל
25 פתח תקווה טלפון: 03-9297100.

בברכה,

טניה רשקובן

רוכחת ממונה