

עלון לצריכן לפי תקנות הרוקחים (תק Shirim) התשמ"ו - 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רפואי בלבד

ריברווקסבן פרופארם 15 מ"ג

ריברווקסבן PROFARUM 20 מ"ג

טבליות מצופות

כל טבליה מכילה:

ריברווקסבן 15 מ"ג (rivaroxaban 15 mg)

ריברווקסבן 20 מ"ג (rivaroxaban 20 mg)

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתכשיר: ראה סעיף 6 " מידע נוספת" וסעיף 2 " מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה".

קרא בעיון את העלון עד סוףו לפני שימוש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.

תרופה זו נרshima לטיפול במחלתה. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

בנוסף לעלון, לתכשיר ריברווקסבן פרופארם קיימים כרטיסים מידע בטיחותי לטיפול. כרטיס זה מכיל מידע בטיחותי חשוב שעלייך לדעת לפני התחלה הטיפול ובמהלך הטיפול בריברווקסבן פרופארם ולפועל על פי:

יש לעיין בכרטיסים מידע בטיחותי לטיפול ובעלון לצריכן לפני השימוש בתכשיר.

יש לשמר את הכרטיס והעלון לעין נוספת במקרה הצורך.

1. למה מיועדת התרופה?

ריברווקסבן פרופארם מיועד למונגרים במצבים הבאים:

- למניעת קריישי דם במוח (שבץ) ובכלי דם אחרים בגוף, בחולים הסובלים מכאב לב לא סדרי הנקריא פרפור פרוזודורים שלא על רקע מסתמי, ומוגריםronic אחד או יותר מה הבאים: אי-ספיקת לב, יתר לחץ דם, גיל (75 או מעל), סוכרת, שבח או התקף איסכמי חולף בעבר.
- لتreatment קריישי דם בוורידי הרגליים (פקקת ורידים عمוקים) ובכלי הדם של הריאות (טסחיף ריאתי) ולמניעת הופעה חוזרת של קריישי דם בכל הדם ברגליים /או בריאות.

ריברווקסבן פרופארם מיועד לילדים ומתבגרים מתחת לגיל 18 השוקלים בין 30 ק"ג ל-50 ק"ג:

- لتreatment בקריישי דם בוורידים (פקקת ורידים טסחיפית) ולמניעת הופעה חוזרת של קריישי דם בוורידים או בכלי הדם של הריאות, לאחר טיפול התחלתי של לפחות 5 ימים עם תרופות להזרקה המשמשות לטיפול בקריישי דם.

קבוצה טיפולית: ריברווקסבן פרופארם שייר לקבוצת תרופות הנקריאת נוגדי קריישה ופועל על-ידי הקטנת הנטייה לייצור קריישי דם וזאת על-ידי חסימת גורם המעורב בתהליכי הקריישה (פקטור Xa).

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לריברווקסבן או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. לרשותה המרכיבים הללו פעילים, ראה סעיף 6 " מידע נוספת".
- אתה סובל מדימום מוגבר.
- יש לך מחלת או מצב באיבר בגין שмагברים את הסיכון לדימום רציני (כגון כיב קיבה, חבלה או דימום במוח, ניתוח במוח או בעניינים שהתרחש לאחרונה).
- אתה נטול תרופות למניעת קריישי דם (כגון ואפרין, דביגטראן, אפיוקסבן או הפרין), מלבד במקרים של מעבר מטיפול בגין קריישה אחד לשני או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר וריד או עורקי כדי להשאיו פתוח.
- אתה סובל ממחלה כבד הגורמת לעלייה בסיכון לדימום.
- את בהריון או מניקה.

אל טיפול ריברווקסבן PROFARUM וספר לרופא אם אחד מהמרכיבים המתוארים מעלה חל עליך.

ازהרות מיוחדות הנוגעת לשימוש בתרופה שוחח עם הרופא או הרוקח לפני נטילת ריברוקסבן פרופארם.

- נדרשת זהירות מיוחדת בשימוש בריברוקסבן פרופארם. לפני הטיפול בריברוקסבן פרופארם, ספר לרופא:
- אם אתה בסיכון גבוה לדימום כפי שניתן להיות באחד הממצבים הבאים:
 - מחלת כליה חמורה במבוגרים וביניות עד חמורה בילדים וمتתגרים מאחר שתפקוד הכליות עלול להשפיע על כמות התרופה הפועלת בגוף (ראה סעיף 3 "כיצד תשתמש בתרופה?" לגבי המין המומלץ במקרה של מחלת כליה).
 - אתה נוטל תרופות אחרות למניעת קריישי דם (כגון וארפין, דיביגטראן, אפייקסבן או הפרין), כאשר אתה עובר מנגד קרישא אחד למשנהו או כאשר אתה מקבל הפרין דרך צנתר וריד או עורק כדי להשאירו פתוח (ראה בסעיף 2 "אינטראקטזיות/תגובהות בין תרופתיות").
 - אתה סובל מדימומיים.
 - לחץ דם גבוה מאוד שאתה מאוזן באמצעות טיפול רפואי.
 - מחלת בקיבה או בעוריה העוללה לגרום לדלקת המעי או הקיבה, או דלקת بواسטת כתוצאה, למשל, מחלת החזר קיבתי-ושטי (מחלה שבאה חומצה מהקיבה עולה לוושט) או גידולים הממוקמים בקיבה או בעוריהם או באיברי המין או דרכי השתן.
 - בעיות בכלי הדם של רשתית העין (רטינופתיה).
 - מחלת ריאות שבה הסמונות מורחבים ומלאים בהפרשות מוגלאות (ברונכיאקטזיות) או דימום קודם מהיריה.
 - אם יש לך מסתם לב מלאכותי.
 - אם ידוע לך כי אתה סובל ממחלה בשם תסמונת אנטיפוסופוליפידית (הפרעה במערכת החיסון אשר גורמת לסיכון מוגבר לקרישי דם), ספר לרופא והוא יחליט אם יש לשנות את הטיפול.
 - אם הרופא קבע שלחץ הדם שלך אינו יציב או שמתוכנן בעבורך טיפול ניתוח או אחר להסרת קריש הדם מהיראות.

אם אחד מהממצבים המذכרים לעיל קשור אליו ספר לרופא לפני נטילת התרופה, הרופא יחליט אם יש לטפל בך בריברוקסבן פרופארם ואם אתה זקוק למעקב צמוד.

- אם הרופא יחשוב שאתה נמצא בסיכון מוגבר לפתח כיב קיבה או מעי, יתכן שייתן לך גם טיפול למניעתו.
- אם אתה עומד לעבור ניתוח או הלייר פולשנি:
 - חשוב ביותר ליטול ריברוקסבן פרופארם לפני ואחרי הניתוח או ההלייר הפולשני בדיק בזמנים שקבע לך הרופא.
 - אם צנתר או זריקה תוך שדרתיים (כגון לאלהוש אפידורלי או שדרתי או לשיכור כאב) מעורבים בניתוח:
 - חשוב ביותר ליטול ריברוקסבן פרופארם לפני ואחרי הזריקה או הסרת הצנתר בדיק בזמנים שקבע לך הרופא.
 - פנה מיד לרופא אם אתה סובל מחוסר תחושה או מחולשה ברגליים או מעי או בשלפוחית השנתן לאחר התפוגגות האלחוש, מאחר שיש צורך בהתרבות רפואית דחופה.

ילדים וمتתגרים

טבליות ריברוקסבן פרופארם אין מומלצות **ילדים השוקלים פחות מ-30 ק"ג**, אין מספיק מידע על השימוש בילדים ובמתתגרים בהתאם למוגדרים.

אינטראקטזיות/תגובהות בין תרופתיות
אם אתה לוקח או אם לוקח לאחרונה תרופות אחרות, כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח.

- במיוחד אם אתה לוקח:
- תרופות מסוימות נגד זיהומיים פטריטיים (כגון פולוקונגנАЗול, איטראקונגנАЗול, ווריקונגנАЗול, פואקונגנАЗול), פרט לאלו שמיועדות רק למריחה על העור.
 - טבליות המכילות קטוקונגנАЗול לטיפול בתסמונת קושינג – מצב שבו הגוף מייצר עודף של קורטיזול.
 - תרופות מסוימות לטיפול בזיהומיים חידקיים (כגון קליטינומיצין, אריתרומיצין).
 - תרופות אנטיזיראליות מסוימות לטיפול בזיהומיים של נגיף האידס (VH) (כגון ריטונאביר).
 - תרופות נגדות קרישא אחרות (כגון אנטקופארין, קלופידוגרל או אנטוגוניסטים לויטמין K, כגון וארפין ואצנטוקומרול).
 - תרופות נגדות דלקת ומשככות כאב (כגון נפרוקסן או חומצה אצטילסיליצילית [אספירין]).

- דרונדרון, תרופה לטיפול בדוחק לא סדי.
- תרופות מסוימות לטיפול בדיכאון (מעכבים סלקטיביים של ספיגה חוזרת של סרוטוניין [SSRIs] או מעכבים של ספיגה חוזרת של סרוטוניין ונוראפינפרין [SNRIs]).

אם אחד מהמצברים הנזכרים לעיל קשור אליו ספר לרופא לפני נטילת התרופה, תרופות אלו עלולות לגרום להגברת פעילות ריברוקסבאן פרופארם. הרופא יחליט אם לטפל בכך עם ריברוקסבאן פרופארם ואם יש צורך בהשגה רפואית צמודה.

כמו כן, יש לידע את הרופא או הרוקח אם אתה לוקה:

- תרופות מסוימות לטיפול בכפין (אפילפסיה) (כגון פניטואין, קארבאמאזפין, פנובארביטאל).
- התcsiיר הצימי לטיפול בדיכאון סנט ג'נס וורט (היפריקום).
- ריפאמפיצין (אנטיביוטיקה).

אם אחד מהמצברים הנזכרים לעיל קשור אליו ספר לרופא לפני נטילת התרופה, תרופות אלו עלולות לגרום להורדת פעילות ריברוקסבאן פרופארם. הרופא יחליט אם לטפל בכך עם ריברוקסבאן פרופארם ואם יש צורך בהשגה רפואית צמודה.

שימוש בתרופה ומדוזן חוובה ליטול את התרופה עם מזון ולבלווע עם מים.

הירין, הנקה ופוריות
אל תיטל ריברוקסבאן פרופארם אם אתה בהירין או מניקה.
אם יש סיכוי שתיכנסו להירין, עליך להשתמש באמצעי מנעה אמין בזמן נטילת ריברוקסבאן פרופארם.
אם כניסה להירין במהלך נטילת התרופה, פני מיד לרופא, אשר יחליט לגבי המשך הטיפול.

נהיגה ושימוש במכונות
ריברוקסבאן פרופארם עלול לגרום לשחרחות (טופעת לוואי שכיחה) או לעילפון (טופעת לוואי שכיחה) (ראה סעיף 4 "טופעות לוואי"). אין להנוגה, לרכיב על אופניים, להשתמש בכלים או להפעיל מכונות בזמן השימוש בריברוקסבאן פרופארם אם אתה מושפע מתסמים אלו.

מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה
התרופה מכילה לקטוז ונתרן.
אם נאמר לך על-ידי הרופא שאתה סובל מאיסביולות לסוכרים מסוימים, פנה לרופא לפני שאתה מתחיל ליטול ריברוקסבאן פרופארם.
התרופה מכילה פחות מ-1 מילימול נתרן (23 מ"ג) בכל טבלייה ועל כן נחשבת במהלךה "נטולת נתרן".

3. כיצד תשתמש בתרופה?

- יש להשתמש בתכשיר תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר. המינון ואופן הטיפול יקבעו על-ידי הרופא בלבד.
- **մեջություն**
 - למניעת קרישי דם במוח (шибץ) ובכלי דם אחרים בגוף המינון המקובל בדרך כלל הוא טבלייה אחת של 20 מ"ג פעם ביום.
 - אם אתה סובל מליקוי בתפקוד הכליאות, יתכן שהמינון יופחת לטבלייה אחת של 15 מ"ג פעם ביום.
 - אם אתה צריך לעבור הליך לטיפול בחסימה בכלי הדם בלבד (הליך בשם התערבות כליאלית מلعורית - PCI עם החדרת תומacen), קיימן מידע מוגבל על הפחחת המינון לטבלייה אחת של ריברוקסבאן פרופארם 15 מ"ג פעם אחד ביום בנוסף לתרופה מעכבת טסיות, כגון קלופידוגרל.
 - לטיפול בקרישי דם בורידי הרגליים ובכלי הדם של הריאות ולמניעת הופעה חוזרת של קרישי דם המינון המקובל בדרך כלל הוא טבלייה אחת של 15 מ"ג פעם ביום במשך 3 שבועות הראשונים, ובמהמשך טבלייה אחת של 20 מ"ג פעם ביום. לאחר השלמת לפחות 6 חודשים של טיפול, יתכן שהרופא יחליט להפסיק את הטיפול בריברוקסבאן פרופארם 10 מ"ג טבלייה אחת ביום.
 - אם אתה סובל מליקוי בתפקוד הכליאות ונוטל ריברוקסבאן פרופארם 20 מ"ג פעם אחד ביום, יתכן שהרופא יחליט להפחית את המינון לאחר 3 שבועות לטבלייה אחת של 15 מ"ג פעם ביום, זאת במקרה שהסתיכו לדימום גדול יותר מהטiccון להיווצרות עוד קריש דם.

ילדים ומתבגרים

•

- המינון של ריברוקסבאן פרופארם תלוי במשקל הגוף, ויחושב על ידי הרופא.
 - המינון המומלץ עבור ילדים ומתבגרים השוקלים בין 30 ק"ג ופחות מ-50 ק"ג הוא טבליה אחת של ריברוקסבאן פרופארם 15 מ"ג פעם ביום.
 - המינון המומלץ עבור ילדים ומתבגרים השוקלים 50 ק"ג או יותר הוא טבליה אחת של ריברוקסבאן פרופארם 20 מ"ג פעם ביום.
- יש ליטול מנת ריברוקסבאן פרופארם עם משקה (לדוגמה מים או מיץ) במהלך ארוחה. יש ליטול את הטබליות כל יום בשעה קבועה. אני שקול שימוש בשעון מעורר כדי להזכיר לך. להורים או מטפלים: אני התבוננו בילד במהלך הנטיילה כדי לוודא שהמנון המלא נלקח.
- כיוון שמנון ריברוקסבאן פרופארם מבוסס על משקל גופו, חשוב להקפיד על ביקורים מתוכננים אצל הרופא, כי יתכן שהיא צריכה להתאים את המינון ככל שמשקל הגוף משתנה.
- לעולם אין להתאים מינון של ריברוקסבאן פרופארם בעצמך.** הרופא יתאים את המינון במידת הצורך.

אין לחזות את הטבליה בבניין לספק חילק ממנת הטבליה. אם נדרש מינון נמוך יותר, השתמש בתרופה אחרת המכילה ריברוקסבאן 1 מ"ג/מ"ל במצב גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי (למתן דרך הפה). ילדים ומתבגרים שאינם מסוגלים לבלוע טබליות שלמות, יש להשתמש בתרופה אחרת המכילה ריברוקסבאן 1 מ"ג/מ"ל במצב גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי. אם ריברוקסבאן 1 מ"ג/מ"ל גרגירים להכנת תרחיף למtan פומי אינם זמינים, ניתן לרסק את הטבליה ולערबב עמו מים או מחלת תפוחים, מיד לפני נטילת התרופה המרוסקת. במידת הצורך, הרופא יתן לך ריברוקסבאן פרופארם מרוסק דרך צינור הזנה לקיבה.

אין לעבר על המנה המומלצת.

משך הטיפול

יש ליטול ריברוקסבאן פרופארם כל יום עד שהרופא יורה לך להפסיק. הרופא יכול לגבי משך הטיפול בתרופה.

צורת הנטיילה

חובה ליטול את התרופה עם מזון ומומלץ לבלוע את הטבליה עם מים. אם קשה לך לבלוע את הטבליה בשלמותה, דבר עם הרופא על דרכי אחרות ליטול ריברוקסבאן פרופארם. ניתן לרסק את הטבליה ולערבב עמו מים או מחלת תפוחים, מיד לפני נטילת התרופה. יש לאכול מיד לאחר נטילת התרופה המרוסקת. במידת הצורך, הרופא יתן לך ריברוקסבאן פרופארם מרוסק דרך צינור הזנה לקיבה. אין מידע לגבי ח齊יה/לעיסה.

נטילת התרופה באותו זמן בכל יום, תסייע לך לזכור את נטילתה.

אם אתה יורך את המנה או מקיא

- אם חלפו פחות מ-30 דקות לאחר נטילת ריברוקסבאן פרופארם, יש ליטול מנה חדשה.
- אם חלפו יותר מ-30 דקות לאחר נטילת ריברוקסבאן פרופארם, אין ליטול מנה חדשה. במקרה זה, יש ליטול את המנה הבאה של ריברוקסבאן פרופארם במועד המתוכן הבא.

יש לפנות לרופא אם אתה יורך את המנה או מקיא לאחר נטילת ריברוקסבאן פרופארם שוב ושוב.

אם נטלת בטיעות מינון גבוהה יותר עליך לפנות מיד לרופא המטפל. נטילת ריברוקסבאן פרופארם יתר על המידה מגבירה את הסיכון לדימום.

אם נטلت מנת יתר או אם בטיעות בעלILD מן התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו בזמן הדרושים

מבוגרים, ילדים ומתבגרים:

- במינון של טבליה אחת של ריברוקסבאן פרופארם 15 מ"ג או ריברוקסבאן פרופארם 20 מ"ג פעם ביום, יש ליטול מנה מיד כשנזכרת אך בשום אופן אין ליטול מנה כפולה או שתי מנות באותו יום! יש ליטול את המנה הבאה למועדת היום ובמהמשך פעם ביום כרגע ולהיעזר ברופא.

מבוגרים:

- במנון של טבלייה אחת של 15 מ"ג **פערמים** ביום יש ליטולמנה מיד כשןצרת. אין ליטול יותר משתי טבליות של 15 מ"ג ביום אחד. ניתן ליטול שתי טבליות של 15 מ"ג בלבד לקבלת מנון של 30 מ"ג ביום אחד. למועדת היום יש להמשיך וליטול טבלייה אחת של 15 מ"ג פערמים ביום.

יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על-ידי הרופא.

גם אם חל שיפור במצב בריאותך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא התייעצות עם הרופא אחר שריבורוקסבן פרופארם מטיפול במצבים חמורים ומונע אותם.

אם אתה **מפסיק את נטילת התרופה** אתה פוגע ביכולת הטיפול והמניעת שלה.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התוויות והמנה **בכל פעע** שהינך נוטל תרופה. הרכב **משמעותי** אם הינך **זקוק** להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, **היוועץ** ברופא או ברוקח.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש בריבורוקסבן פרופארם עלול לגרום לתופעות לוואי בחלוקת הממשמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מ אף אחת מהן.

כמו תרופות להפחחת היוציארות קריישי דם דומות אחרות, ריבורוקסבן פרופארם יכול לגרום לדימום העולול לסיכון חיים. דימום חזק עלול לגרום לירידה פתאומית בלחץ הדם (שוק). בחלוקת מהמרקם הדימום יכול להיות סמי.

יש לפנות מיד לרופא אם אתה או הילד סובל מאותת מתופעות הלואן הבאות:
סימנים לדימום:

- דימום מוחי או תוך גולגולתי (تسمנים יכולים לכלול כאב ראש, חולשה בצד אחד, הקאה, פרכוס, ירידה ברמת ההכרה ונוקשות בצוואר. זהו מצב חירום רפואי חמור, יש לפנות לטיפול רפואי מיידי!).
 - דימום ממושך או מגבר.
 - חולשה יצאת דופן, עיפות, חיוורן, סחרחות, כאב ראש, נפיחות בלתי מוסברת, קוצר נשימה, כאב בחזה או תעוקת חזה (אנגינה פקטורייס).
- הרופא יחליט אם דרישה השגחה צמודה או דרוש שינוי הטיפול.

סימנים לתגובה עוריות חמורות:

- פריחה אינטנסיבית שמתפששת על העור, שלפוחיות או פצעים ברקמה רירית, למשל בפה או בעיניים (toxic epidermal necrolysis/Stevens-Johnson syndrome).
- תגובה לתרופה הגורמת לפריחה, חום, דלקת של איברים פנימיים, חריגות בדם וחולי' מערכת (تسمונת DRESS).

התדריות של תופעות לוואי אלו היא נדירה מאד (עד משתמש אחד מתוך 10,000 משתמשים).

סימנים לתגובות אלרגיות חמורות:

- התנפחות הפנים, השפתיים, הפה, הלשון או הגרון; קשי' בלייה; חרלה וקשי' נשימה; צניחה פתאומית של לחץ הדם.
- התדריות של תגובות אלרגיות חמורות הן נדירות מאד (תגובה אנאפילקטית, כולל שוק אנאפילקטי; עלולות להשפיע על עד 100,000 משתמש אחד מתוך 100).

תופעות לוואי נוספות במוגרים, ילדים ומתבגרים

תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שעולות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10):

- ירידה בתאי דם אדומים העולוה לגרום לחיוורן, חולשה או לקוצר נשימה
- דימום בקיבה או במעי, דימום באיברי המין והשתן (כולל דם בשתן ודימום וסת' מוגבר), דימום מהאף, דימום בחניכיים
- דימום לטור העין (כולל דימום מלובן העין)
- דימום לטור רקמה או חיל בגוף (שפט דם פנימי מקומי, חבלה)
- שיעול דמי
- דימום מהעור או מתחת לעור
- דימום לאחר ניתוח

- דליפה של דם או נזול מפצע ניתוחי
- נפיחות בגפיים
- כאב בגפיים
- תפקוד לקוי של הכליות (יכול להתגלות בבדיקות המבוצעות על-ידי הרופא)
- חום
- כאב בטן, קשיי עיכול, בחילה או הקאה, עצירות, שלשול
- לחץ דם נמוך (תסמינים לכך יכולים להיות סחרחות או עלפון כאשר אתה נעמד)
- ירידת כללית בכוכו ובאנרגיה (חולשה, עייפות), כאב ראש, סחרחות
- פריחה, גרד בעור
- בדיקות דם יכולות להצביע על עליה באנדזימי כבד מסוימים

תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שועלות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 100):

- דימום תוך מוח או תוך גולגולתי (ראה לעלה 'סימנים לדימום')
- דימום לתוך מפרק הגורם לכאב ונפיחות
- תרומבווציטופניה (מספר נמוך של טסיות דם, שהן תאים ממשיים לקרישת הדם)
- תగובות אלרגיות, כולל תגובות אלרגיות בעור
- תפקוד לקוי של הכבד (יכול להתגלות בבדיקות המבוצעות על-ידי הרופא)
- בדיקות דם יכולות להצביע על עליה בבילירובין, באנדזימים מסוימים של הלבלב או הכבד או במספר הטסיות עלפון
- תחושה כללית לא טובה
- דופק מואץ
- יובש בפה
- חחלת (אורטיקירה)

תופעות לוואי נדירות (rare) (תופעות שועלות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 1,000):

- דימום לתוכו שריר
- כולסטאזיס (זרימה מופחתת של מריה), דלקת הכבד (הפטיטיס) כולל פגיעה בתאי הכבד (כבד דלקתי כולל פגעה כבדית)
- הצהבהה של העור והעיניים (צחבת)
- נפיחות מקומית
- שטוף דם פנימי מקומי (המתomega) במפשעה כתוצאה מסיבוך של הליר בלבד שבו מוכנס צנתר לעורק ברגלי

תופעות לוואי נדירות מאוד (very rare) (תופעות שועלות להשפיע על עד משתמש אחד מתוך 10,000):

- הצלברות של אוזינופיליים, סוג של תא דם גראנוולצייטיים לבנים הגורמים לדלקת בריאות (דלקת ריאות אוזינופילית).
- אי-ספיקת כליות לאחר דימום חמוץ
- דימום בכללו לפעים מלאה בנווכחות של דם בשתן המוביל לחוסר יכולת של הכליות לעבוד כראוי (נפרופתיה הקשורה לנוגדי קרישה).
- לחץ מוגבר בשוריין הרגליים או הזרועות לאחר דימום, הגורם לכאב, לנפיחות, לשינוי תחושה, לחוסר תחושה או לשיתוק (تسمונת מדור לאחר דימום)

תופעות לוואי בילדים ומתבגרים
באופן כללי, תופעות הלוואוי שנצפו בילדים ומתבגרים שטופלו בריבורוקסבאן פרופארם היו דומות לאלו שנצפו במבוגרים והוא בעיקר קלות עד בינוינו בחומרנתן.

תופעות לוואי שנצפו לעתים קרובות יותר בילדים ומתבגרים:

- תופעות לוואי שכיחות מאוד (very common)** (תופעות שועלות להשפיע על יותר משתמש אחד מתוך 10):
- כאב ראש
 - חום
 - דימום מהאף
 - הקאות

תופעות לוואי שכיחות (common) (תופעות שלולות להשפייע על עד משתמש אחד מטור 10):

- דופק מגבר
- בדיקות דם יכולות להצביע על עלייה בבילירובין (פיגמנט מרה)
- תרומבווציטופניה (מספר נמוך של טסיות דם, שהן תאים שמייעים לקרישת הדם)
- דימום וסתן כבד

תופעות לוואי שאין שכיחות (common) (תופעות שלולות להשפייע על עד משתמש אחד מטור 100):

- בדיקות דם יכולות להצביע על עלייה בתת-קטגוריית בילירובין (בילירובין ישיר, פיגמנט מרה)

אם הופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואוי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עיר להתייעץ עם הרופא.

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי" עקב טיפול רפואי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקoon לדיווח על תופעות לוואי, או על ידי כניסה לקישור: <https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מנע הרעלת! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקום סגור מחוץ להישג ידם וטוווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלת. אל תגרום להקה לא הוראה מפורשת מהרופא.
- אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך הת滂וגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך הת滂וגה מתיחס ליום האחרון של אותו חודש.
- אין לאחסן את התרופה בטמפרטורה מעל ל- 25°C .
- אין להשליך תרופות למי בווי או לאשפה ביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאין בשימוש עוד.
- אמצעים אלה יסייעו בהגנה על הסביבה.

6. מידע נוסף

- **נוסף על החומר הפעיל התרופה מכילה גם:**
ליבת הטבליה:

Cellulose microcrystalline, lactose monohydrate, hypromellose 2910, croscarmellose sodium, magnesium stearate, sodium laurilsulfate.

ציפוי הטבליה:

Hypromellose 2910, macrogol 3350, titanium dioxide, iron oxide red.

- **כיצד נראה התרופה ומה תוכן האריזה:**
ריבוקסבאן פרופארם 15 מ"ג: טבליות מצופות עגולות, בצבע אדום, קמורות שני הצדדים ומוסומות ב-"15" בצד אחד.
ריבוקסבאן פרופארם 20 מ"ג: טבליות מצופות עגולות, בצבע אדום כהה, קמורות שני הצדדים ומוסומות ב-"20" בצד אחד.
הטבליות מגויות במגשיות (בליסטרים) באזזה של 28 טבליות.

- **בעל הרישום וכותבותו:** פרופארם בע"מ, בן גוריון 23, זכרון יעקב.

- **שם הייצור וכותבותו:**

Adalvo Limited, Malta life sciences park, building 1, level 4, Sir Temi Zammit Buildings,
San Gwann, Industrial estate, San Gwann, SGN 3000, Malta

- נערך באוקטובר 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
- מספרי רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במסדרון הבריאות:
ריבוקסבאן פרופארם 15 מ"ג: 175-29-36752-99
ריבוקסבאן פרופארם 20 מ"ג: 175-30-36753-99
- לשם הפשטות ולהקלת הקראיה עלון זה מנוט בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.