

עלון לצריכן לפי תקנות הרווחחים (תקשיירים) התשמ"ז – 1986

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

אנטקאביר טبع 0.5 מ"ג

טבליות מצופות

אנטקאביר טבע 1 מ"ג

טבליות מצופות

הרכב:

כל טבליה מצופה של אנטקאביר טבע 0.5 מ"ג מכילה:
אנטקאביר (כמוניידראט) 0.5 mg, (as monohydrate) 0.5 mg

כל טבליה מצופה של אנטקאביר טבע 1 מ"ג מכילה:
אנטקאביר (כמוניידראט) 1 mg, (as monohydrate) 1 mg

לمزيد על מרכיבים בלתי פעילים, ראה סעיף 6 - " מידע נוספת".
קרא **בעין את העalon עד סוף בטרכ תשמש בתרופה.** עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקח.
תרופה זו נרשמה לטיפול במחלתך. אל תעכבר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק להם אפילו אם נראה לך כי מחלתם דומה.

התרופה מיועדת למבוגרים.

1. למה מיועדת התרופה?

אנטקאביר טבע הינה תרופה אנטי-ויראלית לטיפול בדלקת כבד כרונית הנגרמת על-ידי זיהום בנגיף hepatitis B (HBV) במבוגרים עם:

- מחלת כבד מפוצה ועדות לשכפול נגיפי פעיל ועליה עקבית בסורום של רמותAlanine Aminotransferase (ALT).
- מחלת כבד לא מפוצה.

זיהום כרוני על-ידי נגיף hepatitis B (HBV) עלול לגרום לנזק בכבד. אנטקאביר טבע מוריידה את רמות הנגיף בגוף ובקר משפרת את מצב הכבד.

קובוצת תרפואית:

נוקלאוזידים ונוקלאוטידים מקובצת מעכבי האנזים רורס טרנסקריפטاز.

2. לפני השימוש בתרופה:

אין להשתמש בתרופה אם:

- אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל (אנטקאביר) או לאחד ממרכיבי התרופה האחרים (ראה סעיף 6 - " מידע נוספת").

ازהירות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה:

- נתילת אנטקאביר טבע אינה מוגנת מכך להדביק אנשיים אחרים בנגיף hepatitis B (HBV) דרך מגע מיידי או דרך נזלי הגוף (כולל זיהוםם בדם). מסיבה זו חשוב לנתקות באמצעות זיהירות מתאימים על מנת למנוע מזרים להידבק בדלקת כבד נגיפית מסווג B (HBV). קיים חיסון נגד דלקת כבד מסווג B להגנה על אנשים בסיכון להדבקה בנגיף hepatitis B (HBV).

- אנטקאביר טבע שייכת לקבוצת תרופות שיכולות לגרום לחמצת לקטית (עודף חומצה לקטית בدم) ולהגדלה של הכלב. תסמיינים כגון בחילות, הקאות וכאבי בטן יכולים להצביע על התפתחות של חמצת לקטית. תופעת לוואי נדירה אך חמורה זו לעיתים עלולה להיות קטלנית. חמצת לקטית מתרחשת בתדריות גבוהה יותר בנשים, במיוחד אם הן סובלות מעודף משקל רב. הרופא ינטר את מצבך הרפואי באופן קבוע במהלך הטיפול באנטקאביר טבע.

לפני הטיפול באנטקאביר טבע ספר לרופא אם:

- סבלת בעבר מליקוי בתפקוד הכלילי. הדבר חשוב מכיוון שאנטקאביר טבע מפונה מהגוף דרך הכלילות וייתכן שהיא צריכה לשנות את המינון או את זמני הנטילה של התרופה.
- אין להפסיק ליטול את התרפיה מבלי להיזוע ברופא אחר שתיתacen החמרה בדלקת הכלב לאחר הפסקת הטיפול. כאשר הטיפול באנטקאביר טבע מופסק, הרופא ימשיך לנטר את מצבך ויעורו לך בדיקות דם במשך מספר חודשים.
- בරר עם הרופא אם תפקודי הכלב שלך תקין. אם לא, בברר מה תהיה השפעת התפקוד הלקי של הכלב על הטיפול באנטקאביר טבע.
- אתה נשא של HIV (נגיף כשל חיסוני - Virus Human Immunodeficiency). אין ליטול אנטקאביר טבע לטיפול ב-HIV, מכיוון שיעילות הטיפול ב-HIV בעתיד עלולה להיות מופחתת. אנטקאביר טבע אינה שליטה על זיהום של ה-HIV.
- קיבלת בעבר טיפול כנגד דלקת כבד כרונית מסווג B.

ילדים ומתבגרים

אנטקאביר טבע אינה מיועדת לשימוש ילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 18 שנים.

תגובה בין תרופתיות אם אתה לוקח או אם לוקחת לאחרונה תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר עלייך לרופא או לרוקח.

שימוש בתרופה ומזון

ברוב המקרים ניתן ליטול אנטקאביר טבע עם אוכל או ללא אוכל. יחד עם זאת, אם קיבלת בעבר טיפול בתרופה המכילה את החומר הפעיל למיבודין (lamivudine), יש לפעול באופן הבא:
אם הועברת לטיפול באנטקאביר טבע לאחר שהטיפול למיבודין לא הצליח, יש ליטול אנטקאביר טבע פעמיים ביום על קיבת ריקה.
אם מחלת הכלב שלך מתקדמת מאוד, הרופא גם ינחה אותך ליטול אנטקאביר טבע פעמיים ביום על קיבת ריקה. משמעות קיבת ריקה הינו לפחות שעתיים אחריו ארוחה ולפחות שעתיים לפני הארוחה הבאה.

הירין הנקה ופוריות הירין

- יש לידע את הרופא אם אתה בהירין או מתכונת להיכנס להירין. טרם הוכח שאנטקאביר טבע בטוחה לשימוש במהלך ההירין.
- אין ליטול אנטקאביר טבע במהלך ההירין אלא אם כן הרופא הורה לך בכך מפורש אחרת.

פוריות

- חשוב כי נשים בגיל הפוריות ישטמשו באמצעות מניעה יעילים במהלך הטיפול באנטקאביר טבע, על מנת להימנע מכניסה להירין.

הנקה

- אין להניך בתקופת הטיפול באנטקאביר טבע. יש לידע את הרופא אם אתה מניקה. לא ידוע אם אנטקאביר, המרכיב הפעיל של אנטקאביר טבע, מופרש לחלב האם.

נaging ו שימוש במכונות
סחרchorot, עייפות (תשישות) ונמנום (ישנוויות) הין תופעות לוואי שכיחות בשימוש בתרופה זו ויכולות להשפיע על יכולתך לנוהג ברכב או להפעיל מכונות.
אם יש לך חששות כלשהם היועץ ברופא המטפל.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אין בטוח בכך גען ומינון ואופן הטיפול בתרופה.

לא כל המטופלים צריכים ליטול אותו מינון של אנטקابر טבע.

המינון ואופן הטיפול קבועו על-ידי הרופא בלבד. בדוק עם הרופא המטפל או הרוקח אם אין בטוח בכך כלל המינון המומלץ במוגרים הוא 0.5 מ"ג או 1 מ"ג פעמיים, בבליעה דרך הפה.

המינון שיקבע עבורה תלוי ב:

- אם טיפול בעבר בזיהום בגיף הפטיטיס B או אילו תרופות קיבלת.
- אם יש לך בעיות בכליות. יתכן שהרופא ירשום לך מינון נמוך יותר של התרופה, או ינחה אותך ליטול בתדירות נמוכה יותר מפעם ביום.
- מצב הגוף שלך.

יש ליטול את התרופה בהתאם למינון זמני הנטילה שנקבעו על-ידי הרופא על מנת להבטיחיעילות מלאה של התרופה ועל מנת להפחית התפתחות של עמידות לטיפול. יש ליטול אנטקابر טבע כל זמן שהרופא אומר לך הרופא ינחה אותך אם ומתי ניתן להפסיק את הטיפול. חשוב לא להחמיר אף מנה של הטיפול.

אין לעבור על המנה המומלצת.

חלק מהמטופלים חייבים לנקה ריקה על קיבה ריקה (ראה פרק 2 תחת סעיף "שימוש בתרופה ומזון"). אם הרופא ינחה אותך לנקה את התרופה על קיבה ריקה, יש לנקה את התרופה לפחות שעתיים אחרי ארוחה ולפחות שעתיים לפני הארוחה הבאה.

כתיישה/חציה/ לעיסה
אנטקابر טבע 0.5 מ"ג - אין לחוץ את הטבליה בהיעדר קו חציה.
אנטקابر טבע 1 מ"ג - מותר לחוץ את הטבליה בקו החציה.
אין מידע לגבי כתיישה/lezisa של הטבליות.

אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלו' ליד מני התרופה, פנה מיד לרופא או לחדר מין של בית חולים והבא אריזת התרופה איתך.

אם שכחת ליטול תרופה זו
חשוב לא לשכוח ליטול אף מנה.

אם שכחת ליטול את התרופה בזמן הדרוש, יש ליטול את המנה שנשכח מיד כשנזרת וליטול את המנה הבאה בזמן הרגיל. אם זמן נטלת המנה הבאה קרוב, אין לנקה את המנה שנשכח אלא ליטול את המנה הבאה בזמן הרגיל. אין ליטול מנה כפולה במקום המנה שנשכח.

יש להתميد בטיפול כפי שהוא מומלץ על-ידי הרופא.

אם אתה מפסיק את Nutzung התרופה

אין להפסיק ליטול את התרופה ללא התייעצות עם הרופא. ישנים מטופלים שעם הפסקת Nutzung התרופה מדוחים על תסמים חמורים מאוד של דלקת כבד כאשר הם מפסיקים את הטיפול באנטקابر טבע. ספר מיד לרופא על כל שינוי בתסמים שהבחנת בהם לאחר הפסקת הטיפול.

אין ליטול תרופות בחושך! בדוק התווית והמנה **בכל פעע שהינך נוטל תרופה.** הרכב משקפיים אם הינך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות הקשורות בשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקט.

4. תופעות לוואי:

כמו בכל תרופה, השימוש באנטקאביר טبع עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלואן. יתכן שלא תסבול מכך אחד מהן.

מטופלים באנטקאביר טבע דיווחו על תופעות הלואן שלහן:

תופעות לוואי שכיחות (תופעות שימושיות לפחות ב - 1 מתוך 100 מטופלים):
כאב ראש, נזודי שינה (חוסר יכולת לישון), עייפות (תשישות קיצונית), סחרחות, ישנוניות, הקאות, שלשלות, בחילה, בעיות עיכול, עלייה בرمמות אנדמי הכבד בדם.

תופעות לוואי שאינו שכיחות (תופעות שימושיות לפחות ב - 1 מתוך 1,000 מטופלים):
פריחה, נשירת שיער.

תופעות לוואי נדירות (תופעות שימושיות לפחות ב - 1 מתוך 10,000 מטופלים):
תגובה אלרגית חריפה.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלואן חממירה, או כאשר אתה סובל מטופעת לוואי שלא הוזכרה לעלון, עלייך להתייעץ עם הרופא.

דיזון על תופעות לוואי:

ניתן לדוח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיזון על תופעות לוואי" עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המukan לדיזון על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

- מניע הרעליה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמר במקומות סגור מחוץ להישג ידים וטווח ראייתם של ילדים /או תינוקות ועל-ידי כר תמנוע הרעליה. אל תגרום להקה [להקה](#) ללא הוראה מפורשת מרופא!
- אין להשתמש בתרופה אחריו תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותן חודש.
- **יש לאחסן באזיזה המקורית, מתחת ל - 25°C.**
- **חייב מדף לאחר הפתיחה הראשונה של אריזת בקבוק: יש להשתמש בתוך 100 ימים, אך לא יותר מתאריך התפוגה.**
- אין להשליך תרופות לביב או לאשפה. שאל את הרוקח כיצד להשמיד תרופות שאין בשימוש. אמצעים אלו יעזרו לשמר על הסביבה.

6. מידע נוסף

נוסף על המרכיב הפעיל, התרופה מכילה גם:
אנטקאביר טبع 0.5 מ"ג:

Mannitol, Cellulose, microcrystalline (Avicel PH 101), Maize Starch-Rx 1500 Pregelatinized, Crospovidone Type A, Magnesium Stearate, Poly(vinyl alcohol) partially hydrolysed (E1203), Titanium Dioxide (E171), Macrogol (polyethylene glycol) MW3350, Talc (E553b).

אנטקאביר טבָע 1 מ"ג:

Mannitol, Cellulose, microcrystalline (Avicel PH 101), Maize Starch-Rx 1500 Pregelatinized, Crospovidone Type A, Magnesium Stearate, Poly(vinyl alcohol) partially hydrolyzed (E1203), Titanium Dioxide (E171), Macrogol (polyethylene glycol) MW3350, Talc (E553b), Iron oxide red (E172).

כיצד נראה התרופה ומה תוכן האrizה:

אנטקאביר טבָע 0.5 מ"ג:

טבליה עגולה בצבע לבן עד לבן שמנת (Off-white), בצד אחד מוטבע "05" ובצד השני מוטבע "E".

אנטקאביר טבָע 1 מ"ג:

טבליה עגולה בצבע ורוד בהיר עד ורוד, עם קוו חצית העומק, בצד אחד מוטבע "1" ובצד השני מוטבע "E/E".

אריזת בקבוק מכילה 30 טבליות מצופות ווסף לחות.
אריזת בליסטר (מגייט) מכילה 7, 10 או 30 טבליות מצופות.
יתכן שלא כל הסוגים והגדלים של האrizות משווים.

שם היצרן ובבעל הרישום וכתובתו:

טבָע ישראל בע"מ
רחוב דבורה הנביאה 124, תל אביב 6944020, ישראל.
העלון נערך בינואר 2024

מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

אנטקאביר טבָע 0.5 מ"ג - 154.78.34441
אנטקאביר טבָע 1 מ"ג - 154.79.34439

לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נכתב בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.