

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء بموجب وصفة طبيب فقط

أوچمنتین معلق 250 ملг/5 مل

مسحوق لتحضير معلق للشرب

يحتوي كل 5 مل معلق على:

250 ملг أموكسيسيلين (ك-ترىبيدراط)

amoxicillin (as trihydrate)

62.50 ملг حمض كلافلوانيك (كملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

يحتوي كل 1 مل معلق على:

50 ملг أموكسيسيلين (ك-ترىبيدراط)

amoxicillin (as trihydrate)

12.5 ملг حمض كلافلوانيك (كملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

لائمة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجلك/من أجل طفلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطيبة مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

يستعمل أوچمنتین لدى الكبار، الأطفال والرضع لعلاج التلوثات التالية:

- تلوثات في الأذن الوسطى والجيوب الأنفية
- تلوثات في الطرق التنفسية
- تلوثات في المسايا البولية
- تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة بما في ذلك التلوثات في الأسنان
- تلوثات في العظام والمفاصل.

أوچمنتین عبارة عن مضاد حيوي الذي يعمل بواسطة إبادة الجراثيم المسببة للتلوثات. فهو يحتوي على دوائين إثنين مختلفين يسميان أموكسيسيلين وحمض كلافلوانيك. ينتمي أموكسيسيلين لفصيلة الأدوية المسماة "بينيسيلينات" التي يمكن أن يتوقف عملها أحياناً (تصبح غير فعالة). إن المركب الفعال الآخر (حمض كلافلوانيك) يمنع حدوث هذا الأمر.

الفصيلة العلاجية

أموكسيسيلين: مضاد حيوي من فصيلة البينيسيلينات

حمض كلافلوانيك: مثبطات الإنزيم بيتا - لاكتاماز

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت أنت أو كان طفلك حساساً (أيلرجي) لـ أموكسيسيلين، لحمض كلافولانيك، لـ بينيسيلين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6)
 - حدث لديك أو لدى طفالك ذات مرة رد فعل تحسسي خطير لأي مضاد حيوي آخر. ذلك قد يشمل طفح في الجلد أو إنفاس الوجه أو الحنجرة
 - حدث لديك أو لدى طفالك ذات مرة مشاكل في الكبد أو يرقان (إصفرار الجلد) عند تناول مضاد حيوي.
- ← لا تتناول أو چمنتين أو لا تعطي لطفلك أو چمنتين إذا ينطبق عليك أو على طفالك واحد مما ذكر. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول/إعطاء أو چمنتين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحذير مع الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أو چمنتين لطفلك أو تناول أو چمنتين إذا:

- وُجد لديك أو لدى طفالك مرض القibleة
 - كنت تناقى أو كان طفالك يتلقى علاجاً جراء مشاكل في الكبد أو الكلية
 - كنت لا تتبول أو كان طفالك لا يتبول بشكل سليم.
- إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان ينطبق عليك أو على طفالك واحد مما ذكر، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول/إعطاء أو چمنتين.

في حالات معينة، من الجائز أن يفحص الطبيب نوع الجرثومة التي تسبب لك تلوث. وفقاً للنتائج، من الجائز أن يعطى لك أو لطفالك أو چمنتين من عيار آخر أو دواء آخر.

حالات يتوجب عليك الإنبهاء إليها

قد يؤدي أو چمنتين إلى نفاقم حالات معينة موجودة، أو يؤدي إلى أعراض جانبية خطيرة. هذه تشمل ردود فعل تحسسية، إختلالات (تشنجات) والإثباب الأمعاء الغليظة. عليك الإنبهاء لأعراض معينة خلال فترة تناولك أو تناول طفالك أو چمنتين، لقليل خطورة حدوث أية مشاكل. انظر 'حالات يتوجب عليك الإنبهاء إليها' في الفقرة 4.

فحوص الدم والبول

أعلم الطبيب بأنك تتناول/أن طفالك يتناول أو چمنتين، وذلك إذا كنت تجتاز أو كان طفالك يجتاز فحوص الدم (مثل فحوص تقييم حالة خلايا الدم الحمراء أو فحوص لوظائف الكبد) أو فحوص البول (فحص نسب الجلوكوز). وذلك لأن أو چمنتين يمكن أن يؤثر على نتائج فحوص من هذا النوع.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

- إذا كنت تتناول/كان طفالك يتناول، إذا تناولت/تناول مؤخراً أو إذا كان من الجائز أن تتناول/يتناول، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، أدوية نباتية وإضافات غذائية، إحكٌ للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.
- إذا كنت تتناول/كان طفالك يتناول ألوپوريںول (يستخدم لعلاج النقرس) مع أو چمنتين، فهناك إحتمال أكبر بأن يحدث لديك/لديه رد فعل تحسسي جلدي.
 - إذا كنت تتناول/كان طفالك يتناول پروبينيسيد (يستخدم لعلاج النقرس)، فمن الجائز أن يقرر الطبيب ملاءمة الجرعة الدوائية من أو چمنتين.
 - إذا تم تناول أدوية تبطّن تحرّر الدم (مثل وارفارين أو أسينثوكومارول) مع أو چمنتين، فمن الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص دم إضافية.

- يمكن أن يؤثر أوچمنتين على طريقة عمل ميتوتريكسات (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).
- قد يؤثر أوچمنتين على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل والإرضاع

إذا كنت أنت/كانت طفلك مقبلة على تناول هذا الدواء في فترة الحمل أو الإرضاع، تعتقدين بأنه من الجائز أنك هي حامل أو تخططين/تخطط للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي الخاص بك للتقي بمستشاره قبل تناول هذا الدواء.

السيارة وإستعمال الماكنات

يمكن أن يسبب أوچمنتين أعراضًا جانبية حيث أن هذه الأعراض قد تجعلك غير قادر على السيارة. لا تُثُد السيارة أو تشغّل الماكنات إلا إذا كنت تشعر بشكل جيد.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي أوچمنتين على أسبيرتام، كحول بنزيلي ومالتوديكسترين.

- يحتوي هذا الدواء على 2.5 ملغ أسبيرتام (E951) في كل 1 ملل. إن الأسبيرتام هو مصدر لـ فينيل الألين. هذا الأمر قد يضر بالمتعلجين الذين يعانون من "بيلة الفينيل كيتون"، إضطراب جيني نادر يترافق فيه الفينيل الألين لأن الجسم غير قادر على التخلص منه كما ينبغي.
- يحتوي أوچمنتين على بقايا كحول بنزيلي. قد يسبب الكحول البنزيلي ردود فعل تحسسية.
- يحتوي أوچمنتين على مالتوديكسترين (جلوكوز). إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لدى طفلك/ لديك عدم تحمل لسكريات معينة، اتصل بالطبيب قبل إعطاء/تناول هذا الدواء.

3. كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الاستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بشأن الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الاعتيادية هي عادة:

الكبار والأطفال الذين يزنون 40 كلغ أو أكثر

- لا يوصى عادة بهذا الملعق للكبار وأطفال يزنون 40 كلغ وما فوق. توجه إلى الطبيب أو الصيدلي لتلقى بمستشاره.

الأطفال الذين يزنون أقل من 40 كلغ

يتم حساب كافة الجرعات الدوائية وفقاً لوزن الجسم بالكيلوغرامات.

- سوف يوصيتك طبيبك كم من أوچمنتين عليك إعطاء رضيعك أو طفلك.
- من الجائز أن يتم تزويدك بملعقة قياس بلاستيكية كبيرة أو كأس قياس بلاستيكية صغيرة أو محققة قياس. عليك إستعمالها لإعطاء الجرعة الدوائية الصحيحة لرضيعك أو طفلك.

متعالجون لديهم مشاكل في الكلى والكبد

- إذا وجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكلى فمن الجائز أن يتم خفض الجرعة الدوائية. فمن الجائز أن يختار الطبيب عيار آخر أو دواء آخر.

- إذا وجدت لديك أو لدى طفلك مشاكل في الكبد فمن الجائز أن يحتاج الأمر إجراء فحوص الدم بتواتر أكبر وذلك لفحص وظائف الكبد.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

تعليمات الفتح: لنزع الغطاء، يجب الضغط نحو الأسفل والتدوير نحو اليسار (عكس إتجاه عقارب الساعة) في نفس الوقت.

تعليمات الإغلاق: يجب إغلاق القنينة جيداً بواسطة الغطاء، بتدويره نحو اليمين (مع إتجاه عقارب الساعة) حتى الإغلاق التام.

كيفية إعطاء أوچمنتين

- دائمًا خض القنينة جيداً قبل كل جرعة دوائية
- أعطي/تناول مع وجبة الطعام
- يجب توزيع الجرعات الدوائية بشكل متساوٍ خلال اليوم، بفواصل زمني قدره 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول/إعطاء طفلك جرعاً واحداً.
- لا تعطي طفلك/لا تتناول أوچمنتين لمدة تزيد عن أسبوعين. إذا ما زال طفلك/ما زلت أنت تشعر/تشعر بسوء، فعليك/عليك التوجّه لمراجعة الطبيب ثانية.

إذا أعطيت/تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا أعطيت طفلك/تناولت بالخطأ أكثر مما ينبغي من أوچمنتين، فإن العلامات قد تشمل إنزعاج في البطن (غثيان، تقيؤ أو إسهال) أو إختلالات. توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن. خذ عبوة الدواء لتريها للطبيب.

إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت إعطاء/تناول أوچمنتين

- إذا نسيت إعطاء طفلك جرعة دوائية أو نسيت تناول جرعة دوائية، أعطها/تناولها لحظة تذكرك بذلك.
- لا تعطي طفلك/لا تتناول الجرعة الدوائية التالية أبكر مما ينبغي، بل انتظر 4 ساعات تقريباً قبل إعطاء/تناول الجرعة الدوائية التالية. لا يجوز إعطاء/لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن جرعة دوائية منسية.

يجب المواظبة على العلاج حسب توصية الطبيب.

إذا توقفت/توقف طفلك عن تناول أوچمنتين

وأصل إعطاء طفلك/تناول أوچمنتين إلى إنتهاء العلاج، حتى ولو شعر هو/شعرت أنت بشكل أفضل. كل جرعة دوائية من الجرعات الدوائية هي مهمة من أجل طفالك/من أجلك للمساعدة على محاربة التلوث. إذا بقيت بعض الجراثيم على قيد الحياة، فبإمكانها التسبب بعودة التلوث.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أوچمنتين قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تندهن من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز لا تعاني أنت/يعاني طفالك أيًّا منها. إن الأعراض الجانبية المذكورة لاحقاً من شأنها أن تحدث عند إستعمال هذا الدواء.

حالات يتوجب عليك الإنبه إليها:

ردود فعل تحسسية:

- طفح جلدي
- التهاب الأوعية الدموية (*vasculitis*) الذي من شأنه أن يبدو كبقع حمراء أو بنفسجية بارزة على الجلد، لكنه يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى من الجسم
- سخونة، ألم في المفاصل، إنتفاخ غدد في الرقبة، في الإبط أو في منفرج الرجلين
- إنتفاخ، أحياناً في الوجه أو الحنجرة (ونمة وعائية)، الذي يؤدي لصعوبات في التنفس
- إنهايار
- آلام في الصدر مرتبطة برد فعل تحسسي من شأنها أن تكون أعراضًا لإحتشاء عضلة القلب الذي يتم تنشيطه جراء الحساسية (متلازمة كونس - *Kounis syndrome* -).
- توجه فوراً إلى الطبيب إذا قاسيت/قاسي طفلك من إحدى تلك الأعراض. توقف عن تناول/إعطاء أو چمنتين.

التهاب الأمعاء الغليظة

يؤدي إلى التهاب الأمعاء الغليظة، إلى إسهال مائي الذي يتراافق عادة بدم ومخاط، وإلى ألم في البطن وأو سخونة.

متلازمة الالتهاب المعاوي القولوني (التهاب في الأمعاء الناجمة عن الأدوية (DIES

بلغ عن DIES خاصة لدى أطفال تلقوا أموكسيسيلين/حمض كلافولانيك. يعتبر ذلك نوع معين لرد فعل تحسسي والذي يتراافق بعرض رئيسي من التقيؤات المتكررة (4-1 ساعات بعد إعطاء الدواء). أعراض إضافية يمكن أن تشمل ألم في البطن، إرهاق (ميل للنوم)، إسهال وإنخفاض ضغط الدم.

التهاب حاد في البنكرياس (acute pancreatitis)

إذا وجدت لديك آلام شديدة ومستمرة في منطقة البطن فإن ذلك قد يكون علامة لالتهاب حاد في البنكرياس.

→ توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن للتلقى إشتارة وذلك إذا قاسيت/قاسي طفلك من تلك الأعراض.

أعراض جانبية وفق شيوعها:

أعراض جانبية شائعة جداً

من شأنها أن تظهر لدى أكثر من 1 من كل 10 أشخاص

• إسهال (لدى الكبار).

أعراض جانبية شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص

• فطر (المبيضات - تلوث فطري في المهبل، الفم أو ثنياً الجلد)

• غثيان خاصية عند تناول جرعة دوائية مرتفعة

→ إذا ظهر غثيان، تناول/أعطي أو چمنتين مع وجبة الطعام

• تقيؤ

• إسهال (لدى الأطفال).

أعراض جانبية غير شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 100 شخص

• طفح جلدي، حكة

• طفح بارز وحاذ (شرى)

• مشاكل هضمية

• دوار

• صداع.

أعراض جانبية غير شائعة التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

- ارتفاع في إنزيمات الكبد.

أعراض جانبية نادرة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص

- طفح جلدي، الذي من شأنه أن يشمل حويصلات (التي تبدو مثل بقع داكنة في المركز محاطة بمنطقة شاحبة، مع حلقة داكنة حول الحافات - حمامي متعددة الأشكال *(erythema multiforme)*)
← إذا لاحظت إحدى تلك الأعراض توجه بشكل عاجل إلى الطبيب.

أعراض جانبية نادرة من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

- عدد منخفض للخلايا التي تشارك في تخثر الدم
- عدد منخفض لخلايا الدم البيضاء.

أعراض جانبية بشيوع غير معروف (لا يمكن معرفة الشيوع من المعطيات المتوفرة)

- ردود فعل تحسسية (أنظر أعلاه)
- التهاب الأمعاء الغليظة (أنظر أعلاه)
- متلازمة الإلتهاب المعوي القولوني (التهاب في الأمعاء) الناجمة عن الأدوية (DIES) (أنظر أعلاه)
- التهاب حاد في البنكرياس (*acute pancreatitis*) (أنظر أعلاه)
- التهاب الغشاء المحيط بالدماغ والجبل الشوكي (التهاب السحايا الدماغية العقيم)
- ردود فعل جلدية خطيرة:
 - طفح منتشر مع حويصلات وتقرش للجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيثيس - جونسون)، وعرض أكثر خطورة، الذي يؤدي إلى تقرش واسع للجلد (أكثر من 30% من مساحة سطح الجسم - إخلال البشرة النخري السمي)
 - طفح جلدي أحمر منتشر يتراافق بحوصلات صغيرة تحتوي على قيح (*bullous exfoliative dermatitis*)
 - طفح أحمر حرشفي يتراافق ببنتوءات تحت الجلد وحوصلات (*exanthematous pustulosis*)
 - أعراض شبيهة بالإنفلوانزا تتراافق بطفح، سخونة، إنتفاخ الغدد ونتائج شاذة في فحوص الدم (بما في ذلك ارتفاع في كمية خلايا الدم البيضاء [*eosinophilia*] وإنزيمات الكبد) (رد فعل للدواء الذي يشمل كثرة الحمضيات وأعراض جهازية [*DRESS*])
 - طفح يتمثل بحوصلات تتموضع حول قشرة للجرح المندمل في المركز أو شبه عقد اللؤلؤ (مرض IgA الخطى).

← توجه فوراً إلى الطبيب إذا قاسيت/فاسى طفلك من إحدى تلك الأعراض.

- التهاب الكبد (*hepatitis*)
- يرقان، الذي ينجم عن ارتفاع في البيليروبين في الدم (مادة تُنتج في الكبد) الذي قد يؤدي إلى إصفرار الجلد وإصفرار بياض العين لدى طفلك/ لديك
 - التهاب أنابيب الكلية
 - إطالة زمن تخثر الدم
- فرط نشاط (*hyperactivity*)
- إختلالات (لدى أشخاص يتناولون جرعات دوائية مرتفعة من أو قمنتين أو لديهم مشاكل في الكلية)
- لسان أسود يبدو مليء بالشعر

- بقع على الأسنان (لدى الأطفال)، عادة يمكن إزالتها بالتفريش.
- أعراض جانبية التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم أو البول:

 - إنخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء
 - عدد منخفض لخلايا الدم الحمراء (قرن الدم الإنحلالي)
 - بلورات في البول التي تؤدي إلى تضرر الكلية بشكل خطير.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما يعاني طفلك/تعاني أنت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية

بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
<https://sideeffects.health.gov.il/>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال روئية الأطفال و/أو الرضع وذلك لفقدانهم إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد انقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

مسحوق جاف

خزن في الوعاء الأصلي للحماية من الرطوبة.
 يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

معلق سائل

- خزن في البراد (ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية).
 لا يجوز التجميد.
- بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.
- لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامات المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية ليست قيد الإستعمال. تساعد هذه الخطوات في الحفاظ على البيئة.

6. معلومات إضافية

• على ماذا يحتوي أو چمنتين:

يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على -

Hydroxypropyl methylcellulose (Hypromellose), silicon dioxide (anhydrous), colloidal anhydrous silica, xanthan gum, aspartame, succinic acid, golden syrup dry flavour*, raspberry dry flavour*, orange dry flavour 1* (includes benzyl alcohol), orange dry flavour 2.*
 (*also includes maltodextrin).


أنظر أيضاً معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء في الفقرة 2.

- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:**
عبوة قنينة يصعب على الأطفال فتحها.
أو چمنتين معلق 250 مل/5 مل عبارة عن مسحوق بلون أبيض - أوف - وايت متوفّر ضمن قنينة زجاجية شفافة. لحظة تحضيره، تحتوي القنينة على 100 مل خليط سائل لونه أبيض - أوف - وايت يسمى معلق.
- صاحب الإمتياز:** چلاكسوسميٹكلайн (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، پيتاح تكفا.
- المنتج:** چلاكسوسميٹكلайн تريدينج سيرفيسيس ليميتد، دبلن، إيرلندا.
- تم إعدادها في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:
026-28-25050
- من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.


تعليمات التحضير:

إنزع غطاء القنينة. تأكّد من أن ختم الورق المعدني كاملاً قبل الإستعمال. أعد غطاء القنينة.

1. حضن القنينة لتحرير المسحوق.



2. إنزع غطاء القنينة.



3. قشر ختم الورق المعدني للخلف من أجل إزالته.



4. أضف 90 مل ماء لتحضير 100 مل معلق. أعد غطاء القنينة، إقلب وحضن جيداً.

5. خزن في البراد وغض جيداً قبل كل إستعمال.
بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

تعليمات إستعمال محقنة القياس

محقنة مزودة ضمن العبوة من أجل إعطاء أوچمنتین


المحقنة مخصصة لإستعمال أوچمنتین فقط ولا يجوز إستعمالها من أجل إعطاء أية أدوية أخرى، لأن التدريجات خاصة بهذا المنتج. تزود المحقنة مع منسق الذي يتيح لها الانتصاق بالقنينة.

يشار للجرعة الدوائية على محقنة القياس الفموية بالمليليلترات (ml). عليك تناول/إعطاء طفلك الجرعة الدوائية الموصى بها من قبل الطبيب.


إفحص نظافة المحقنة والمنسق قبل الإستعمال، إغسل بواسطة مياه نظيفة إذا تطلب الأمر.

1. غض قنينة المعلق جيداً قبل كل جرعة دوائية.


2. إنزع المنسق عن المحقنة. أمسك القنينة بشدة وأدخل المنسق إلى عنق القنينة (يجب إبقاء المنسق في مكانه).




3. أدخل المحقنة داخل المنسق وتأكد من أنها مثبتة.




4. إقلب القنينة بينما تمسك المحقنة في مكانها وإسحب الجرعة الدوائية المطلوبة كما حدد من قبل الطبيب.




5. ضع القنينة بشكل عمودي وأخرج المحقنة.




6. من أجل تناول/إعطاء الجرعة الدوائية، ضع طرف المحقنة بحذر داخل الفم وادفع ببطء مكبس المحقنة نحو الأسفل (كرر المراحل 3، 4، 5 و- 6، إذا تطلب الأمر أكثر من محقنة واحدة لإعطاء الجرعة الدوائية).



7. إغسل المحقنة جيداً بماء نظيف. دع المحقنة تجف تماماً قبل الإستعمال التالي.



8. أعد غطاء الفتيبة.



9. خزن في البراد وخض جيداً قبل كل إستعمال.
بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

العلامات التجارية هي بملكية أو بإمتياز مجموعة شركات GSK.
© 2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.