

نشرة للمستهلك بموجب أنظمة الصيدلة (مستحضرات) - 1986

يسوق الدواء حسب وصفة طبيب فقط

أوچمنتین معلق 400 ملغ/5 ملل

مسحوق لتحضير معلق للشرب

يحتوي كل 5 مل معلق على:

400 ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريبيهيدرات)

amoxicillin (as trihydrate)

57 ملغ حمض كلافلانيك (على شكل ملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

يحتوي كل 1 مل معلق على:

80 ملغ أموكسيسيلين (على شكل تريبيهيدرات)

amoxicillin (as trihydrate)

11.4 ملغ حمض كلافلانيك (على شكل ملح البوتاسيوم)

clavulanic acid (as potassium salt)

لائحة المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر انظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء" والمقدمة 6 "معلومات إضافية".

إقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك/من أجل طفلك. لا تعطيه للأخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

(1) لأي غرض مخصص الدواء؟

يسعمل أوچمنتین لدى الكبار، الأطفال والرضع لعلاج التلوثات التالية:

- تلوثات في الأذن الوسطى والجيوب الأنفية
- تلوثات في الطرق التنفسية
- تلوثات في المسالك البولية
- تلوثات في الجلد وفي الأنسجة الرخوة، بما في ذلك التلوثات في الأسنان
- تلوثات في العظام والمفاصل
- التهاب اللوزتين المتكرر.

لا تتوفر معطيات سريرية بخصوص متعالجين دون عمر شهرين.

أوچمنتین عبارة عن مضاد حيوي الذي يعمل بواسطة إبادة الجراثيم المسببة للتلوثات. فهو يحتوي على دوائين مختلفين يسميان أموكسيسيلين وحمض كلافلانيك. ينتمي أموكسيسيلين لفصيلة الأدوية المسماة "پينيسيلينات" التي يمكن أن يتوقف عملها أحياناً (تصبح غير فعالة). إن المركب الفعال الآخر (حمض كلافلانيك) يمنع حدوث هذا الأمر.

الفصيلة العلاجية

أموكسيسيلين: مضاد حيوي من فصيلة الپينيسيلينات

حمض كلافلانيك: مثبطات الإنزيم بيتا-لاكتاماز.

(2) قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت أو كان طفلك حساساً (أليرجي) لـ أموكسيسيلين، لحمض كل فهو لانيك، لـ بيبنيلين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (مفصلة في الفقرة 6)
 - كان لديك أو لدى طفلك ذات مرة رد فعل تحسسي خطير لأي مضاد حيوي آخر. ذلك قد يشمل طفح في الجلد أو إنفاس الوجه أو الحنجرة
 - كانت لديك أو لدى طفلك ذات مرة مشاكل في الكبد أو برقان (إصفرار الجلد) عند تناول مضاد حيوي.
- ← لا تتناول أوجمنتين أو لا تعطي لطفلك أوجمنتين إذا ينطبق عليك أو على طفلك واحد مما ذكر. إذا لم تكن واثقاً، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول/إعطاء أوجمنتين.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل إعطاء أوجمنتين لطفلك أو تناول أوجمنتين إذا:

- وُجد لديك أو لدى طفلك مرض القلة
 - كنت أو كان طفلك تلقى/يتلقى علاجاً جراء مشاكل في الكبد أو في الكلية
 - كنت لا تتبول، أو كان طفالك لا يتبول بشكل سليم.
- إذا لم تكن واثقاً فيما إذا كان ينطبق عليك أو على طفلك واحد مما ذكر، تحدث مع الطبيب أو الصيدلي قبل تناول/إعطاء أوجمنتين.

في حالات معينة، من الجائز أن يفحص الطبيب نوع الجرثومة المسيبة للتلوث لديك. وفقاً للنتائج، من الجائز أن يعطي لك أو لطفلك أوجمنتين من عيار آخر أو دواء آخر.

حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها

قد يؤدي أوجمنتين إلى تفاقم حالات معينة موجودة، أو يسبب أعراضًا جانبية خطيرة. هذه تشمل ردود فعل تحسسية، إختلالات (تشنجات) والإلتهاب الأمعاء الغليظة. عليك الإنتباه لأعراض معينة خلال فترة تناولك أو تناول طفالك لـ أوجمنتين، لتفقيل خطرة حدوث أية مشاكل. انظر 'حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها' في الفقرة 4.

فحوص الدم والبول

أعلم الطبيب بأنك/أن طفالك تتناول/يتناول أوجمنتين، وذلك إذا كنت أو كان طفالك تجتاز/يجتاز فحوص الدم (مثل فحوص تقييم حالة خلايا الدم الحمراء أو فحوص لوظائف الكبد) أو فحوص البول (فحص نسب الچلوكوز). ذلك لأن أوجمنتين يمكن أن يؤثر على نتائج فحوص من هذا النوع.

التدخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول/كان طفالك يتناول، إذا تناولت/تناول مؤخراً أو إذا كان من الجائز أن تتناول/يتناول أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية، أدوية نباتية وإضافات غذائية، إحكام للطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

- إذا كنت تتناول/كان طفالك يتناول ألوبيورينول (يستعمل لعلاج النقرس) مع أوجمنتين، فهناك إحتمال أكبر بأن يحدث لديك/لدى طفالك رد فعل تحسسي جلدي.

- إذا كنت تتناول/كان طفالك يتناول بروبينيسيد (يستعمل لعلاج النقرس)، فمن الجائز أن يقرر الطبيب ملائمة الجرعة الدوائية من أوجمنتين.

- إذا تم تناول أدوية مثبتة لتخثر الدم (مثل وارفارين أو أسينوكومارول) مع أوجمنتين، فمن الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص دم إضافية.

- يمكن أن يؤثر أوجمنتين على طريقة عمل ميتوتريكسات (دواء يستعمل لعلاج السرطان أو الأمراض الروماتيزمية).

- قد يؤثر أوجمنتين على طريقة عمل ميكوفينولات موفيتيل (دواء يستعمل لمنع رفض الأعضاء المزروعة).

الحمل، الإرضاع

إذا كنتِ/كانت طفلك المقبلة على تناول هذا الدواء حاملاً أو مرضعة، تعتقدين أنه من الجائز أنكِ/أنها حامل أو تخططين/تخطط للحمل، توجهي إلى الطبيب أو الصيدلي لتأقي إستشارة قبل تناول هذا الدواء.

السياقة وإستعمال الماكنات

يمكن أن يسبب أوجمنتين أعراضًا جانبية حيث أن هذه الأعراض قد يجعلك غير مؤهل للسياقة. لا تقم بالسياقة أو تشغيل الماكنات إلا إذا كنت تشعر بشكل جيد.

معلومات هامة عن بعض مرکبات الدواء

يحتوي أوجمنتين على أسيپارتم، كحول بنزيلي ومالتوديكسترين

- يحتوي هذا الدواء على 2.5 ملغ أسيپارتم (E951) في كل 1 مل. أسيپارتم هو مصدر لفينيل ألانين. هذا الأمر قد يضر بالمعالجين الذين يعانون من "بيلة الفيل كيتون"، إضطراب جيني نادر حيث يتراكم فيه فينيل ألانين لأن الجسم غير قادر على طرحه كما ينبغي.
- يحتوي أوجمنتين على أثار كحول بنزيلي. قد يؤدي الكحول البنزيلي إلى حدوث ردود فعل تحسسية.
- يحتوي أوجمنتين على مالتوديكسترين (چلوكوز). إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لدى طفالك/ لديك عدم تحمل لسكريات معينة، اتصل بالطبيب قبل إعطاء/تناول هذا الدواء.

(3) كيفية إستعمال الدواء؟

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقًا بخصوص الجرعة الدوائية وطريقة العلاج بالمستحضر.

الجرعة الدوائية وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. الجرعة الدوائية الإعتيادية هي عادة:

الكبار والأطفال الذين يزنون 40 كلغ أو أكثر

- لا يوصى عادة بهذا المعلق لكبار وأطفال يزنون 40 كلغ وما فوق. توجه إلى الطبيب أو إلى الصيدلي لتأقي إستشارة.

الأطفال الذين يزنون أقل من 40 كلغ

يتم حساب كافة الجرعات الدوائية وفقاً لوزن الجسم بالكيلوغرامات.

- سوف يوصيك طبيبك كم من أوجمنتين عليك إعطاء رضيعك أو طفالك.
- من الجائز أن يتم تزويدك بملعقة كبيرة أو محقنة قياس بلاستيكية. بالإمكان إيجاد تعليمات إستعمال محقنة القياس في نهاية هذه النشرة. عليك إستعمالهما لإعطاء الجرعة الدوائية الصحيحة لرضيعك أو طفالك.
- لا تتوفر معطيات سريرية بخصوص متعالجين دون عمر شهرين.

متعالجون لديهم مشاكل في الكلى والكبد

- إذا وُجدت لديك أو لدى طفالك مشاكل في الكلى فمن الجائز أن يتم خفض الجرعة الدوائية. فمن الجائز أن يختار الطبيب عيار آخر أو دواء آخر.
- إذا وُجدت لديك أو لدى طفالك مشاكل في الكبد فمن الجائز أن يحتاج الأمر إجراء فحوص دم بتواتر أكبر وذلك لفحص وظائف الكبد.

لا يجوز تجاوز الجرعة الدوائية الموصى بها.

تعليمات الفتح: لنزع الغطاء، يجب الضغط نحو الأسفل والتدوير نحو اليسار (عكس إتجاه عقارب الساعة) في نفس الوقت.

تعليمات الإغلاق: يجب إغلاق القنينة جيداً بواسطة الغطاء، بتدويره نحو اليمين (مع إتجاه عقارب الساعة) حتى الإغلاق التام.

كيفية إعطاء/تناول أو چمنتين

- دائمًاً خض القنينة جيداً قبل كل جرعة دوائية.
- أعطى/تناول في بداية وجبة الطعام أو قبلها بقليل.
- يجب توزيع الجرعات الدوائية بشكل متساوي خلال اليوم، بفواصل زمني قدره 4 ساعات على الأقل. لا يجوز تناول/إعطاء طفلك جرعتي دواء خلال ساعة واحدة.
- لا تعطي طفلك/لا تتناول أو چمنتين لمدة تزيد عن أسبوعين. إذا ما زال طفلك يشعر/ما زلت تشعر بسوء، فعليه/عليك معاودة مراجعة الطبيب.

إذا أعطيت/تناولت بالخطأ جرعة دوائية أكبر

إذا أعطيت طفلك/تناولت بالخطأ أكثر مما ينبغي من أو چمنتين، فإن العلامات قد تشمل إنزعاج في البطن (غثيان، تقيؤ أو إسهال) أو إختلالات. توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن. خذ عبوة الدواء لتريها للطبيب.

إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر عبوة الدواء معك.

إذا نسيت إعطاء/تناول أو چمنتين

- إذا نسيت إعطاء طفلك جرعة دوائية أو نسيت تناول جرعة دوائية، أعطها/تناولها لحظة تذكرك بذلك.
 - لا تعطي طفلك/لا تتناول الجرعة الدوائية التالية أبكر مما ينبغي، بل انتظر 4 ساعات تقريباً قبل إعطاء/تناول الجرعة الدوائية التالية. لا تعطي/لا تتناول جرعة دوائية مضاعفة للتعويض عن الجرعة الدوائية المنسية.
- يجب المراقبة على العلاج حسب نصيحة الطبيب.

إذا توقفت/توقف طفلك عن تناول أو چمنتين

وأصل إعطاء طفلك/تناول أو چمنتين إلى إنتهاء العلاج، حتى ولو شعر هو/شعرت أنت بشكل أفضل. كل واحدة من الجرعات الدوائية هي مهمة من أجل طفلك/من أجلك للمساعدة على محاربة التلوث. إذا بقيت بعض الجراثيم على قيد الحياة، فبإمكانها التسبب بعودة التلوث.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من الجرعة الدوائية في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسلمة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

(4) الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال أو چمنتين قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تتدesh من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز إلا تعاني أنت/يعاني طفلك أيًّا منها. الأعراض الجانبية المذكورة لاحقاً من شأنها أن تحدث مع هذا الدواء.

حالات يتوجب عليك الإنتباه إليها

ردود فعل تحسسية:

- طفح جلدي
- التهاب الأوعية الدموية (*vasculitis*) الذي من شأنه أن يبدو كبقع حمراء أو بنفسجية بارزة على الجلد، لكنه يمكن أن يؤثر على مناطق أخرى من الجسم
- سخونة، ألم في المفاصل، إنتفاخ غدد في الرقبة، الإبط أو في منفوج الرجلين
- إنتفاخ، أحياناً في الوجه أو الحنجرة (ونمة وعائية)، الذي يؤدي لصعوبات في التنفس
- إنهايار

- آلام في الصدر مرتبطة برد فعل تحسسي من شأنها أن تكون أعراضًا لإحتشاء عضلة القلب الذي يتم تنشيطه جراء الحساسية (متلازمة كونس - *Kounis syndrome*).

← توجه فوراً إلى الطبيب إذا قاسيت/فاسى طفالك من إحدى تلك الأعراض. توقف عن إعطاء/تناول أوجمنتين.

التهاب الأمعاء الغليظة

يؤدي إلى التهاب الأمعاء الغليظة إلى إسهال مائي الذي يتراافق عادة بدم ومخاط، وإلى ألم في البطن و/أو سخونة.

- متلازمة الإلتهاب المعاوي القولوني (التهاب في الأمعاء الناجمة عن الأدوية) (**DIES**)
بلغ عن DIES خاصة لدى أطفال تلقوا أموكسيسيلين/حمض كلاؤلانيك. يعتبر ذلك نوع معين لرد فعل تحسسي والذي يتراافق بعرض رئيسي من التقيؤات المتكررة (4-12 ساعات بعد إعطاء الدواء). أعراض إضافية يمكن أن تشمل ألم في البطن، إرهاق (ميل للنوم)، إسهال وإنخفاض ضغط الدم.

التهاب حاد في البنكرياس (**acute pancreatitis**)

إذا وجدت لديك آلام شديدة ومستمرة في منطقة البطن فإن ذلك قد يكون علامة لالتهاب حاد في البنكرياس.

← توجه إلى الطبيب بأسرع ما يمكن لتلقي إستشارة وذلك إذا قاسيت/فاسى طفالك من تلك الأعراض.

أعراض جانبية وفق شيوعيها:

أعراض جانبية شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص

- فطر (المبيضات) - تلوث فطري في المهلل، الفم أو ثنياً الجلد
- غثيان، خاصة عند تناول جرعة دوائية مرتفعة
← إذا ظهر غثيان، تناول/أعطي أوجمنتين قبل الطعام
 - تقيؤ
 - إسهال (لدى الأطفال).

أعراض جانبية غير شائعة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 100 شخص

- طفح في الجلد، حكة
- طفح بارز وحاك (شرى)
- مشاكل هضمية
- دوار
- صداع.

أعراض جانبية غير شائعة التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

- ارتفاع في إنزيمات الكبد.

أعراض جانبية نادرة

من شأنها أن تظهر لدى حتى 1 من كل 1,000 شخص

- طفح في الجلد، الذي من شأنه أن يشمل حويصلات (التي تبدو مثل بقع داكنة في المركز محاطة بمنطقة شاحبة، مع حلقة داكنة حول الأطراف - حمامي متعددة الأشكال *erythema multiforme*)

← إذا لاحظت إحدى تلك الأعراض توجه إلى الطبيب عاجلاً.

أعراض جانبية نادرة التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم:

- عدد منخفض من الخلايا التي تشارك في تخثر الدم
 - عدد منخفض من خلايا الدم البيضاء.

أعراض جانبية شيوها غير معروفة (لا يمكن معرفة الشيوخ من المعطيات المتوفرة)

- ردود فعل تحسسية (أنظر أعلاه)
- التهاب الأمعاء الغليظة (أنظر أعلاه)
- متلازمة الإلتهاب المعاوي القولوني (التهاب في الأمعاء) الناجمة عن الأدوية (DIES) (أنظر أعلاه)
- التهاب حاد في البنكرياس (acute pancreatitis) (أنظر أعلاه)
- التهاب الغشاء المحيط بالدماغ والجبل الشوكي (التهاب السحايا العقیم)
- ردود فعل جلدية خطيرة:

- طفح منتشر مع حويصلات وتقرش للجلد، خاصة حول الفم، الأنف، العينين والأعضاء التناسلية (متلازمة ستيفنس

- جونسون)، وعرض أكثر خطورة، الذي يؤدي إلى تقرش واسع للجلد (أكثر من 30% من مساحة سطح الجسم

- إحلال البشرة الخري (السمي)

- طفح أحمر منتشر في الجلد يترافق بحويصلات صغيرة تحتوي على قيح (*bullous exfoliative dermatitis*)

- طفح أحمر حرشفي يترافق بنتوءات تحت الجلد وحويصلات (*exanthematous pustulosis*)

- أعراض تشبه الإنفلونزا مع طفح، سخونة، إنفاس في الغدد ونتائج شاذة في فحوص الدم (يشمل ارتفاع في

كمية خلايا الدم البيضاء [eosinophilia] وإنزيمات الكبد) (رد فعل للدواء الذي يشمل كثرة الحمضات

وأعراض جهازية [*DRESS*])

- طفح يتمثل بحويصلات تتموضع حول قشرة للجرح المندمل في المركز أو شبه عقد اللؤلؤ (مرض IgA

الخطي).

→ توجه فوراً إلى الطبيب إذا قاسيت/فاسى طفلك من إحدى تلك الأعراض.

• التهاب الكبد (*hepatitis*)

• يرقان، الذي ينجم عن ارتفاع في البيليروبين في الدم (مادة تُنتج في الكبد) الذي قد يؤدي إلى إصفرار الجلد وإصفرار

بياض عينك/عين طفلك

• التهاب أنابيب الكلية

• إطالة زمن تخثر الدم

• فرط نشاط (*hyperactivity*)

• اختلالات (لدى الأشخاص الذين يتناولون جرعات دوائية مرتفعة من أوجمنتين أو لديهم مشاكل في الكلية)

• لسان أسود يبدو مليء بالشعر

• بقع على الأسنان (لدى الأطفال)، عادة يمكن إزالتها بالتفريش.

أعراض جانبية التي من شأنها أن تظهر في فحوص الدم أو البول:

• انخفاض شديد في عدد خلايا الدم البيضاء

• عدد منخفض من خلايا الدم الحمراء (فقر الدم الإنحلالي)

• بلورات في البول التي تؤدي إلى تضرر شديد في الكلى.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية أو عندما يعاني طفلك/تعاني أنت من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبيلغ عن أعراض جانبية

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبيلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il/>

٥) كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التسمم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العبوة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

مسحوق جاف

خرّن في الوعاء الأصلي للحماية من الرطوبة.
يجب التخزين دون 25 درجة مئوية.

معلق سائل

خرّن في البراد (ما بين 2 إلى 8 درجات مئوية). لا يجوز التجميد.
بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

- لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامات المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. تساعد هذه الخطوات في الحفاظ على البيئة.

٦) معلومات إضافية

- على ماذا يحتوي أوچمنتين:
يحتوي الدواء بالإضافة للمركبات الفعالة أيضاً على:

Silicon dioxide (anhydrous), hydroxypropylmethylcellulose dried (hypromellose), colloidal anhydrous silica, golden syrup dry flavour*, raspberry dry flavour*, orange dry flavour 1* (includes benzyl alcohol), xanthan gum, aspartame (E951), orange dry flavour 2*, succinic acid. (*also includes maltodextrin)

أنظر أيضاً معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء في الفقرة 2.


- كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العبوة:
عبوة قنية يصعب على الأطفال فتحها.
أوچمنتين معلق 400 مل/5 مل (بطعم الفواكه) مسحوق لتحضير معلق فموي، هو مسحوق أبيض - أوف- وايت متوفّر ضمن قنية زجاجية شفافة. بعد التحضير تحتوي القنية على 35 مل، 70 مل، أو 140 مل خليط سائل لونه أبيض - أوف- وايت يسمى معلق.
من الجائز لا تسوق كافة أحجام العلب.

- صاحب الإمتياز: چلاكسوسميثكلайн (إسرائيل) م.ض.، شارع بازل 25، بيتح تكفا.
- المنتج: چلاكسوسميثكلайн تريدينج سيرفيسيس ليميتد، دبلن، إيرلندا.
- تم إعدادها في آب 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.
- رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 112-29288-75-112.
- من أجل سهولة وتهجين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.


تعليمات التحضير:

إنزع غطاء القنية. تأكد من أن ختم الورق المعدني كاملاً قبل الإستعمال. أعد غطاء القنية.

1. خض القنينة لتحرير المسحوق.



2. إنزع غطاء القنينة.



3. قشر ختم الورق المعدني للخلف من أجل إزالته.



4. أضف حجم ماء (كما هو مذكور أدناه). أعد غطاء القنينة، إقلب وخض جيداً.

لتحضير معلق ضمن عبوة ذات 35 مل يجب إضافة 31 مل ماء.

لتحضير معلق ضمن عبوة ذات 70 مل يجب إضافة 62 مل ماء.

لتحضير معلق ضمن عبوة 140 مل يجب إضافة 124 مل ماء.

5. خزن في البراد وخض جيداً قبل كل إستعمال.

بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

تعليمات إستعمال محقنة القياس

يتم التزويد بمحقنة من أجل إعطاء أو جمانتين


المحقنة مخصصة للإستعمال مع أو جمانتين فقط ولا يجوز إستعمالها من أجل إعطاء أية أدوية أخرى، لأن التدريجات خاصة بهذا المنتج. تزود المحقنة مع منسق الذي يتبع لها الإنصاق بالقنينة.

يشار للجرعة الدوائية على محقنة القياس الفموية بالمليilitرات (ml). عليك تناول/إعطاء طفالك الجرعة الدوائية الموصى بها من قبل الطبيب.

تأكد من نظافة المحقنة والمنسق قبل الإستعمال، إغسل بواسطه مياه نظيفة إذا تطلب الأمر.

1) خص قنينة المعلق جيداً قبل كل جرعة دوائية.


2) إززع المنسق عن المحقنة. أمسك القنينة بشدة وأدخل المنسق في عنق القنينة (من أجل إبقاءه في مكانه).




3) أدخل المحقنة داخل المنسق تأكد من أنها مُؤمَّنة.




4) إقلب القنينة بينما تمسك المحقنة في مكانها وإسحب الجرعة الدوائية المطلوبة كما حدد من قبل الطبيب.




5) ضع القنينة بشكل مستقيم وقم بإخراج المحقنة.




6) من أجل تناول/إعطاء الجرعة الدوائية، ضع طرف المحقنة بحذ راً داخل الفم وإدفع ببطء مكبس المحقنة نحو الأسفل (كرر المراحل 3، 4، 5 و- 6، إذا تطلب أكثر من محقنة واحدة لإعطاء الجرعة الدوائية).



7) إغسل المحقنة جيداً بماء نظيف. دع المحقنة تجف تماماً قبل الإستعمال التالي.



8) أعد غطاء الفنينة.



9) خرّن في البراد وغض جيداً قبل كل إستعمال.
بعد التحضير، يجب إستعمال المعلق خلال 7 أيام.

العلامات التجارية هي بملكية أو بامتياز مجموعة شركات GSK.
© 2023 مجموعة شركات GSK أو صاحب الإمتياز الخاص بها.

Aug Sus 400 PT v10A