

إلثروكسين أقراص 50 مكغ

إلثروكسين أقراص 50 مكغ

يحتوي كل قرص على المادة الفعالة ليفوثيروكسين صوديوم (Levothyroxine sodium) 50 مكغ (ميكروغرام).

إلثروكسين أقراص 100 مكغ

يحتوي كل قرص على المادة الفعالة ليفوثيروكسين صوديوم (Levothyroxine sodium) 100 مكغ (ميكروغرام).

المواد غير الفعالة ومولدات الحساسية في المستحضر: أنظر الفقرة 2 " معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء " والفقرة 6 "معلومات إضافية" من هذه النشرة.

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل استعمالك للدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء من أجلك. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدك أن حالتهم الطبية مشابهة لحالتك.

1) لأي غرض مخصص الدواء؟

الدواء مخصص لمعالجة قصور الغدة الدرقية (thyroid): علاج نقص هورمونات الغدة الدرقية الذي يسبب الغفامة لدى الرضع وللمعالجة الوذمة المخاطية (myxoedema) لدى الأطفال.

الفصيلة العلاجية: من هورمونات الغدة الدرقية.

2) قبل استعمال الدواء

لضمان مواصلة العلاج بالمستحضرات الحاوية على ليفوثيروكسين صوديوم، فإن إستبدال مستحضر معين الحاوي على ليفوثيروكسين صوديوم بمستحضر آخر يتم فقط بإستشارة طبية شخصية ومراقبة عن كُتب المتعالج.

لا يجوز استعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (البرجي) للمادة الفعالة ليفوثيروكسين صوديوم أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 من هذه النشرة).
- كنت تعاني من فرط نشاط الغدة الدرقية الذي يُنتج كميات زائدة من التيروكسين (انسام درقي thyrotoxicosis)، غير المُعالج.
- وُجد لديك مرض يؤثر على الغدة الكظرية (فحص الأدر مع طبيبك إذا لم تكن واثقاً) وغير المُعالج.
- كنت تعاني من قلة نشاط الغدد الكظرية (قصور الغدة الكظرية) ولا تتلقى علاجاً بدلاً ملاماً.
- وُجد لديك ضغط دم مرتفع ولا تتلقى علاجاً لذلك.
- وُجد لديك مرض يؤثر على الغدة النخامية وغير المُعالج.
- وُجدت لديك مشكلة في القلب (مثلاً إنحشاء عضلة القلب و التهاب حاد بعضلة القلب).
- أثناء الحمل، لا يجوز تناول إلثروكسين في نفس الوقت مع أدوية لفرط نشاط الغدة الدرقية (أدوية تثبط نشاط الغدة الدرقية).

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء:

- تحدث مع طبيبك أو الصيدلي قبل تناول إلثروكسين.
- إن زيادة عدد الأقراص المتناولة بشكل سريع قد يسبب أعراضاً جانبية (تذكر في الفقرة 4). احبك لطبيبك إذا كنت تعاني من أعراض جانبية.
- لا يجوز إستعمال إلثروكسين لمعالجة البهانة أو لإنقاص الوزن. إن هورمونات الغدة الدرقية ليست ملائمة لإنقاص الوزن. لا يؤدي تناول هورمونات الغدة الدرقية إلى إنخفاض الوزن إذا كانت نسب هورمون الغدة الدرقية لديك ضمن المجال الطبيعي. يمكن أن تحدث أعراض جانبية شديدة أو حتى تشكل خطراً على الحياة إذا قمت بزيادة المقدار الدوائي دون إستشارة الطبيب. خاصة إذا كنت تتناول أدوية أخرى لإنقاص الوزن في نفس الوقت. احك لطبيبك إذا كنت تتناول دواء لإنقاص الوزن، مثل أورليستات.

إذا كنت بحاجة إلى إجراء فحوص مخبرية لمراقبة نسب هورمون الغدة الدرقية، احك للطبيب و/أو لطاقم المختبر بأنك تتناول أو تناولت مؤخراً ليفوثيروكسين (يسمى أيضاً فيثامين H، فيثامين B7 أو فيثامين B8). قد يؤثر بيوتين على فحوصات المخبرية. كأمز مقلق بالفحص، يمكن أن تكون النتائج مرتفعة بشكل خاطئ أو منخفضة بشكل خاطئ بسبب البيوتين. قد يطلب منك طبيبك التوقف عن تناول بيوتين قبل إجراء الفحوص المخبرية. يجب أن تأخذ في الإعتبار أن المنتجات الأخرى التي تتناولها، مثل متعددة الفيتامينات أو المكملات الغذائية للشعر، للجلد، للظافر قد تحتوي أيضاً على بيوتين وبالتالي تؤثر على نتائج الفحوص المخبرية. احك للطبيب و/أو لطاقم المختبر إذا كنت تتناول هذه الأدوية (يرجى الإتيان إلى الصيدلي في الفقرة "التفاعلات والتفاعلات بين الأدوية").

قد تحدث إضطرابات الغدة الدرقية إذا كنت بحاجة إلى إستبدال دواءك بآخر يحتوي على ليفوثيروكسين. اتصل بطبيبك أو أخصائي طبي آخر إذا توفرت لديك أسئلة حول تبديل الدواء. هناك حاجة بمراقبة عن كُتب (سريية وبيولوجية) خلال الفترة الإنتقالية. احك لطبيبك إذا ظهرت أية أعراض جانبية، فقد تكون هذه علامة على أنه يجب رفع أو خفض المقدار الدوائي الخاص بك.

قبل العلاج بـ إلثروكسين احك لطبيبك إذا:

- تجاوزت عمر 50 سنة.
- وُجد لديك مرض في القلب.
- وُجد لديك سكري.
- كنت في فترة سن اليأس (menopause) وكنت معرضة لظهور زائدة لمرض هشاشة العظام.
- وُجدت لديك الأعراض التالية: إرقاق، حساسية للبرد، جفاف وسهيم، كساحظ الشعر، نظم قلب بطيء (أعراض لقصور الغدة الدرقية).
- وُجد لديك خلل في إستقلاب المواد كجزء من مرض هورموني آخر.

- وُجدت لديك وذمة مخاطية (myxoedema) - لون جلد مائل للبييض ووذمة رخوة في الجلد والأشعة تحت الجلد.
- وُجدت لديك متلازمة خلل الإمتصاص (malabsorption syndrome).
- كنت تعاني من قلة نشاط الغدة الكظرية (قصور الغدة الكظرية).
- كنت حاملأ.
- سوف يقوم طبيبك بفحص فيما إذا كنت تعاني من خلل في نشاط الغدة الكظرية، الغدة النخامية أو الغدة الدرقية مع إنتاج زائد وغير مرافق لهورمونات الغدة الدرقية (ذاتية الغدة الدرقية)، لأنه يجب معالجة تلك الحالات بواسطة الأدوية قبل أن تبدأ بتناول إلثروكسين أو قبل إجراء فحص تثبيط نشاط الغدة الدرقية.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية:

إذا كنت تتناول، أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، احك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك.

قد يُغير إلثروكسين من تأثير أدوية أخرى وأدوية أخرى يمكن أن تُغير من تأثير إلثروكسين. إذا كنت تتناول أو تناولت بيوتين مؤخراً، احك لطبيبك و/أو لطاقم المختبر عندما تكون مقدماً على إجراء فحوص مخبرية لمراقبة نسبة هورمون الغدة الدرقية. قد يؤثر بيوتين على نتائج الفحص (أنظر "تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء").

هذه الأدوية يمكن أن تؤثر على إمتصاص إلثروكسين:

- أدوية لمعالجة إرتفاع الكوليسترول (كوليستيرامين، كوليستيول).
- أدوية مضادة للقرحة المعدية (مضادات الحموضة، سوكرالفات).
- أدوية تحتوي على الحديد وإضافات الحديد.
- إضافات الكالسيوم، المغنيزيوم، والألومنيوم.
- أدوية مستعملة لمعالجة إرتفاع نسب البوتاسيوم في الدم (كالسيوم، سيقلام، لانتانوم، وأدوية من فصيلة سلفونات البوليستيرين - polystyrene sulfonates).
- أدوية من فصيلة مضطبات مضخة البروتونات (المستعملة لخفض كمية حموضة المعدة)، مضطبات مضخة البروتونات (مثل أوميبرازول، إيزوميبرازول، بانتوبرازول، رابيبرازول، ولانوسوبرازول) والتي تُستعمل لخفض كمية الحمض التي تنتجها المعدة، مما قد يقلل من إمتصاص الليفوثيروكسين من الأمعاء وبالتالي يجعله أقل نفاعاً. إذا كنت تتناول ليفوثيروكسين أثناء علاجك بمضطبات مضخة البروتونات، فيجب على طبيبك مراقبة وظيفة الغدة الدرقية لديك، وقد يلزم الأمر ملاءمة المقدار الدوائي من إلثروكسين.
- أدوية لإنقاص الوزن، مثل أورليستات.

إرتك فاصل ما أمكن بين المقادير الدوائية من إلثروكسين وبين الأدوية التي ذكرت سابقاً، وذلك لمنع حدوث تفاعلات دوائية بين الأدوية في المعدة أو في الأمعاء الدقيقة.

هذه الأدوية يمكن أن تؤثر على تأثير إلثروكسين:

- أدوية لمعالجة الصداع (كاربامازيبين، فينيتوين، باربيتورات)
- أدوية تحتوي على سانت جونس وورت (St. John's wort) (دواء على أساس نباتي)
- أدوية لمعالجة التواتات (ريفاميبسين)
- أدوية لمعالجة قصور ضغط الدم (حاجبات بيتا)
- أدوية لمعالجة قصور القلب (أميوارون)
- أدوية تحتوي على الليثيوم و اليود
- مواد ظليلة تحتوي على اليود التي تستعمل لفحوص رنتنج
- أدوية مستعملة لمعالجة زيادة إمتصاص المواد (بروبيل ييو أوراسيل)
- هورمونات الكظر المستعملة لمعالجة الإتهاب أو ردود الفعل التحسسية (كورتيترول، ديكساميثازون)
- أدوية لعلاج السرطان (تاموكسيفين، 5 - فلورو أوراسيل، إيماتينيب، سونيتينيب)
- أدوية لمعالجة الإكتئاب (سيرترالين)
- إضافات هورمونية أو إذا كنت تتناولين أقراص لمنع الحمل (إستروجين)
- ميتادون
- أدوية لعلاج الملاريا (بروجوانيل، كلوروكوين)
- أدوية لمعالجة إرتفاع نسب الكوليسترول (كوفيربات، سيفمقساتين، لوفاستاتين)
- أدوية لمعالجة إحتباس السوائل وفرط ضغط الدم (فوروسيميد)
- ريتونايفير، إندينايفير، لوبينايفير - التي تستعمل لمعالجة HIV والبرقان المزمن من نوع C
- العديد من الأدوية يمكنها أن تؤثر على نتائج الفحوص المخبرية أو على وظائف الغدة الدرقية.

تأثير الأدوية التالية قد يتأثر من إلثروكسين:

- أدوية لعلاج السكري (مثل الإنسولين). قد تقلل إلثروكسين من تأثير الدواء المضاد للسكري الذي تتناوله، لذلك من الجائز أن تحتاج لفحوص إضافية لنسب السكر في الدم، خاصة في بداية العلاج بـ إلثروكسين. خلال فترة العلاج بـ إلثروكسين، فمن الجائز أن يحتاج الأمر لملاءمة المقدار الدوائي للدواء المضاد للسكري الذي تتناوله.
- أدوية لمنع الخثرات الدموية (مضادات الخثرات) التي تستعمل لتسيب الدم ولمعالجة الخثرات الدموية: قد يُزيد إلثروكسين من تأثير تلك الأدوية ونتيجة لذلك قد يزيد من خطورة حدوث نزف. لذلك من الجائز أن يتطلب الأمر إجراء فحوص منتظمة لقيم خثرتك في بداية العلاج بـ إلثروكسين وخلالها. خلال العلاج بـ إلثروكسين، من الجائز أن يحتاج الأمر لملاءمة المقدار الدوائي للأدوية من فصيلة كومارين التي تتناولها.
- فينيتوين (لمعالجة الصداع)
- جليكوزيدات القلب (لمعالجة قصور القلب)
- أدوية لمعالجة الإكتئاب (مضادات الإكتئاب ثلاثية الحلقة)
- أدوية مقلدة للجهاز الودي (أدوية منبهة للجهاز العصبي الودي)

إذا كنت تتناول الأدوية التالية فليكن مراجعة طبيبك، لأنها يمكن أن تؤثر على فحوص الدم أو على فحوص طبية معينة وقد تؤدي لنتائج خاطئة:

- إضافات هورمونية أو أدوية تحتوي على تستوستيرون (أندروجينات، ستيرويدات بنائية)
- مسكنات الألم (حمض أسيتيل ساليسيليك)

إستعمال الدواء والطعام:

منتجات الصويا والمحبة الغنية بالكاليف قد تقلل من إمتصاص إلثروكسين. إن ملاءمة المقدار الدوائي من إلثروكسين يمكن أن يكون ذا صلة خاصة في بداية وعند التوقف عن الحمية الغذائية.

الحمل والإرضاع:

إذا كنت حاملاً أو مرضعة، فتعقدن بأنك حامل أو تخططين للحمل، يجب استشارة طبيبك قبل تناول الدواء. يجب مراقبة وظائف الغدة الدرقية خلال فترة الحمل بأوقات متكررة، وذلك لأن النسب المنخفضة جداً أو المرتفعة جداً لهورمونات الغدة الدرقية قد تلحق الضرر بتطور ورفاهية الجنين. سوف يحدد طبيبك فيما إذا كان يتطلب الأمر ملاءمة المقادير الدوائية من التروكسين. لا يجوز تناول الدواء خلال فترة الحمل إلا كنت تتناولين أيضاً دواء ينشط نشاط الغدة الدرقية وذلك لمعالجة فرط نشاط الغدة الدرقية. تُطرح نسب منخفضة من المادة الفعالة في حليب الأم. يجب إعلام طبيبك إذا كنت مرضعة أو كنت تخططين للإرضاع.

لدى الخنثج الذين ولدوا بوزن منخفض جداً، يتم فحص ضغط الدم بشكل روتيني بعد بدء العلاج ليقيوتروكسين، وذلك لأنه قد يحدث إنخفاض سريع في ضغط الدم (يسمى انهيار الدورة الدموية (Circulatory collapse)).

السياقة واستعمال الماكينات:

لا يوجد لـ التروكسين تأثير على القدرة على استعمال الماكينات أو السياقة.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء:

يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم بكل قرص، أي، عملياً هو 'خالٍ من الصوديوم'.

3 كيفية استعمال الدواء؟

يجب استعمال الدواء دائماً بحسب تعليمات الطبيب.

عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالدواء.

المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قِبل الطبيب فقط كأمر متعلق بنتائج فحوص دمك.

لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

طريقة تناول:

يتوجب عليك بلع الأقراص مع كأس من الماء، يُفضل قبل وجبة الفطور. عليك تناول الأقراص على معدة خاوية. لا يجوز شطراً أو سحق الأقراص! لا تتوفر معلومات حول المضغ.

الفحوص والمتابعة الطبية:

يجب إجراء فحوص دورية لهورمونات الغدة الدرقية خلال فترة العلاج بالدواء.

لدى الكبار: من الجائز أن يحتاج الأمر ملاءمة المقدار الدوائي بعد عدة أسابيع وذلك بحسب إستجابتك للعلاج ومراقبة فحوص الدم.

لدى الأطفال دون عمر 12 سنة: يتطلب الأمر مراقبة طبية لضمان تلقي الطفل المقدار الدوائي الصحيح من أجله.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر:

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل أو أي شخص آخر بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

قد تشعر بضربات القلب (عدم إنتظام نظم القلب)، قلق، عصبية، سخط، إرتباك، تعرق، إضطرابات بنظم القلب (عدم إنتظام نظم القلب) أو تسرع نظم القلب)، قلة دواء، حركات لا إرادية، توسع الحدقتين، تنفس سريع جداً، سخونة، إختلاجات وصداخ.

تحدث حالة من أزمة لإنسمام درقي (thyrotoxic crisis) في أوقات نادرة بعد تناول مقدار دوائي مفرط بشكل مزمن وتؤدي لعدم إنتظام نظم القلب، قصور القلب وسبات.

إذا نسيت تناول الدواء:

إذا نسيت تناول المقدار الدوائي، تناول المقدار الدوائي لحظة تذكرك. إذا حان موعد تناول المقدار الدوائي القادم حينها فوات المقدار الدوائي المنسي، لا يجوز تناول مقدار دوائي مضاعف.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصية الطبيب.

إذا توقفت عن تناول الدواء:

لا يجوز التوقف عن تناول الدواء بشكل مفاجئ. فهذا قد يؤدي لعودة الأعراض الأساسية التي كانت لديك. يجب دائماً استشارة طبيبك عندما تفكر بالتوقف عن تناول الدواء. من الجائز أن يحتاج الأمر لملاءمة المقدار الدوائي.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضِع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

4 الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن استعمال التروكسين أقراص قد يسبب أعراضاً جانبية لدى بعض المستعملين. لا نندش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز أن تعاني أياً منها.

يجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا ظهر أي عرض جانبي من بين الأعراض الجانبية التالية:

علامات رد فعل تحسسي مثل:

• ضيق تنفس. ردود فعل جلدية مثل: طفح وحكة.

• إجمار، هبات الحر.

• إذا كنت تقاسي من أعراض جانبية خطيرة، فعليك التوجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ.

أعراض جانبية خطيرة:

أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى 1-10 مستعملين من بين 10,000):

• ورم دماغي وهمي (pseudotumor cerebri) (إرتفاع الضغط داخل الجمجمة مع وذمة في العينين)، خاصة لدى الأطفال.

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):

• ألم في الصدر (ذبحة صدرية). توجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ.

• ضربات قلب (إنزجاج ينجم عن ضربات قلب سريعة أو قوية).

• إضطرابات بنظم القلب (عدم إنتظام نظم القلب). يمكن أن تكون خطيرة. إستشر طبيبك.

• قصور القلب.

• إحشاش عضلة القلب.

• أعراض لفرط المقدار الدوائي نتج عن زيادة إنتاج هورمون الغدة الدرقية (في حال رفع المقدار الدوائي الإبتدائي بشكل سريع جداً). توجه إلى طبيبك.

• فرط المقدار الدوائي لدى الأطفال قد يسبب craniosynostosis (الإغلاق المبكر لمفاصل عظام الجمجمة قبل تطور الدماغ بأكملها) وإغلاق المشاش المبكر، الذي قد يؤثر على الطول عند البلوغ.

قد تحدث أعراض جانبية أخرى:

أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (أعراض لم يُحدد شيوعها بعد):

• نظم قلب سريع. قد يكون خطيراً. إذا وُجد لديك نظم قلب سريع وغير منتظم أو إذا كنت تشعر بسوء أو إعياء، فعليك التوجه إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ.

• إختلاجات (تقلصات عضلية، تشنجات).

• ألم مفاجئ في الظهر والميل لحدوث كسور في العظام جراء هشاشة العظام (إنخفاض كثافة العظم). توجه إلى طبيبك.

• إرتفاع ضغط الدم. توجه إلى طبيبك. يتوجب معالجة ضغط الدم المرتفع. إن ضغط الدم المرتفع جداً هو خطير.

• ضعف العضلات، تقلصات عضلية. قد أو يمكن أن تكون خطيرة. توجه إلى طبيبك.

• سخط.

• قلة هدوء، إرتجاج، صداع، قلة راحة، أرق (مشاكل في النوم).

• قلق، تغيرات في المزاج، عصبية.

• تعرق، سخاقت الشعر.

• زيادة الشهية للطعام، آلام في البطن، غثيان، إسهال، تقيؤ.

• عدم إنتظام الدورة الشهرية، قلة الخصوبة.

• إرهاق (إنهاك)، عدم تحمل الحر، سخونة.

• إنخفاض شديد في الوزن.

• إنتفاخ في الوجه، في الشفتين، في الفم، في اللسان أو في الحنجرة (إنتفاخ تحت الجلد - angioedema)، طفح، شرى.

تزول الأعراض الجانبية في أوقات متقاربة عند خفض المقدار الدوائي.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمتم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

التبليغ عن أعراض جانبية:

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

بالإضافة لذلك، بالإمكان تبليغ شركة باداچيس بواسطة العنوان التالي: Padagis.co.il

5 كيفية تخزين الدواء؟

• تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

• لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ صلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشتر تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

• يجب التخزين ما بين 25 درجة مئوية. يجب التخزين في العلبة الأصلية لحمايته من الضوء.

• بعد الفتح لأول مرة بالإمكان الإستعمال لفترة 114 يوماً، لكن بما لا يتجاوز تاريخ إنقضاء الصلاحية. إحتفظ القنينة محكمة الإغلاق.

• لا يجوز إلقاء أدوية في المجاري أو في القمامة المنزلية. إستشر الصيدلي حول كيفية التخلص من الدواء. يساعد هذا الأمر في الحفاظ على البيئة.

6 معلومات إضافية

• يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضاً على المواد غير الفعالة التالية:

Microcrystalline cellulose, Pre-gelatinised starch (Maize starch 1500), Talc, Microcrystalline cellulose (in triturate), Silica colloidal anhydrous, Magnesium stearate.

• كفيث يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:

التروكسين 50 مكغ أقراص: أقراص مستديرة ذات لون أبيض إلى أوف - وايت (Off-white). محمية الجانبين عليها الطابعة "GS 11E" من جانب واحد و- "50" من الجانب الثاني، ضمن قنينة من البلاستيك ذات غطاء وسادة أمان، تحتوي على 100 قرص.

التروكسين 100 مكغ أقراص: أقراص مستديرة ذات لون أبيض إلى أوف - وايت (Off-white). محمية الجانبين عليها الطابعة "GS 21C" من جانب واحد و- "100" من الجانب الثاني، ضمن قنينة من البلاستيك ذات غطاء وسادة أمان، تحتوي على 100 قرص.

• صاحب الإمتياز وعنوانه: وكالات باداچيس إسرائيل م.ض.، شارع رانكت 1، شوهام.

• إسم المنتج وعنوانه: أسين باد أولدسلو GmbH، باد أولدسلو، ألمانيا.

• تم إعدادهما في حزيران 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

• رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

التروكسين أقراص 50 مكغ: 055-82-20571

التروكسين أقراص 100 مكغ: 027-92-22062

• من أجل سهولة وتبوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكور. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.