

פפטל סקרב®

תמיסה לחיטוי

לשימוש חיצוני

הרכב

כלורהקסידין גלוקונאט 4% w/v
(Chlorhexidine Gluconate 4% w/v)

למידע על המרכיבים בלתי פעילים ראה סעיף 6 - "מידע נוסף".

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. אם יש לך שאלות נוספות, פנה אל הרופא או אל הרוקם. עליך להשתמש בתכשיר על-פי ההוראות בסעיף הוראות השימוש בעלון זה. היועץ ברומא הוא הנך זקוק נוסף.

1. למה מיועדת התרופה?

- שטיפת ידיים אנטיספטית
 - חיטוי ידיים לפני ניתוח
 - חיטוי העור המטופלים שעומדים לעבור ניתוח
- קבוצה תרופית:** חומרים מחטאים.

2. לפני השימוש בתרופה

אין להשתמש בתכשיר:

- אם אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה. במיוחד במטופלים עם היסטוריה של תגובות אלרגיות אפשריות הקשורות לכלורהקסידין.
- יש להימנע ממגע עם העיניים, האוזן התיכונה, המוח וקרומ המוח (הרקמה המכסה את המוח וחוט השדרה).

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

- אין להשתמש בחללי הגוף (לדוגמה אף או אזניים).
- יש להשתמש בהירות ביולודים, במיוחד אלו שנולדו לפני הזמן. ספטל סקרב עלול לגרום לכוויות כימיות בעור.
- הסר כל בד סופג, אריג או בגד לפני שתמשיך לניתוח. אין להשתמש בכמויות מוגזמות ואין לאפשר לתמיסה להצטבר בקפלי העור או מתחת למטפול או לטפסל על הסדינים או דבר אחר שנמצא במגע ישיר עם המטפול. כאשר ישנו צורך לשים תחבושות על אזורים בעור שנחשפו לספטל סקרב, יש לנקות וזירות ולוודא שלא נשארו עודפי תמיסה בטרם חבישת האזור.

תגובות בין-תרופתיות

אם אתה לוקח, או אם לקחת לאחרונה, תרופות אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקם.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

עליך לבדוק עם הרופא או הרוקם אם אינך בטוח בנוגע למינון ואופן הטיפול בתכשיר.

שים לב

אין לבלוע! תרופה זו מיועדת לשימוש חיצוני בלבד.

הוראות השימוש:

אין למהלך את התמיסה.

לשטיפת ידיים אנטיספטית:

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
 2. הוסף 5 מ"ל של ספטל סקרב לא מהל ורחץ את הידיים במשך כדקה
 3. שטוף היטב במים
 4. יבש היטב את הידיים
- לחיטוי ידיים לפני ניתוח:**

1. הרטב את כפות הידיים ואת הזרועות
2. הוסף 5 מ"ל של ספטל סקרב לא מהל ורחץ את הידיים במשך כדקה
3. נקה את היציפורניים באמצעות מברשת
4. שטוף את הידיים במים
5. חזור על הפעולה פעם נוספת למשך 2 דקות

6. שטוף היטב במים.

7. יבש היטב את הידיים

לחיטוי העור למטופלים שעומדים לעבור ניתוח:

1. שטוף את כל הגוף עם 25 מ"ל של ספטל סקרב, לפחות פעמיים, בדרך כלל פעם אחת ביום שלפני הניתוח ופעם שנייה ביום הניתוח.
2. שטוף היטב במים.
3. יבש היטב את הגוף.

אין לעבור על המנה המומלצת.

אם בטעות בלעת פפטל סקרב
אם בטעות בלעת פפטל סקרב, פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא אריות התרופה איתך.

אין ליטול תרופות בחושהן! **בדוק התוויות והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה.** **הרכב משקפיים** **אם הנך זקוק להם.**

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היועץ ברופא או ברוקם.

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה, השימוש בספטל סקרב עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהשתמשים. לא תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. יתכן ולא תסבול מאף אחת מהן.

לעיתים נדירות כלורהקסידין עלול לגרום לרגישות יתר כולל שוק אנפילקטי (התנפחות של הגרון או השפתיים ולחץ דם נמוך) ותגובות אלרגיות (דלקת של העור, גירוד, אדמומיות, אקזמה, פריחה, סרפדת, גירוי בעור, שלפוחיות). אם מתרחשת אחת מהתגובות האלה, יש להפסיק את השימוש ולפנות לקבלת טיפול רפואי מיד.

תופעות לוואי ביולודים:

כוויות כימיות (שכיחות לא ידועה).

אם הרופעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

לדיווח על תופעות לוואי

ניתן לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקוון לדיווח על תופעות לוואי, או על-ידי כניסה לקישור:

<https://sideeffects.health.gov.il>

5. איך לאחסן את התרופה?

מנע הרמלה תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח היציבות של ילדים ו/או תינוקות ועל-ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה לא הרואה מפורשת מהרופא. אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

יש לאחסן מתחת ל-25°C.

לאחר הפתיחה הראשונה ניתן להשתמש במשך חודשיים, אך לא יאוחר מתאריך התפוגה של התכשיר.

6. מידע נוסף

- **נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:**
Pluronic PE 6800, ammonyx M, isopropanol, D-gluconolactone, herbalcol 15.393/T(B), spectracol ponceau 4R, sodium hydroxide (for pH adjustment), purified water.

- **כיצד נראית התרופה ומה תוכן האריזה:**
נחל צמיר, צלול עד מטע עכור, בצבע אדום.
כל בקבוק מכיל 500 מ"ל תמיסה.

שם הצירוף:

ויטאמד תעשיות פרמצבטיות בע"מ, ת.ד. 114, בנימינה.

בעל הרישום וכתובתו:

טבע ישראל בע"מ, תל אביב.
העלון נערך באוגוסט 2023 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:
043.08.23618.00

לשם הפיטוח ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לבני שני המינים.

