

## پراقاستاتين تيقع

20 ملغ

أقراص

التركيب

يحتوي كل قرص على:

پراقاستاتين صوديوم 20 ملغ

Pravastatin sodium 20 mg

## پراقاستاتين تيقع

40 ملغ

أقراص

التركيب

يحتوي كل قرص على:

پراقاستاتين صوديوم 40 ملغ

Pravastatin sodium 40 mg

لمعلومات عن المركبات غير الفعالة ومولدات الحساسية أنظر الفقرة 2 - "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 - "معلومات إضافية".

**اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمالك للدواء.**

تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، راجع الطبيب أو الصيدلي.

وصف هذا الدواء لعلاج مرضك. لا تعطيه للآخرين. فهو قد يضرهم حتى ولو بدا لك أن مرضهم مشابه لمرضك.

**الدواء غير مخصص للأطفال ولمرهقين ما دون عمر 18 سنة.**

### (1) لأي غرض مخصص الدواء؟

● لتخفيض نسب الكوليسترول والشحوم الثلاثية في الدم.

● لتقليل خطورة إحتشاء عضلة القلب وإطالة متوسط العمر لدى مرضى لديهم إرتفاع بنسبة الكوليسترول ومن دون شواهد لمرض قلب تاجي.

● لتقليل خطورة الوفيات العامة بواسطة تقليل الوفيات الناجمة عن أمراض القلب، وتقليل خطورة حدوث نوبة قلبية لدى مرضى لديهم تصلب الشرايين ونسبة كوليسترول متوسطة أو مرتفعة.

معلومات إضافية:

● پراقاستاتين تيقع يستعمل لتخفيض النسب العالية للكوليسترول "السيء" ولرفع نسب الكوليسترول "الجيد" في الدم حيث أن التغييرات في التغذية والنشاط البدني فشلت بفعل ذلك كما ينبغي.

في حين إعتبار الكوليسترول ضروريا لعمل الجسم السليم، فإذا كانت نسبته في الدم مرتفعة للغاية، فهو قد يتراكم على جدران الشرايين، وفي نهاية الأمر قد تنسد الأوعية الدموية. هذه الحالة تسمى تصلب الشرايين. قد تؤدي هذه الحالة لألم في الصدر (ذبحة صدرية)، عندما ينسد وعاء دموي في القلب جزئياً، نوبة قلبية (إحتشاء عضلة القلب)، عندما ينسد وعاء دموي في القلب بأكمله، سكتة (حادث دماغي)، عندما ينسد وعاء دموي في الدماغ بأكمله. يتم إنتاج غالبية الكوليسترول من قبل الكبد وكمية قليلة فقط من الكوليسترول تصل من الغذاء. يُنتج الجسم غالبية الكوليسترول في الليل.

● من الجائز أن تظهر فحوص الدم أن نسبة الشحوم في الدم (بما في ذلك الكوليسترول) لا تزال مرتفعة، على الرغم من أنك قد تكون على حمية فقيرة بالشحوم. من المعروف عادة بأن إرتفاع نسبة الكوليسترول تساهم في خطورة حدوث مرض قلبي. عوامل إضافية مثل مرض قلبي حالي، إرتفاع ضغط الدم، السكري، الوزن الزائد، قلة النشاط البدني والتدخين، يمكنها أيضاً أن تزيد بشكل ملحوظ من خطورة تطور أو تقدم مرض القلب.

### الفصيلة العلاجية:

ستاتينات (أو مثبطات الإنزيم HMG-CoA ريدوكتاز). هذه المجموعة تخفض كمية الكوليسترول والشحوم الثلاثية (الشحوم) في الدم.

### (2) قبل إستعمال الدواء

**لا يجوز إستعمال الدواء إذا:**

● كنت حساساً (ألرجي) للمادة الفعالة پراقاستاتين أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 - "معلومات إضافية").

● كنت تعاني من مرض كبدي نشط.

● كنت في فترة الحمل أو هناك إمكانية أن تصبحي حاملاً، أو إذا كنت مرضعة (أنظري "الحمل والإرضاع").

### تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

**قبل العلاج بـ پراقاستاتين تيقع، إحك للطبيب إذا:**

● وُجد لديك أو كان لديك وهن عضلي (مرض يتميز بضعف عضلي عام، يشمل في حالات معينة العضلات التي تستعمل للتنفس) أو الوهن العضلي العيني (مرض يؤدي إلى ضعف في عضلة العين)، لأن الستاتينات يمكن أحياناً أن تفاقم الحالة أو تؤدي إلى ظهور الوهن العضلي (أنظر الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية").

● لديك مشاكل في الكلى.

● تجاوزت عمر 70 سنة.

● عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد.

● كنت تعاني من قلة نشاط الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية).

● كنت تعاني من إضطراب عضلي وراثي أو لديك سابقة عائلية لمشاكل مشابهة.

● عانيت في الماضي من أعراض جانبية تؤثر على العضلات عندما تناولت دواء آخراً لتخفيض الكوليسترول مثل ستاتين (دواء يثبط الإنزيم HMG-CoA ريدوكتاز) أو فيبرات (مثل جمفيبروزيل).

● كنت تشعر خلال فترة العلاج بتقلصات أو آلام في العضلات مجهولة السبب - بلغ الطبيب حالاً.

● كنت تعاني من مشاكل لسوء إستعمال الكحول (شرب دائم لكمية كبيرة من الكحول).

● كنت تستعمل أو إستعملت في الأيام الـ 7 الأخيرة دواء يُسمى حمض الفوسيديك (دواء للتلوثات الجرثومية) عن طريق الفم أو بالحقن. إن مشاركة حمض الفوسيديك مع پراقاستاتين تيقع يمكن أن يؤدي لمشاكل عضلية خطيرة (إنحلال العضلات المخططة).

إذا إنطبقت عليك إحدى الحالات التي وصفت سابقاً، سيصدر لك الطبيب تعليمات بإجراء فحوص الدم قبل وعلى ما يبدو خلال فترة العلاج. فحوص الدم لديك هذه تستعمل لتقييم خطورة حدوث أعراض جانبية المتعلقة بالعضلات.

يصدر لك الطبيب تعليمات بإجراء فحص دم قبل أن تبدأ بتناول پراقاستاتين وإذا وجدت لديك أعراض لمشاكل في الكبد خلال العلاج بـ پراقاستاتين. الغاية من الفحص هي التأكد من الأداء الوظيفي للكبد لديك. من الجائز أن يرغب طبيبك في أن تجري فحوص دم للتأكد من كيفية عمل كبدك بعد بدء العلاج بـ پراقاستاتين.

كما أنه، قبل العلاج بـ پراقاستاتين تيقع، إحك للطبيب إذا:

● كنت تعاني من فشل تنفسي خطير.

إذا كنت تعاني من داء السكري أو كنت معرضاً لخطورة تطوير السكري، يقوم الطبيب بمراقبة الفحوص الخاصة بك في أوقات متقاربة وذلك خلال فترة العلاج بهذا الدواء. إذا كانت نسب السكر والشحوم بدمك مرتفعة، لديك وزن زائد وضغط دم مرتفع، فمن شبه المؤكد أنك معرض لخطورة تطوير داء السكري.

بالإضافة لذلك، بلغ الطبيب إذا كنت تقاسي من ضعف عضلي متواصل. قد يتطلب الأمر إجراء فحوصات وأدوية إضافية لتشخيص ومعالجة هذه الحالة.

### التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تستعمل، أو إذا استعملت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحك للطبيب أو الصيدلي عن ذلك. بالأخص إذا كنت تستعمل:

● أدوية لتخفيض الكوليسترول من فصيلة الفيبرات مثل فينوفيبيرات أو جمفيبروزيل، دواء يقلل من الحماية المناعية للجسم (سيكلوسبورين الذي يُثبط جهاز المناعة، الذي يُعطى بعد زراعة عضو) أو دواء آخر لتخفيض نسبة الكوليسترول (حمض النيكوتينيك [فيتامين B3]) - تلك الأدوية يمكن أن تعرقل من طريقة عمل پراقاستاتين تيقع في الجسم.

● الأدوية التي تُعرف بأنها رابطات الحموض الصفراوية (مجموعة أدوية تمنع إعادة إمتصاص الحموض الصفراوية في الجهاز الهضمي، وبذلك تقدم تحول الكوليسترول لحموض صفراوية وتخفض نسبة الشحوم بالدم) مثل كوليستيرامين، كوليستيپول. إذا كنت تتناول أيضاً دواء من مجموعة رابطات الحموض الصفراوية، أنظر الفقرة 3 - "كيفية إستعمال الدواء؟".

● أدوية لمعالجة التلوثات الناجمة عن الجراثيم (المضادات الحيوية إريترومييسين، كلاريترومييسين أو حمض الفوسيديك). إذا توجب عليك إستعمال حمض الفوسيديك الذي يُعطى عن طريق الفم لمعالجة التلوث الجرثومي، فأنت ستضطر للتوقف عن إستعمال پراقاستاتين تيقع بشكل مؤقت. يبلغك الطبيب متى يكون تجديد العلاج بـ پراقاستاتين تيقع آمناً. إن إستعمال پراقاستاتين تيقع سوية مع حمض الفوسيديك قد يؤدي في أوقات نادرة لضعف العضلات، حساسية أو آلام في العضلات (إنحلال العضلات المخططة). أنظر معلومات إضافية حول إنحلال العضلات المخططة في الفقرة 4 - "الأعراض الجانبية".

● إذا كنت تتناول دواء لمعالجة ولمنع تشكل خثرات دموية المسمى "مضاد فيتامين K"، بلغ الطبيب قبل تناول پراقاستاتين تيقع وذلك لأن إستعمال مضاد لفيتامين K بنفس الوقت مع پراقاستاتين تيقع قد يرفع من قيم فحوص الدم المستعملة لمراقبة العلاج بـ مضاد لفيتامين K.

إن تناول پراقاستاتين مع أي واحد من الأدوية التالية يمكن أن يزيد من خطورة حدوث مشاكل في العضلات:

● كولشييسين (يستعمل لعلاج النقرس [gout])

● حمض النيكوتينيك (يستعمل لخفض نسبة مرتفعة من الكوليسترول في الدم)

● ريفامپيسين (يستعمل لعلاج مرض السل)

● ليناليدوميد (يستعمل لعلاج السرطان المسمى الورم النقوي المتعدد).

### إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول پراقاستاتين تيقع مع أو بدون طعام.

### إستعمال الدواء وإستهلاك الكحول

قم بالحد من إستهلاك الكحول للحد الأدنى. إذا كنت ترغب بالشرب في أثناء إستعمال الدواء، قم بشرب كميات قليلة من الكحول فقط. لا تتوقف عن إستعمال الدواء حتى ولو شربت لمرة واحدة مشروب كحولي.

إذا كنت قلقاً حول كمية الكحول التي يمكنك شربها في أثناء تناول الدواء، عليك إستشارة الطبيب بذلك.

### الحمل والإرضاع

**لا يجوز إستعمال پراقاستاتين تيقع:**

● إذا كنت في فترة الحمل أو الرضاعة (وذلك لأن هذا الدواء ينتقل إلى حليب الأم)، أو إذا كنت تخططين للحمل.

● إذا كان من شأنك أن تحملي، إلا إذا كنت تستعملين وسائل موثوق بها لمنع الحمل، الغير هورمونية (وسائل منع الحمل الهورمونية هي مثلاً أقراص منع الحمل أو مستحضر هورموني آخر لمنع الحمل). من المهم أن تستشير طبيبك بذلك.

● إذا أصبحت حاملاً خلال فترة العلاج بـ پراقاستاتين تيقع، توقفي عن تناول هذا الدواء في الحال بمجرد معرفة ذلك.

### السياقة وإستعمال الماكينات

پراقاستاتين تيقع قد يسبب الدوار، تشوش الرؤية أو إزدواج الرؤية خلال فترة العلاج. إذا كنت تعاني من تلك الأعراض فلا تقم بسياقة أو تشغيل الماكينات. تأكد من كونك مؤهل للسياقة وتشغيل الماكينات قبل أن تقدم على فعل ذلك.

يتبع ←

**معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء**

- يتوجب على المعالجين الذين لديهم عدم تحمل للكتوز الإنتباه بأن أقراص پراقساتين تفتح تحتوي على كمية قليلة من اللكتوز. إذا قيل لك من قبل الطبيب بأن لديك عدم تحمل لسكريات معينة، راجع الطبيب قبل تناول هذا الدواء.
- يحتوي هذا الدواء على أقل من 23 ملغ صوديوم بكل قرص لذلك يعتبر خالٍ من الصوديوم.

**(3) كيفية استعمال الدواء؟**

يجب استعمال المستحضر دائماً بحسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيضاح من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً فيما يتعلق بالمقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

يشرح لك الطبيب أهمية التغذية الفقيرة بالشحوم بالإضافة لتناول پراقساتين تفتح، وعليك مواصلة هذه التغذية لطيلة فترة العلاج.

**المقدار الدوائي وطريقة العلاج يحددان من قبل الطبيب فقط. المقدار الدوائي الإعتيادي عادة هو:**

- لمعالجة إرتفاع نسب الكولسترول والشحوم بالدم: 10-40 ملغ، مرة باليوم، يُفضل في المساء.
- لمنع أمراض القلب والأوعية الدموية: 40 ملغ، مرة باليوم، يُفضل في المساء.

● لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.

**فترة العلاج**

يُحدد الطبيب فترة العلاج بـ پراقساتين تفتح. يجب استعمال هذا الدواء بشكل دائم، وللفترة الزمنية التي حددها الطبيب، حتى ولو كان المقصود فترة زمنية طويلة. لا يجوز التوقف عن العلاج من تلقاء نفسك.

**شكل تناول**

يُفضل بلع القرص مع كأس من الماء. بالإمكان تناول القرص مع أو بدون طعام.

**السحق/الشطر/المضغ**

پراقساتين تفتح 20 ملغ: لا يجوز شطر القرص. إذا تطلب الأمر مقدار دوائي قدره 10 ملغ من پراقساتين، فبالإمكان استعمال المستحضرات الأخرى المرخصة بإسرائيل الحاوية على پراقساتين بعبارة 10 ملغ.

پراقساتين تفتح 40 ملغ: يُسمح بشطر القرص.

كافة العيارات: لتسهيل البلع، إذا دعت الحاجة، بالإمكان سحق القرص، أو تقسيمه لأجزاء أصغر، ولكن يجب بلع كافة أجزاء القرص حالاً بعد ذلك.

لا توجد معلومات بالنسبة للمضغ.

● إذا كنت تتناول أيضاً أدوية من نوع رابطات الحموض الصفراوية (مثل كوليستيرامين أو كوليستيپول)، فيجب تناول پراقساتين تفتح على الأقل ساعة قبل تناول هذه الأدوية أو على الأقل أربع ساعات بعد تناول هذه الأدوية، وذلك لأن إمتصاص پراقساتين تفتح قد يتأثر من أدوية من نوع رابطات الحموض الصفراوية إذا تم تناولها بالقرب من بعضها البعض.

**مشاكل في الكبد أو الكلية**

إذا عانيت في الماضي من مشاكل في الكبد أو إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلية، فمن شأن الطبيب أن يصف مقداراً دوائياً أخفض.

إذا تناولت بالخطأ مقداراً دوائياً أكبر أو إذا بلع طفل بالخطأ من الدواء، توجه حالاً إلى الطبيب أو لغرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول الدواء في الوقت المخصص فيجب تناول جرعة حال تذكرك، إلا إذا إقترب الموعد الذي يتوجب عليك تناول الجرعة القادمة فيه. لا يجوز تناول جرعة دوائية مضاعفة لتعويض عن الجرعة المنسية.

يجب المواظبة على العلاج بحسب توصيات الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول الأدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظرات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول استعمال هذا الدواء، إستشر الطبيب أو الصيدلي.

**(4) الأعراض الجانبية**

كما بكل دواء، إن استعمال پراقساتين تفتح قد يسبب أعراضاً جانبية عند بعض المستعملين. لا تتدهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أياً منها.

**يجب التوقف عن تناول الدواء والتوجه حالاً إلى الطبيب إذا:**

● كنت تعاني بشكل مفاجئ من ردود فعل تحسسية خطيرة تشمل إنتفاخ الوجه، الشفتين، اللسان أو القصبه الهوائية، التي يمكن تسبب صعوبة شديدة في التنفس. رد الفعل هذا هو نادر جداً، وهو قد يكون خطيراً عندما يظهر. بلغ الطبيب في الحال إذا حدث هذا الأمر.

● كنت تعاني من مشكلة في التنفس تشمل سعال عنيد و/أو ضيق تنفس أو سخونة.

**يجب إبلاغ الطبيب في الحال إذا:**

● تطورت لديك آلام عضلية، حساسية، ضعف أو تقلصات عضلية مجهولة السبب أو متواصلة، خاصة إذا كنت تشعر بنفس الوقت بسوء أو لديك سخونة مرتفعة.

● في حالات نادرة جداً، يمكن أن تكون المشاكل العضلية خطيرة (إنحلال العضلات المخططة)، وقد تؤدي لمرض كلوي خطير، يشكل خطراً على الحياة.

تأثير على الجلد والشعر: طفح.

**أعراض جانبية إضافية:**

**أعراض جانبية غير شائعة (قد تؤثر على حتى 1 من بين 100 متعالج):**

● أرق ● دوار ● إرهاق ● صداع أو اضطرابات في النوم ● تشوش الرؤية أو إزدواج الرؤية ● صعوبات في الهضم ● غثيان ● تقيؤات ● ألم أو إنزعاج في البطن ● الشعور بألم في الصدر نتيجة حموضة المعدة ● إسهال ● إمساك ● غازات في البطن ● حكة ● بثور ● شرى ● طفح ● مشاكل في فروة الرأس وفي الشعر (تشمل تساقط الشعر) ● مشاكل تتعلق بالمثانة البولية (ألم أو تكرار التبول، الحاجة للتبول في الليل) ● اضطرابات في الأداء الوظيفي الجنسي ● آلام في العضلات وفي المفاصل.

**أعراض جانبية نادرة جداً (قد تؤثر على حتى 1 من بين 10,000 متعالج):**

● ضعف، مشاكل في الشعور باللمس التي تشمل الشعور بحرقة أو وخز أو خدر، التي يمكن أن تدل على إصابة عصبية (خاصة إذا كنت تستعمل پراقساتين لفترة طويلة) ● مرض جلدي خطير (متلازمة تشبه الذئبة الإحمرارية) ● التهاب الكبد أو البنكرياس، يرقان (يُعرف بواسطة إصفرار الجلد وإصفرار بياض العينين) ● موت سريع جداً لخلايا الكبد (نخر كبدي عاصف) ● التهاب الأوتار الذي قد يتعقد ويؤدي لتمزق الأوتار ● إرتفاع إنزيمات ترانس أميناز (مجموعة إنزيمات موجودة بشكل طبيعي في الدم)، الذي يمكن أن يشكل علامة لمشاكل في الكبد. من الجائز أن يقوم الطبيب بإجراء فحوص دورية لمراقبة الوضع.

**أعراض جانبية ذات شيوع غير معروف (ليس بالإمكان تقييم الشيوع من المعطيات المتوفرة):**

● ضعف عضلي دائم ● داء السكري: الشيوع متعلق بتواجد أو غياب عوامل الخطورة (نسبة الجلوكوز بالدم بالصوم قدرها 5.6 ميلليمول/ليتر، BMI < 30 كلغ/متر<sup>2</sup>، إرتفاع نسب الشحوم الثلاثية، سابقة لإرتفاع ضغط الدم) ● التهاب جلدي عضلي (حالة تتميز بالتهاب العضلات والجلد). ● فشل كبدي ● الوهن العضلي الوبيل (مرض يؤدي إلى ضعف عضلي عام، يشمل في بعض الأحيان العضلات التي تستعمل للتنفس) ● الوهن العضلي العيني (مرض يؤدي إلى ضعف عضلة العين).

عليك إستشارة الطبيب إذا قاسيت من ضعف في الذراعين أو في الرجلين الذي يتفاقم بعد فترات من النشاط، إزدواجية الرؤية أو تدلي الجفنين، صعوبة في البلع أو ضيق في التنفس.

**بلغ عن حدوث الأعراض الجانبية التالية مع بعض الستاتينات (شيوها غير معروف):**

● كوابيس ● فقدان الذاكرة ● إكتئاب ● مشاكل في التنفس تشمل سعال عنيد و/أو ضيق تنفس أو سخونة ● السكري: من المحتمل أكثر أن يحدث هذا العرض الجانبي إذا كنت تعاني من إرتفاع نسب السكر والشحوم بالدم، لديك وزن زائد ولديك ضغط دم مرتفع. يقوم طبيبك بمراقبتك في أثناء تناولك لهذا الدواء.

إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقم إحدى الأعراض الجانبية أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في هذه النشرة، عليك إستشارة الطبيب.

**التبليغ عن أعراض جانبية**

بالإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضغط على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبليغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:

<https://sideeffects.health.gov.il>

**(5) كيفية تخزين الدواء؟**

● تجنب التسمم! يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي ومجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم. لا تسبب التقيؤ بدون تعليمات صريحة من الطبيب.

● لا يجوز استعمال الدواء بعد إنقضاء تاريخ الصلاحية (exp. date) الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

● يجب التخزين في مكان جاف، ما دون 25 درجة مئوية. يجب الحفظ في العلبة الأصلية للحماية من الضوء.

● لا يجوز رمي الأدوية إلى المجاري أو للقمامة المنزلية، إسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من أدوية لم تعد قيد الإستعمال. هذه الوسائل تساعد في الحفاظ على البيئة.

**(6) معلومات إضافية**

يحتوي الدواء بالإضافة للمركب الفعال أيضاً:

Lactose monohydrate, crospovidone, magnesium stearate.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوي العلبة:

پراقساتين تفتح 20 ملغ أقراص:

قرص مستدير، محدب، ذو لون أبيض-كريم، أملس من الجانبين. تحتوي كل علبة على 30 قرصاً معبأة ضمن لويحات (بليستر).

پراقساتين تفتح 40 ملغ أقراص:

قرص مطاول ذو لون أبيض - كريم، هناك خط للشطر من جانب واحد للقرص، ومن الجانب الثاني للقرص مطبوع الحرف "P". تحتوي كل علبة على 30 قرصاً معبأة ضمن لويحات (بليستر).

**إسم المنتج وصاحب الإمتياز وعنوانه:**

تيغ إسرائيل م.ض..،

شارع دقوره هتقيته 124، تل أبيب.

تم إعداد النشرة في تموز 2023 بموجب تعليمات وزارة الصحة.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة:

پراقساتين تفتح 20 ملغ: 124.64.30379

پراقساتين تفتح 40 ملغ: 124.65.30380

من أجل سهولة وتهوين القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكلا الجنسين.

PRAV TAB PL SH 160723