

زيقوكسيد™ 600 ملغ

أقراص



المادة الفعالة

يحتوي كل قرص على: لينيزوليد 600 ملغ

نظراً لتوارد خطرة عند مشاركة زيفوكسید مع أدوية أخرى، فيمكن أن يؤدى ذلك إلى حدوث أعراض جانبية، مثل: تغيرات في ضغط الدم، في حرارة الجسم أو في نظم القلب، ومن الجائز أن يرحب الطبيب في فحص حالتك الصحية العامة وضغط الدم قبل العلاج بالدواء وخلاله أو يقرر بان علاجا آخرأ يلائمك أكثر.

التداخلات/التفاعلات بين الأدوية

إذا كنت تتناول أو إذا تناولت مؤخراً، أدوية أخرى بما في ذلك أدوية بدون وصفة طبية وإضافات غذائية، إحكام الطبيب أو للصيدلي عن ذلك.

يجب إبلاغ الطبيب بالأخصوص إذا كنت تتناول أو تناولت في الـ 14 يوماً الأخيرة الأدوية التالية، لأنها يمكن تناول زيفوكسید بمشاركة هذه الأدوية (أنظر "لا يجوز إستعمال الدواء إذا":)

- أدوية من نوع حاچيات مونوأمين أو كسيذان (MAOIs) (مثل: فينيزيلين، إيزوكاربوكسازيد، سيليجيلين، موكوبيميد) التي تعطى أحياناً لعلاج الإكتئاب أو مرض الباركنسون.

بالإضافة لذلك، يجب إبلاغ الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت تتناول إحدى الأدوية التالية:

- أدوية تقلل الإنفاقن لعلاج الإنفلوانزا أو النزلة التي تحتوى على بيسودوإيفيردين أو فينيل بروپانولولين.

- أدوية لعلاج الربو، مثل: سالبيوتامول، تيربوتالين وفيتيوريل.

- أدوية لعلاج الإكتئاب من فصيلة ثلاثة الحلقة أو مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) (مثل: أميبريتيلين، ستيتالوبرام، كلوبيرامين، دوكسيفين، دوكسيفين، فلوكوكسيمن، فلوكوكسامين، إيميبرامين، لوفيبيرامين، باروكسيتين أو سيرترالين).

- أدوية لعلاج الشقيقة، مثل: سوماتريبتان وزولمتريبتان.

- أدوية لعلاج ردود فعل تحسسية خطيرة مفاجئة، مثل: أدريريتالين (إيبينيفرلين).

- أدوية ترفع ضغط الدم، مثل: نورأدريتالين (نورإيبينيفرلين)، دوبيامين ودوبوتامين.

- أدوية لعلاج الألم المتوسط حتى الشديد، مثل: بيشيدرين.

- أدوية لعلاج إضطرابات القلق، مثل: بوسسيرون.

- مضاد حيوي يدعى ريفامبيسين.

إستعمال الدواء والطعام

بالإمكان تناول الدواء مع أو بدون طعام، يجب بلع الدواء مع القليل من الماء. خلال فترة العلاج يجب التقليل من تناول الطعام وشرب المشروبات التي تحتوي على كميّات كبيرة من التريامين (Tyramine)، مثل: النبيذ والبيرة من البرميل، خلاصة الخماش، خلاصة الصويا (بما في ذلك سلسلة الصويا) والأطعمة التي إجتازت تعيناً مثل الجبنة الناضجة، وذلك لأن مشاركتها مع الدواء قد يرتفع ضغط الدم. إذا كنت تقاسي من صداع نابض بعد الأكل أو الشرب، إستشر الطبيب فوراً.

الحمل، الإرضاع والخصوبة
لا يجوز إستعمال الدواء دون إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج إذا كنت حاملاً، تخطّطين للحمل أو مرضعة.

إن تأثير الدواء على النساء الحوامل ليس معروفاً. يجب إستشارة الطبيب قبل بدء العلاج بالدواء إذا كنت حاملاً أو مرضعة. يجب إبلاغ الطبيب فوراً إذا إكتشفت أنك حامل، هناك شك لحصول حمل أو إذا كنت تخطّطين للحمل أو الإرضاع.

قد يلحّ زيفوكسید الضرر بالجنين ولذا لا يجوز إستعمال الدواء أثناء الحمل إلا إذا كانت الفائدة أكبر من الخطورة.

لا يجوز الإرضاع أثناء العلاج بـ زيفوكسید لأن الدواء ينتقل إلى حليب الأم وقد يؤثر على الرضيع.

السياحة وإستعمال الماكينات

قد يؤدي هذا الدواء إلى دوار وإنطرابات في الرؤية. إذا حدث لك ذلك، فلا يجوز السياحة أو تشغيل الماكينات.

بالنسبة للأطفال، يجب تحذيرهم من ركوب الدرجات أو من اللعب بالقرب من الشارع وما شابه.

معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء

يحتوي الدواء على صوديوم، يحتوي زيفوكسید على أقل من 1 ملليمول صوديوم (23 ملخ) في قرص ذو 600 ملغ، بالإمكان القول بأنه بشكل أساسى "حالٍ من الصوديوم".

3. كيفية إستعمال الدواء

يجب دائمًا إستعمال المستحضر حسب تعليمات الطبيب. عليك الإستيقاظ من الطبيب أو من الصيدلي إذا لم تكن واثقاً بخصوص المقدار الدوائي وطريقة العلاج بالمستحضر.

المقدار الدوائي، مدة العلاج وطريقة العلاج تحدد من قبل الطبيب فقط.

لدى الخمج، حديثي الولادة والأطفال دون عمر 18 سنة سوف يقوم الطبيب بملاءمة المقدار الدوائي وفق عمر ووزن الطفل.

عليك إتمام العلاج الذي أوصى به الطبيب. لا يجوز إستعمال هذا الدواء في أوقات متقاربة أو لفترة طويلة دون إستشارة الطبيب.

لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إستشارة الطبيب حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

linezolid 600 mg

لائحة المواد غير الفعالة ومولادات الحساسية في المستحضر، أنظر الفقرة 2 "معلومات هامة عن بعض مركبات الدواء" والفقرة 6 "معلومات إضافية".

اقرأ النشرة بتمعن حتى نهايتها قبل إستعمال الدواء. تحتوي هذه النشرة على معلومات موجزة عن الدواء. إذا توفرت لديك أسئلة إضافية، فتوجه إلى الطبيب أو الصيدلي.

وُصف هذا الدواء من أجله. لا تعطيه لآخرين. فهو قد يضرهم حتى لو بدا لك أن حاليتهم الطيبة مشابهة لحالتك.

1. لأي غرض مخصص الدواء؟

لعلاج الكبار والأطفال من التلوثات الناتجة عن كائنات حية دقيقة مقاومة لكل أنواع المضادات الحيوانية الأخرى والحساسة لـ لينيزوليد، بما في ذلك التلوثات التي تسبب تجراش الدم المتكرر (bacteremia)، مثل:

- إلتهاب الرئتين (الحالات المكتسبة في المجتمع وفي المستشفيات).

- تلوثات الجلد والتنفس الرخو، بما في ذلك تلوثات القدم السكرية.

- تلوثات ناتجة عن جراثيم المكورات المعوية.

الفصيلة العلاجية:

مضاد حيوي من فصيلة الـ أوكسازوليدينون.

2. قبل إستعمال الدواء

لا يجوز إستعمال الدواء إذا:

- كنت حساساً (الألرجي) للمادة الفعالة أو لكل واحد من المركبات الإضافية التي يحتويها الدواء (أنظر الفقرة 6 "معلومات إضافية").

- كنت مرضعة، نظراً لانتقال الدواء إلى حليب الأم وتاثيره على الرضيع.

- كنت تتبعالج أو عولجت في الـ 14 يوماً السابقة لأدوية من نوع حاچيات مونوأمين أو كسيذان (MAOIs) (مثل: فينيزيلين، إيزوكاربوكسازيد، سيليجيلين، موكوبيميد)، التي تعطى أحياناً لعلاج الإكتئاب أو مرض پاركتسون.

تحذيرات خاصة تتعلق بإستعمال الدواء

قبل العلاج بـ زيفوكسید، إحكام الطبيب إذا:

- كنت تعاني من ضغط دم مرتفع، إذا كنت معالجاً أو غير معالج بأدوية لهذه الحالة.

- شخص لديك فرط شاطئ الغدة الدرقية (thyroid) أو من متلازمة سرطاوية (الحاصلة نتيجة أورام في الجهاز الهورموني، حيث تترافق بأعراض الإسهال، تورّد الجلد، وأصوات تغيير أثناء التنفس).

- كنت تعاني من هوس إكتئابي، إضطراب فصامي عاطفي، إرتباك ذهني ومشاكل نفسية أخرى.

يجب توخي الحذر بشكل خاص قبل العلاج بـ زيفوكسید وإخبار الطبيب إذا:

- لديك ميل للإصابة والتزلف بسهولة.

- كنت تعاني من فقر الدم (وُجدت لديك نسبة منخفضة من خلايا الدم الحمراء).

- لديك ميل للمعاناة من تلوثات.

- كنت تعاني أو عانيت في الماضي من اختلالات.

- كنت تعاني من مشاكل في الكبد أو في الكلى، خاصة إذا كنت متعالجاً بالديازيد (يتم إستعمال المستحضر بعد العلاج بالديازيد).

- كنت تعاني من الإسهال.

الأطفال والمراهقون

لا يوصى بإستعمال زيفوكسید لعلاج الأطفال الذين يعانون من تلوثات في الجهاز العصبي المركزي.

الخصوص والمتباينة

أثناء العلاج بهذا الدواء يجب إجراء فحوص دم بشكل روتيني، خاصة لدى المرضى الذين يتناولون أدوية التي قد تؤدي إلى إنخفاض تعداد وأداء الصفائح الدموية أو لدى المرضى الذين يتناولون لينيزوليد لأكثر من أسبوعين.

يجب إجراء فحوص نظر لدى المرضى الذين يتناولون الدواء لفترة مطولة (أكثر من 28 يوماً).

- دوار
 - ألم متكرر
 - فقر الدم (انخفاض نسبة خلايا الدم الحمراء)
 - **أعراض جانبية غير شائعة (تظهر لدى حتى 1 من بين 100 مستعمل):**
 - إلتهاب في المهبل أو في منطقة الأعضاء التناسلية الأنثوية
 - شعور بوخز أو خدر
 - إلتهاب في الأوردة (عند إستعمال زيفوكسيد VII، عبر التسريب فقط)
 - إنفاس، ألم أو انتفاخ لون اللسان
 - تواء التبول
 - قشعريرة، شعور بالعطش
 - تعرق مفرط
 - تغيرات في البروتينات، الأملاح أو الإنزيمات في الدم التي تقيس أداء الكبد أو الكلى
 - نسب منخفضة من الصوديوم في الدم
 - فشل كلوي
 - إنخفاض نسبة الصفيحات الدموية
 - إنفاس في البطن
 - ارتفاع نسب الكرياتينين
 - ألم في المعدة
 - **تغيرات في نظم القلب (مثل: إرتفاع نظم القلب)**
 - **أعراض جانبية نادرة (تظهر لدى حتى 1 من بين 1,000 مستعمل):**
 - تغير سطحي في لون الأسنان (يمكن إزالته بواسطة تنظيف الأسنان من قبل شخص مهني)
 - **أعراض جانبية شيعها غير معروفة:**
 - تساقط الشعر
 - إنخفاض تعداد الدم
 - ضعف و/أو تغييرات في الإحساس
- إذا ظهر عرض جانبي، إذا تفاقمت إحدى الأعراض الجانبية، أو عندما تعاني من عرض جانبي لم يذكر في النشرة، عليك إستشارة الطبيب.
- بإمكان التبليغ عن أعراض جانبية لوزارة الصحة بواسطة الضفت على الرابط "تبليغ عن أعراض جانبية عقب علاج دوائي" الموجود على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الصحة il (www.health.gov.il) الذي يوجهك إلى النموذج المباشر للتبلغ عن أعراض جانبية، أو عن طريق تصفح الرابط:
- <https://sideeffects.health.gov.il>

5. كيفية تخزين الدواء؟

- تجنب التسمم: يجب حفظ هذا الدواء وكل دواء آخر في مكان مغلق بعيداً عن متناول أيدي و المجال رؤية الأطفال و/أو الرضع، وذلك لتفادي إصابتهم بالتسمم.
- لا تنسى التقييم بدون تعليمات صريحة من الطبيب.
- لا يجوز إستعمال الدواء بعد إنتهاء تاريخ الصلاحية (exp. date) (الذي يظهر على ظهر العلبة. يشير تاريخ الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر).
- يجب التخزين بدرجة حرارة دون 25 درجة مئوية. يجب الحماية من الضوء.

6. معلومات إضافية

يحتوي الدواء بالإضافة للمادة الفعالة أيضًا على:

Microcrystalline cellulose, corn starch, sodium starch glycollate, hydroxypropyl cellulose, magnesium stearate, carnauba wax, Opadry White YS-1-18202-A.

كيف يبدو الدواء وما هو محتوى العلبة:
زييفوكسيد™: قرص لونه أبيض - Off white. ختم عليه "ZYV" من جانب واحد للocrson و- "600" من الجانب الآخر.

صاحب الإمباري وعنوانه: فايزر بي إف إيه فارماسفتيكا إسرائيل م.ض، شارع شنكار 9، هرتسليا بيتوخ 46725.

رقم سجل الدواء في سجل الأدوية الحكومي في وزارة الصحة: 122.61.30245.01
من أجل سهولة وتهوير القراءة، تمت صياغة هذه النشرة بصيغة المذكر. على الرغم من ذلك، فإن الدواء مخصص لكل الجنسين.

تم تحديدها في كانون الأول 2022 بموجب تعليمات وزارة الصحة

إذا توقفت عن تناول الدواء وعادت الأعراض الأصلية - توجه فوراً إلى الطبيب.
لا يجوز تجاوز المقدار الدوائي الموصى به.
يمتنع سحق/شطر/مضغ القرص لأنه مطلي.

إذا تناولت مقداراً دوائياً مفرطاً أو إذا بلغ طفل بالخطأ من الدواء، توجه فوراً إلى الطبيب أو إلى غرفة الطوارئ في المستشفى وأحضر معك علبة الدواء.

إذا نسيت تناول هذا الدواء في المحدد، يجب تناول مقدار دوائي حال تذكر بذلك. يجب حساب موعد المقدار الدوائي التالي بدءاً من المقدار الدوائي هذا، ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال تناول مقدار دوائي مضاعف!

يجب المواطنة على العلاج حسب توصية الطبيب. لا يجوز التوقف عن العلاج بالدواء بدون إذن الطبيب، حتى ولو طرأ تحسن على حالتك الصحية.

لا يجوز تناول أدوية في العتمة! يجب تشخيص طابع الدواء والتتأكد من المقدار الدوائي في كل مرة تتناول فيها دواء. ضع النظارات الطبية إذا لزم الأمر ذلك.

إذا توفرت لديك أسئلة إضافية حول إستعمال الدواء، استشر الطبيب أو الصيدلي.

4. الأعراض الجانبية

كما بكل دواء، إن إستعمال زيفوكسيد قد يسبب أعراضًا جانبية لدى بعض المستعملين. لا تنهش من قائمة الأعراض الجانبية. من الجائز ألا تعاني أي منها.

الأعراض الجانبية الخطيرة لـ زيفوكسيد (وشيوها):

يجب التوقف عن الإستعمال والتوجه فوراً إلى الطبيب في حال:

- ظهور إضطرابات جلدية شديدة (شيوع غير معروف)، إنفاس خاصّة في منطقة الوجه والعنق (شيوع غير معروف)، صفير و/أو صعوبات في التنفس (شيوع غير معروف). قد تكون هذه علامات لرد فعل حساسية. ظهور اسهال خطير يحتوي دمًا و/أو مخاطاً (التهاب المعي المنوط بعلاج بواسطة مضادات حيوية، بما في ذلك إلتهاب القولون الغشائي الكاذب) الذي قد يشكل في أحيان نادرة خطراً على الحياة (نادر). في هذه الحال، لا يجوز تناول أدوية لإبطاء أو إيقاف نشاط الأمعاء.

يجب التوجه إلى الطبيب فوراً في حال:

- ظهور أعراض جلدية تشمل جلد أحمر مؤلم مع قشرة (dermatitis) (غير شائع).
- طفح (شائع)، حكة (شائع).
- ظهور إضطرابات في الرؤية، مثل: تشوش الرؤية (غير شائع)، تغيرات في رؤية الألوان (شيوع غير معروف)، صعوبة في ملاحظة التفاصيل (شيوع غير معروف) أو تضليل مجال الرؤية (نادر).
- إذا كنت تعاني من غثيان أو تقيؤات متكررة، ألم في البطن أو تسارع التنفس (شيوع غير معروف).
- إذا أصبت بخدر، أو كنت تشعر بلسن أو بوخز، في الذراعين أو الرجلين.

- إذا كنت تقاسي من احتلالات أو نوبات (غير شائع)، عدم الهدوء، إرباك، هلوسة، تصلب العضلات، إرتجاف، مشاكل في التنافس، خاصة إذا كنت تتناول في الوقت ذاته أدوية لعلاج الإكتئاب من مجموعة حاجبات السيروتونين الإنثانتائية (SSRIs) (شيوع غير معروف) (انظر التداخلات /التفاعلات بين الأدوية").
- ميل زائد للتعرض للكدمات والأنزفقة، نتيجة إنخفاض خلايا دم معينة الأمر الذي قد يؤثر على تختثر الدم أو يؤدي إلى فقر الدم (شائع).
- تغيرات في سبب خلايا دم معينة الأمر الذي قد يؤثر على قدرة جهاز المناعة بمحاربة التلوريات (شائع) علامات لتوث تشمل: سخونة (شائع)، ألم في الحنجرة (غير شائع)، تقرحات في الفم (غير شائع).
- إلتهاب البنكرياس (غير شائع).
- تشنحات (غير شائع).

- حدث دماغي عابر (غير شائع).
- أعراض مؤقتة، مثل: فقدان الرؤية، ضعف في الذراع والرجل، إضطرابات في الكلام وفقدان الوعي (غير شائع).
- طنين في الأذنين (tinnitus) (غير شائع).
- صداع نابض بعد الأكل أو الشرب.
- تم التبلغ من قبل المتعالجون الذين تلقوا الدواء لفترة تزيد عن 28 يوماً عن خدر، وخز في الأطراف وكذلك تشوش في الرؤية.

أعراض جانبية إضافية

أعراض جانبية شائعة (أعراض التي تظهر لدى حتى 1 من بين 10 مستعملين):

- تلوث فطري، خاصة في الفم أو في المهبل.
- صداع.
- طعم معدني في الفم.
- إضطرابات في الهضم، ألم في البطن، إسهال، إمساك، غثيان أو تقيؤات.
- تغيرات في تناول حفوص الدم (تشمل حفوصات الكبد أو الكلى وحفوصات نسب السكر في الدم).
- صعوبات في النوم.
- إرتفاع ضغط الدم.